


Scanzia F Ordine 5.^o
Num.^o 23



Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
Open Knowledge Commons and Harvard Medical School

DE SUBITANEIS
MORTIBUS.

MDCCV. Typis Jo. Ponceleti Burgen. MDCCV.

AT PARISIIS, IN ACADEMIA REGIA.

MORTIBUS
DE SUBITANEIS


to Harvard College
JO: MARIAE LANCISII

Intimi Cubicularij, & Archiatri Pontificij

DE

SUBITANEIS MORTIBUS

LIBRI DUO.



ROMÆ, Typis Io: Francisci Buagni. MDCCVII.

SVPERIORVM PERMISSV.

2236-24

1879, April 9.
Paine bequest.



ROMA, Typis de: Francisci Bagagni. MDCCVII.

DOON 189

189

1815

1815

CLEMENTI XI.

PONT. OPT. MAX.

IO: MARIA LANCISIVS

FELICITATEM.



*Aius, ac iustius obsequij
genus, quàm simplicem
libri nuncupationem,
sisto ad SANCTITATIS
TVÆ PEDES, B.P., dum
bos qualescumq; labores meos, in pu-
blicam salubritatem Tuo Iussu, quâ
debet*

*decet veneratione , susceptos , Tibi
nunc humiliter offero . Hoc enim ,
quantumvis tenuissimo munere , non
solum gratum animum erga benefi-
centissimum Principem ; sed prom-
ptam etiam , ac sollicitam erga supre-
ma Tua Mandata voluntatem profi-
teor , & obedientiam . Siquidem , hoc
ineunte anno , quo repentinarum mor-
tium strages in Vrbe multis iam men-
sibus grassabatur , nihil , post diuinam
imploratam opem , habuisti prius ,
quam , detectis causis , ipsas morborum
radices euellere . Hinc , ut sollicitudi-
ne , curâque meâ vigilantissimæ Pro-
uidentiae Tuæ , Principibus alijs ad
populorum salutem imitandæ , res-
ponderem ; suspensio tantisper studio ,
Tibi iam debito , Tibique a me plu-*

res annos elucubrato, de Motu Cor-
dis, & Aneurysmatibus, me totum
ad ista conuerti. Quare Pindari du-
ctu, qui, cum promissum Agesi-
damo hymnum distulisset, adiecit
aliud breuiorem, ut sorti persoluen-
dæ usuram adiungeret; nos, hasce
inter moras, præsentis libros, tan-
quàm fœnus maioris operis, Tibi de-
pendimus; hoc certè Pindaro dili-
gentiores, quòd sortem fœnore præ-
curramus. Vtinam hæc, PONTIFEX
SANCTISSIME, id unicè assequantur,
ut Tuo vniuersos apud homines admi-
rabili iudicio comprobentur: quo sa-
nè iudicio, insigniumque operum, a
Te iam absolutorum, luce, & exem-
plis in spem erigimur, ut Reli-
gionem quoque ad extrema terra-

brum

Ode 10.
& 11.

*rum propagatam , reliquas sacras
Ædes , ac vetera Urbis Monumen-
ta restituta , nouaque in priscorum
æmulationem Cæsarum sublimiùs
euecta publicè gratulemur ; & ma-
gnifica inter hæc naturalibus etiam
scientijs latiore viam per tuta ,
ac solida experimenta patefactam
prospiciamus : ne quid sub tanto
Principe ipsa Roma vel Atticæ
Academiæ , vel exterorum nostræ
ætatis inuentis habeat inuidendum ;
quorum profectò Consiliorum magni-
tudinem nemo cogitatione rectiùs me-
tiatur , quàm nos , qui SANCTITATI
TVÆ propiùs adstantes , famam de Iu-
stitia , de Celsitudine Animi Tui , cum
admirabili moderatione coniuncta ,
deque cæteris Virtutibus vniuersis la-
tis-*

*tissimè diffusam, veritate ipsâ longè
minorem animaduertimus; atq; Tuis
in Actibus cunctis ea, quæ rarò in eun-
dem conueniunt, vnà concurrere ad-
miramur, summam nempè doctrinam
cum incredibili humanitate, gravita-
temq; veteris discipline, quam crebris
ieiunijs, & austerâ pietatis exercita-
tione profiteris, mirâ cum sermonis,
morumque suauitate conspirantem;
vt qui tam sublimi fastigio potestatis,
ac meritorum, præclarisq; operibus
antecellis, tamèn alijs Te fœdere cha-
ritatis, ac sensu Christianæ humilita-
tis exeques. Ita Deus Te diù sospitem
ad Ecclesiæ, & populorum felicitatem
seruet, ac cœptis tuis, votisq; nostris
benignus adspiret. Ex Quirinali Tuo
Kal. Non. MDCCVI.*

Imprimatur ,

Si videbitur Reuerendissimo Patri Magistro Sacri Palatij
Apostolici ,

*Dominicus de Zaulis Episcopus Verulanus
Vicesgerens .*



Librum Illustrissimi Domini Io. Mariæ Lancisij perle-
gi , & gustauī meo non sine lucro , quo in libro
multam quidem doctrinam , & elegantiam , nihil verò
Religioni , & moribus Catholicis contrarium deprehen-
di ; propterea , si Reuerendissimo Patri placuerit , in lu-
cem dari posse arbitror .

Romæ 14. Kal. Febr. MDCCVII.

Iacobus Sinibaldus Protomedicus Generalis .



Imprimatur ,

Fr. Pauli nus Bernardinius Ordinis Prædicatorum Sacri
Apostolici Palatij Magister .

OR-

ORDO, ET INDEX

Capitum, Historiarum, & Scholiorum,
quæ in duobus ijs Libris
continentur.

Occasio scribendi.

LIBER PRIMVS.

CAP. I. *Vita in quo consistat præsertim apud animalia perfectæ.* pag. 1.

CAP. II. *Ostenditur mortem esse indiuiduam, & subitaneam, sed ex hominum opinione variè dispertiri.* pag. 5.

CAP. III. *Quæ vera sit in hominibus Mortis idea, & undè discrimina petenda sint.* pag. 8.

CAP. IV. *De Natura, & differentijs repentinæ mortis.* pag. 11.

CAP. V. *Agitur in genere de causis mortis, quam vocant repentinam.* pag. 13.

CAP. VI. *De causis subitaneæ mortis ex parte fluidorum maioris usus, & primò ex parte aeris.* pag. 16.

CAP. VII. *De causis subitanearum mortium ex parte sanguinis.* pag. 19.
CAP.

CAP. VIII. De causis subitanearum mortium
ex parte fluidi neruorum, seu spirituum ani-
malium. pag. 21.

CAP. IX. De causis subitanea mortis ex parte
solidorum maioris usus, & primò ex parte in-
strumentorum, respirationi famulantium p. 25.

CAP. X. De causis improuisarum mortium ex
parte cordis, & magnorum vasorum. pag 28.

CAP. XI. De causis improuisarum mortium ex
parte cerebri, & neruorum. pag. 33.

CAP. XII. Subitanei morbi hætenus expositi
ad tria capita rediguntur, ad Suffocationem,
ad Syncopem, atque ad Apoplexiam, quæ et
simul plerunque concurrunt. pag 43.

CAP. XIII. Recensitæ causæ subitanearum mor-
tium inuincibiles, aut vincibiles existunt. p 46.

CAP. XIV. De signis improuise mortis, &
primò de simulatis, ac suppositis, seu supplan-
tatis mortibus. pag. 50.

CAP. XV. Exponitur difficultas inueniendi cer-
ta signa, quibus dignoscantur qui natura, non
arte pseudo-mortui occurrunt. pag. 52.

CAP. XVI. De signis, quibus pseudo-mortui
a verè mortuis distingui possunt. pag. 55.

CAP. XVII. De signis medicis, quibus repen-
tina

- tina mors prænosci potest.* pag. 61.
- CAP. XVIII. *Agitur de signis futura mortis
repentina, petitis ex læsione instrumentorum,
respirationi famulantium,* pag. 65.
- CAP. XIX. *De signis futura subitanea mor-
tis a Corde, Magnis Vasis, & Sanguine.* p. 70.
- CAP. XX. *De signis improvisæ mortis a cere-
bro, nervis, & liquido animali.* pag. 83.
- CAP. XXI. *Agitur in genere de methodo præ-
servandi a subitaneis mortibus.* pag. 87.
- CAP. XXII. *Qua methodo præservanda sunt
corpora aspectu sana.* pag. 90.
- CAP. XXIII. *De methodo præservandi a sub-
itaneo interitu corpora valetudinaria.* pag. 95.

LIBER SECVNDVS.

De subitaneis mortibus, illarumque
causis, quæ decursu annorum
1705. & 1706. Romæ
contigerunt.

- CAP. I. *Quæritur, an causa repentinarum
mortium, quæ Romæ per hæc tempora grassatæ
sunt, fuerit uniuersalis, & simplex, an verò
particularis, & mixta.* pag. III.
CAP.

CAP. II. *Demonstratur, inaequalem aeris constitutionem fuisse etiam inter causas vagantium repentinarum mortium.* pag. 115.

CAP. III. *Adducuntur quaedam argumenta ad confirmandum, non ex uniuersali solum causa tot hominum discrimina Romae contigisse, sed ob morbosas eorundem corporum dispositiones, ac potissimum intemperantiam.* pag. 118.

CAP. IV. *Numerus morientium in Vrbe forsitan hoc tempore minor extitit, licet maior visus sit, ex quo consueti, & exitiales Romae morbi nequaquam vagati sunt.* pag. 123.

CAP. V. *Quae remedia hoc anno ijs maxime profuerint, qui a subitaneis morbis repentinis mortes minitantibus, euaserunt.* pag. 126.

OBSERVATIONES.

Physico-Medica nonnullorum, qui, cum primum istiusmodi repentinis morbis tentati fuerint, feliciter euaserunt. pag. 138.

OBSERVATIO I. *Apoplexia cum aphonia, & paralyfi dexterae corporis medietatis, phlebotomia, chatarticis, ac diaphoreticis soluta.* pag. 139.

OBSERVATIO II. *Fortis Apoplexia cum*
reli-

*relieta paralyfi feliciter curata in Matrona
sexagenaria .* pag. 142.

OBSERVATIO III. *Subita capitis occupa-
tio cum aphonía ex affectione cerebri par-
tí idiopathica, partim sympathica, prosperè ce-
dens .* pag. 146.

OBSERVATIO IV. *Apoplexia cum affe-
ctione epileptica, & syncopali in paralyfim
dexteræ medietatis corporis, salua tunc Aegri
vita, concedens .* pag. 149.

Aetiologia huius morbi, & Aegri mors. pag. 156.

Dissectio cadaueris . pag. 160.

Scholium dissectionis . pag. 163.

OBSERVATIONES.

*Physico-Anatomica nonnullorum, qui primo impetu
morbi repentè per hac tempora perierunt .* p 172

OBSERVATIO I. *Repentina mors ex apo-
plexia syncopali in Viro obeso, & cachochy-
mo .* pag. 175.

Cadaueris dissectio . pag. 176.

Scholium . pag. 179.

OBSERVATIO II. *Subita mors ex synco-
pe ob cordis magnitudinem, prolapsum, atque*
c aneu-

<i>aneurysma .</i>	pag. 185.
<i>Cadaueris dissectio .</i>	pag. 186.
<i>Scholium .</i>	pag. 188.
OBSERVATIO III. <i>Cita mors ob interce-</i>	
<i>ptum motum aeris, & sanguinis in præcordijs,</i>	
<i>unà cum cerebri consensu .</i>	pag. 197.
<i>Cadaueris dissectio .</i>	pag. 198.
<i>Scholium .</i>	pag. 199.
OBSERVATIO IV. <i>Repentina mors ex</i>	
<i>conuulsione thoracis, præcordiorum, menin-</i>	
<i>gum, ac totius corporis, in fortissimam apo-</i>	
<i>plexiam ocysimè desinente .</i>	pag. 207.
<i>Cadaueris dissectio .</i>	pag. 208.
<i>Scholium .</i>	pag. 210.
OBSERVATIO V. <i>Improuisa mors ex su-</i>	
<i>bita Caua intrà pericardium disruptione cum</i>	
<i>aneurysmate arteriæ magnæ .</i>	pag. 218.
<i>Cadaueris dissectio .</i>	pag. 219.
<i>Scholium .</i>	pag. 221.

OCCASIO SCRIBENDI

De subitaneis Mortibus.



VM in Vrbe Roma impro-
uisæ hominum mortes, de-
cursu æstatis, autumnî, & hye-
mis anni 1705. vsque ad
æquinoctium vernum curren-
tis anni 1706. frequentiùs acciderint; atque
hinc vulgus, tacito perculsum timore, ac
metu errabundum, in diuersa, vt assolet,
scinderetur, nunc prauam tabaci qualita-
tem, nunc putidos ex præteritis terræ moti-
bus excussos halitus, nunc abusum chocola-
tæ, nunc ignotum ambientis virus imperitè
non minùs, quàm temerè incusans; meritò
Sanctissimus, ac vigilantissimus Pontifex
CLEMENS XI. primò Animum ad spiritualia
Remedia conuertit, feruidis ad Deum fufis
Precibus, nouâque in Ecclesia vniuersali, ad
implorandam benè, pièque moriendi gra-
tiam, institutâ Liturgiâ: subindé prudentiam
cum pietate coniunxit, & verè sapiens pu-
blicâ vsus fuit prouidentiâ, quæ in tanti

*Qualis esse
debeat Prin-
cipum xpi-
lantia in his
casibus.*

mali causas diligenter inquirens, eidem opportuna, si quæ forent necessaria, præsidia porrigeret, vel saltem bonâ spe timidas, ancipitesque populi mentes firmaret. Iussit propterea mense Ianuario labentis anni, vt Protomedicus, & Consiliarij Medicorum Almæ Vrbis Collegij, dissectis aliquorum, qui repenti decesserint, cadaueribus, veras grassantis libitinæ causas perquirerent; quibus sanè extispicijs mē idcirco præesse mandauit, vt, re penitus obseruatâ, si quæ magis spectanda occurrissent, SANCTITATI SVÆ illicò referrem.

Omnem interea facturis periculum munificam præbuit opem Eminentiss. Card. Pallauicinus, Gubernator tunc Vrbis meritiſſimus. Qua de re, selecto ad cadauerum sectiones publico Romani Archilycei Theatro, cœpta fuerunt experimenta.

Postulat itaque suspicienda, admirandaque sollicitudo Pontificis, vt, cum omnia, quâ publica, totius nempè Christiani Orbis, quâ priuata subiectarum prouinci-
arum studia diuino quodam animi robore ipse regat, ac moderetur, faciatque vnus,
& so-

& solus, quæ præsens stupeat ætas, & miratura sit postera, postulat, inquam, vt nos quoque in partem etsi minimam suarum curarum scribendi celeritate, atque alacritate veniamus. Et quoniam in causas vagantium repentinarum mortium supremo Principis iussu satis per cadauera, perque alias obseruationes inquisitum fuit, consentaneum rationi ducimus, peracta, fideliterque descripta experimenta ad rationis lancem diligenter expendere; quæ quidem eò nunc liberiùs in manus hominum prodire sinimus, quòd plures viderimus de subitis istius anni casibus sparsim editas hetrusco, ac latino sermone dissertationes, quæ, vtcumque argumentum egregiè attingant, integrum tamen, propter obseruationum paucitatem, perstrictumque nimis causarum examen, minimè complectuntur.

At verò, vt opus hoc nec inutilis, nec indecora doctrinæ varietas commendaret, e reputauimus in primo libro agere de subitaneis mortibus in vniuersum, idque eò libentiùs, quò nemo Recentiorum magnum ali-

quid

Operis distributione.

quid conferre huc videatur. Multi enim
particulatim, & obiter, nullus, quòd sciam,
post detectam circulationem, generatim,
discretè, atque ex instituto de hoc argu-
mento scripserunt; visuri deinde in secun-
do libro veluti in hypothesi, an vniuersale,
vel particulare, an verò, vt putamus, mix-
tum fuerit principium, ex quo supremi hoc
anno fati causa tot Romanis Ciuibus, &
Incolis impenderit. Quod varijs insuper
observationibus anatomicis ostendere, ac
demonstrare curabimus. Iis frui Lector,
& vale.



οἱ δὲ ἄνθρωποι οὐκ ἔτι φανερῶν τὰ ἀφανῆ σκέπτεσθαι καὶ ὁρῶνται, τέχνησιν γὰρ χρεόμενοι, ὁμοίησιν ἀνθρωπίνῃ φύσει, καὶ γινώσκουσιν. Θεῶν γὰρ τόσῳ ἐδίδαξε μιμέσθαι τὰ ἑαυτῶν, γινώσκοντας ἀποιέσθαι, καὶ καὶ καὶ γινώσκοντας ἀμιμέονται.

At verò homines ex manifestis obscura considerare non nouerunt : quum enim artibus utantur similibus humanæ naturæ, id ipsum ignorant. Diuina enim Mens edocuit ipsos sua ipsorum imitari ; ita ut cognoscant, quæ faciunt , & non cognoscant , quæ imitantur .

Hippocrates lib. 1. de Diæta num. 13.

DE SVBITANEIS
MORTIBVS

In genere

LIBER PRIMVS

*Vita in quo consistat, præsertim apud
animalia perfectæ.*

CAPUT I.



VM nemo veram, ac perspicuam vllius mortis ideam fingere sibi possit, quin claram prius, atque veram vitæ rationem diligenter expendat; profectò necesse in præsens erit, vt, naturam, & causas subitaneorum mortium inuestigaturi, genuinas vitæ notiones præmittamus. Longas itaque reiiciens disputationum tricas, quibus peripatetici se suis aculeis compungunt; illud vnicè aduertendum ducimus, proprias, atque indiuidu-

*Ex vitæ notione
vera mortis idea
desumenda.*

Singularium natura per ideas abstractas raro elucescit.

as rerum naturas per complexum multarum abstractarum idearum rarò perspicuas haberi posse. Quo fit, vt prisci physiologi, dum vniuersalem quandam vitæ rationem quærunt, quæ cum plant--animalibus, insectis, & monstris, cum piscibus, brutis, & hominibus adamussim congruat, nihil præter confusionem & ambiguitatem nostris mentibus ingerant. Exemplo sint quæ sparsim de vitæ conceptibus obscurè tradidit Aristoteles, & collegit intèr alios Licetus.

Aristoteles de Vita conceptus tradidit obscuros.

lib. de ijs qui viu. sine alim.

Res rerumq. modi vocum numerum superant.

II. Cum enim vocum numerus a rebus, rerumque modis longè superetur; cumque nomina a maioribus nostris aliquandò perperam rebus imposita fuerint; exindè sæpè oritur, vt, cupientes vna sub voce multas res comprehendere, incauti aut falsas, aut saltem obscuras ideas nostris cogitationibus infundamus, atquè admisceamus.

III. Qua de re pauca de vita hîc præfaturi, non de quacunque fluidorum motione intrà quæcunque resistentium, & cohærentium corporum organa, ex principio feminali proficiscentia, nobis agendum proponimus: (etiã si sciamus notionem istam vniuersales quasdam vitæ regulas, ac rationes in nobis vtcunque posse ingenerare) sed consilium est nostram mentem, spontè alioquin sua, per omnia viuentium regna vagaturam, ad perfectorum, vt aiunt, solummodò animalium

lium vitam inquirendam figere, ac seriò determinare.

IV. Quod fanè, vt assequamur, memoria repetendum est, ex Anatomicis & Chymicis, vitam in perfectis animalibus, (vt consultò de illorum sensationibus taceamus) non vni duntaxat, sed complexui plurimorum principiorum, ac duorum potissimùm deberi, organicæ nimirum structuræ solidarum partium maioris vsus, simulque congruæ mixturæ, fluiditati, ac moli partium liquidarum similis vsus, quæ tùm intestino nixu, tùm etiàm externa continentium pressione perennitèr eâ methodo agitantur in nobis, vt, animâ præside, liquida cum solidis mutuò sibi opitulentur, vicissimque manus præbeant ad motum. Scilicèt quemadmodùm ars, naturæ operum imitatrix, vt aduertit Hippocrates, qui primus mechanicam in medicinam inuexit, quemadmodum, inquam, ars hydraulicas machinas compaginauit, quas eadem aqua mota, dum relabitur, ad certum tempus mouet, iterumque mouetur: ita multiplici, ac nunquam satis admirando diuino artificio, idem Sanguis, chylo renutritus, qui in iam natis ab alterno cordis, pulmonum, ac thoracis motu pellitur, & quaquauersum per arterias mouetur, cum partim immutatus per venas, partim sub fluidi animalis crassi per neruos recurrat, ac relabatur in thoracem, pulmones,

Vita in animalibus perfectis solidorum ac liquidorum maioris vsus structuræ ac motui debetur.

Ars naturæ operum imitatrix

Hippocr. primus mechanicam in medicinam inuexit

& Cor, hæc rursùs viscera mouet, à quibus fuerat dimotus, eritque in posterum per singulas ætates mouendus. Similiter cerebrum suis cum membranis, quod liquidum animale, proprijs è glandulis secretum, pro sua parte ad mouendum Cor, & thoracem per neruos vndatim pellit, accepto vicissim a corde, ac thorace Sanguine pro illius viribus mouetur.

*Vita continuus est
fluxus refluxusq.
aeris sanguinis &
liquidi neruorum
per organa maio-
ris vsus*

Vita igitur perfectorum animalium nihil aliud esse videtur, quàm continuus, præside ac mouente animâ, fluxus, ac refluxus, plùs, minùsue sensibilis aeris, sanguinis, & liquidi neruorum per organa, & ex organis maioris vsus, satis probè constitutis, & mutuò, atque alternè plùs minùsue sensibilibiter agitatis, & agitantibus; ad quorum deinde motuum conseruationem mirâ profectò energiâ, miroq: inter se ordine concurrunt innumera alia organa sub glandularum, tubulorum, muscutorumq. specie, per viscera, artusq. dispersa; scilicet vt fluida partim renouentur, partim defœcentur, ac perficiantur.



Osten-

5

*Ostenditur mortem esse indiuiduam &
subitaneam, sed ex hominum opi-
nionē variè dispertiri.*

C A P U T II.



Væ per compendium in præcedenti cap. de vitæ ratione posuimus nos facile ducent ad ea intelligenda, quæ mortis subitanæ præsertim naturam, & discrimina, non omnibus obuia, possunt ostendere.

II. Is porro non sum, qui mortem repentinam, vt vulgò fertur, rarò censeam aduenire. Nullam enim noui mortem, nisi repentinam, siuè puncto temporis contingentem: scilicet, vt vitæ principium in puncto saliente, cum omnia concurrunt, subito excitatur: ita vitæ finis, cum aliquid ad vitæ necessitatem constantissimè deficit, repentè semper, hoc est puncto temporis, accidit. Iter vtique ad mortem, quod ægritudinem, atque agonem appellamus, nunc tardum ac longum, nunc plùs minùsue concitatũ, ac breue fecit, vt vulgus hominum mörtem, suaptè natura indiuiduam, distingueret in longam, breuem, ac subitaneam. Illud verò nunquam non maximâ admiratione me perculit, quî nimium

*Qualibet mors
est repentina.*

*Vitæ & mors pun-
cto temporis ac-
cidunt.*

*Cur Vulgo mors,
etsi indiuidua, in
plures tamen distin-
guatur.*

rùm fiat, vt delicata, ac perexilis hæc, affabrèque contexta, ac dimota fluidorum, solidorumque compago, quam vitam in animalibus dicimus, non semper citissimo, atque improviso morbo, sed tam sæpè naturali confecta senio, paulatim contabescat, ac dissoluatur.

III. At enim verò quanquam vniuersæ mortes puncto temporis naturâ contingant; earum tamen aliquæ nobis metu, ac dolore præuisæ, ac diù, quasi dixerim, præsensæ, aliquæ verò tacitè veluti subrepentes, tanquam inopinatæ nobis offeruntur, quæ quidem variorum mortium species varias, corrigendi mores hominum in præceptis labentium, occasiones, & causas moralibus potissimum Philosophis exhibuerunt; varias itidem Iurisperitis, Canonistis, ac Theologis rationes præbere solent iudicandi, discernendique circa ea, quæ dicuntur, aut fiunt ab hominibus in extremo vitæ termino constitutis. Qua de re fusè differit Paulus Zacchia. Physicis verò non tam morum, rerumque ciuiliū, quàm valetudinis curam gerentibus, illud præcipuè huiusmodi moriendi discrimina suggerunt, vt diuersas illorum causas diligenter perquirant, quibus detectis, & cognitis, ipsi iudicent, num præuisas necesse aliquo excogitato, vel experimentis comprobato remedio auertere queant; & num quæ inopinatè nobis adueniunt

*Varia mortium
species quot modis
viventibus utiles.*

*Quest. Med. leg.
lib. 2. tit. p. quæ-
st. 19.*

niunt, ipsæ quoque occulto aliquo, & peculiari præuideri signo, atque exhibito pharmaco, saltem ad animæ salutem, aliquantisper prorogari possint. Quòd si nec præuideri, nec prorogari vllâ arte valeant, id Medici assequantur, vt philosophiam experimentalem plenius illustrent. *Pulchrum est enim, vt scripsit Hippocrates, ea quoque addiscere, quæ in experimentum assumpta successu caruerunt, & cur successum non habuerunt.*

Philosophia experimentalis illustratur etiam ijs, quæ successu caruerunt.

Lib. de articul. n. 46.

Hippocrat. testimonium.


IV. Itaque huiusmodi rationibus ducti vtemur nos etiam cum vulgo ijs differentijs, & nomenclaturis mortium, quæ inter se distinguuntur non ex variâ ipsius necis naturâ, cuius vna semper, eademque proprietas est subitò inuadendi, atq. occupandi, sed solummodò ratione causæ, ac modi, nimirùm morbi, qui mortem infert; vel ratione nostræ mentis, quæ de futuro interitu filet, aut cogitat: idcirco nonnullas subnectemus definitiones, ac diuisiones, quas iuris per obscuros lethi libros lumen aliquod prælaturas non dubitamus.

Mortis differentiæ unde petendæ.



*Quæ vera sit in hominibus Mortis
idea, & undè discrimina pe-
tenda sint.*

C A P V T. III.



*Mors est totalis
cessatio motus æ-
ris, sanguinis, &
liquidi nervorum
in organis, & per
organa maioris v-
sus.*

Ors in hominibus, qui per-
fectorum animalium sunt
omnium opinione perfectis-
simi, quacunque ex causa,
& quomodolibet contingat,
est vera, & omnimoda ces-
satio motus æris, sanguinis, & fluidi ner-
uorum in organis, & per organa maioris usus,
quæ naturales suas motiones verè, ac om-
ninò amiserunt; ita tamèn firma, & con-
stans, vt per naturæ vires resuscitari non
possit, quam vtiquè animalium motuum ces-
sationem, seu dissolutionem nexus naturæ, vt
cum Aretæo loquar, necessariò comitatur, &
constituit discessus animæ, quæ, vt momen-
to temporis infunditur, ità momento tem-
poris, planè imperceptibili, seiungitur à corpo-
re, ac separatur.

*Varia mortis dif-
ferentia.*

II. Huiusmodi verò absoluta cessatio mo-
tuum animalium, ac discessus animæ à cor-
pore, quanquàm cogitatione citiùs perpetuò
contingat; nihilominus tamen, vulgaris
consuetudinis, clariorisque doctrinæ gratia,
distin-

distinguitur in mortem naturalem ; immaturam , & violentam ; singulæ verò in lentas , & subitaneas ; in præuifas , ac præfensas ; deniquè in improuifas , infenfibles , atque inopinatas .

III. Mors naturalis non ea solummodò dicenda est , quæ decrepitis , sed quæ , vel ijs *Mors naturalis quænam .*

accidit , quos , et si annorum numero metientes , passim vocemus pueros , adolescentes , ac iuuenes , adeò tamèn languidam suorum corporum constitutionem , nascendo , fortitos *Etiam in iuuenibus .*

fuisse videmus , vt breuiori temporis decursu , sed pari cum senibus fato , hebescentibus membris , vt Fabius loquitur , similes senectæ pigrescant , ac necem ipsam incurrant ; scilicet quod vtrobique sensim , ac sine sensu subtile illud , atque oleoso--uolatile , fluida , solidaque peruadens , ac dimouens , partim transpiratum deficit , partim non extricatum desideratur ; vnàque simul promptæ fibrarum distractilitas , & contractilitas , lento tabo deficiens , fluida vicissim excipere , & contra eadem opportunè oscillare non potest .

IV. Mors immatura illa esse videtur , quæ ex interno morbo proueniens , homines , cæteroqui fanos , & vegetos , de medio vitæ tollit . *Mors immatura qualis .*

V. Mors deniquè violenta ea firmanda est , quæ ab externâ , & cum sensibili , magnâque vi agente causâ , hominibus obuénit .


Violenta unde dicatur .

B

De

VI. De cæteris verò indicatis mortium
discriminibus ita procul dubio decernendum
putamus, vt eadem oriri dicantur à varijs
fentiendi, cogitandique modis, quibus ho-
mines diuturno, aut celeri, sensibili, aut in-
sensibili morbo, atque agone confectos,
cum signis lethalibus, vel sine illis subla-
tos videmus. De subitanea siqui-
dè, atque improuisa morte,
quippe quæ nostri scopus
est laboris, accura-
tiùs proximo
capite
agendum esse arbitra-
mur.


* * *



11

*De Natura, & differentijs repen-
tinae mortis.*

C A P U T IV.



Vbitanea, seu repentina mors, vltro hodiè, vel ipsi vulgo innotescit, quominus longo sermone sit pertractanda: illa siquidèm appellari solet, quæ per mor-

Repentinae mortis idea.

bum celerrimi motus homines vt plurimum, fanos, vel morbis inducias permittentibus detentos, absque vllò, vel certè breuiori agone de viuientium numero tollit; & cum plerunque inopinatò imperitis adueniat, terribile facit moriendi compendium.

II. In subitanea verò nece diligenter notandum est, morbi celeritatem, ex qua ipsa constituitur, aliquando esse nobis insensilem, & improuisam, vt occurrit. e. g. in syncope ex præcordiorum, vasorumq. sanguineorum,

Mors ex præcordiorum paralyse insensibilis.

paralyse, quæ, nihil nobis de illa cogitantibus, aut sentientibus, in mortem transire solet, si perseueret; aliquando verò ægrotis esse sensibilem, & curantibus præuisam; quemadmodum obseruamus in eademmet lethali syncope ex obstructione, & corrosione magnorum vasorum, hanc enim præcedere solent

Syncopem lethalem ex obstructione & corrosione magnorum vasorum quænam præcedant.

B 2

quia,

quia, quæ vltro præsentuntur, mortemque
reddunt Medicis non modò præuisam, sed
præcautam. Vt nihil penitus dicamus de
vulneribus summorum vasorum, de magnis
cerebri contusionibus, de fulminum ictu,
de carbonis empyreumate, de peste,
similibusque veneficis causis,
quæ nunc præsensæ, nunc
clanculùm, sæpe
tamen
repentè solent occide-
re.



*Agitur in genere de causis mortis, quam
vocat repentinam*

C A P U T V.



It statim notandum, nullam esse causam, seu ægritudinem, celerrimè occidere potentem, quæ vires suas per diuisibilia temporis momenta non exercent; & licet acutissimorum, atque maximè exitialium tempora morborum, quos (a) Ranchinus meritò subitaneos vocat, velocissimo cursu compleri aduertamus, nunquàm tamen in syncope, e. g., aut apoplexia, quantumvis ocysimè perueniatur momentum, in quo talis fluidorum, solidorumque quies inducta sit, quam post animæ discessum, mortem appellamus. Hoc autèm propterea hîc aduertimus, ne lector in posterum quæratur, si nos acturi de subitanæ, quam vocant, mortis causis, nonnullarum meminerimus, quæ clàm, aut palàm, semper tamèn cum tempore, nostrorum etiam sensuum iudicio operari solent.

*Subitanæ mortis
cause semper cum
tempore operari
solent.*

*a In suo Tract.
de morb. subit.*

II. Præterea monendum ducimus, quædam pro veris subitanearum mortium causis sæpe sæpiùs accusari, quæ potiùs occasiones

*Occasiones sæpe
confunduntur cum
causis subitanæ
mortis.*

b. Lib. 9. cap. 12. videntur habendæ. ^(b) *Fine namque vitæ nostræ, ut ait Val. Max., varijs, & occultis causis exposito, interdum quadam immerentia supremi fati titulum occupant: cum magis in tempus mortis incidant, quàm ipsam mortem accersant.*

*Mortis subitaneæ
causæ duplicis sunt
generis.*

III. Quanquam verò innumeræ sint causæ, quæ subitaneas mortes valent inducere, eæque variè inter se misceri, & complicari soleant, ut rarò simplicem inuenias; duobus tamè generibus, ad doctrinæ claritatem, aptè distingui posse videntur, quorum alterum est vitium solidorum, alterum fluidorum maioris vsus, dummodò vitium sit constans, & maximum. Etenim cum vitam posuerimus in motu liquidorum, ac solidorum prædicti vsus; certè quidquid citissimè, ac pertinaciter enunciata fluida, aut solida maximè lædere, vel alternos illorum motus, qui nullo artis, vel naturæ auxilio restituantur, tollere potest, repentinam mortem inducet.

*Solida & fluida
maioris vsus utraque tria; & qualia.*

IV. Et quoniàm tria sunt fluida, totidemque solida maioris vsus, quæ vitæ machinam potissimùm librant, scilicèt ex parte liquidorù primò aër, secundò sanguis, tertiò fluidum nervorum; ex parte solidorum, primò aspera arteria cum pulmonibus, cæterisque partibus respirationi inferuentibus; secundò cor cum appensis sanguiferis vasis; tertiò cerebrum cum nervis, præsertim splanchnicis: eaproptè ab horum altero, pluribus, aut omnibus, seorsim,
aut

aut simul, modò maximè, & constantissimè læsis, improuisa mors impendere potest: vt enim singula hæc, integra cum sunt, in vitæ beneficium, ita, si vitientur, in maleficium, vicissim conspirant, viresque consociant.

V. Cæterùm causas ab animo pendentes idèò peculiari capite à corporeis non distinguimus, quia idcirco improuisam mortem interdum accersunt, quòd solidas corporis partes, apud illos, quos interimunt, præcordia

*Animi passiones
quomodo mortem
improuisam accer-
sant.*

scilicet, & cerebrum, admodum,

imbecilla, penèq; effracta, aut inueniant, aut efficiant.

Vndè promiscuè de

vtroque cau-

farum

genere scribere constitui-
mus.



*De causis subitanea mortis ex parte
fluidorum maioris usus, & pri-
mò ex parte aëris.*

C A P U T VI.



Idimus hætenus in vniuer-
sum ex quibus fontibus im-
prouisarum, quas dicunt,
necium causæ fluere soleant;
nunc agendum, vt, saltem,
obiter, internoscamus mo-

dos, quibus aliquæ ex vnoquoque genere vi-
rès suas validissimas exerunt.

*Aer multifariam
ad necem subitam
conspirat.*

II. Et quidem ex parte aeris celerrimus
animalium interitus potest contingere, cum
vel moles eius, vel pondus insigni diminu-
tione, aut excessu laborant; vel id, quod sub-
tilissimum in aere ad vitæ necessitatem na-
tat, & intercurrit, magno aliquo vitio letha-
liter afficitur.

III. Diminuitur primò aeris moles in va-
cuo, per Boylei anthliam facto, vbi anima-
lia statim deficiunt, & mox emoriuntur.
Minuitur verò pondus in atmosphæra, pre-
mendis pulmonibus, & sanguine respectiuè
leuiori reddita; vt in conclaui nimis calido,
& quorundam montium cacuminibus, vbi,
vt fertur, celerem homines interitum subeunt,
nisi citò illinc reducantur.

E con-

IV. E contrario adaugetur pondus aeris, eiusque compactior euadit elater in quibusdam metallicis fodinis . Narrat etiam Boyleus, ex peculiari flante apud septentrionales vento, homines repente interire : tanta enim eius est densandi vis, vt vel hispanicum vinum congelaret .

V. Tandem magno aliquo vitio noxius, ac lethalis fit aer, vt ex fumo carbonum in conclauis clauso, ex constitutionibus pestiferis, ex veneficis odoramentis, aut sæua quadam, ac naturali mephiti; vt etiam ex sepulchris, aut frumenti puteis diu clausis, cum primò aperiuntur; quæ omnia solent inopinatò animalia suffocare, & interficere, densatâ scilicet, aut vitiatâ illâ, quæ per cranij meatus, & pulmonum porulos permeare deberet, particularum mixturâ, quæq; subtilis alioquin, & nescia quietis, sanguini fluiditatem, & neruis spirituosum vitæ igniculum erat conciliatura.


VI. Sed quoniam non vna, eademque omnibus in animalibus, aut pulmonum laxitas, aut fluidorum mixtura inuenitur; hinc non omnibus eadem nocent inquinamenta aeris, ex quo euenit, vt particulares narrentur pestes, quæ nunc solos homines, nunc hoc, vel illud pecudum genus interficiunt . Quinimò, cum vna, eademque minima solidorum textura, ac particularum sanguinem integrantium proportio, nec semper, nec sin-

C

gulis

Aer iuxta corporum dispositionem apparet noxius.

gulis hominibus accidat . Hoc fanè in causa
est, cur, sæuiente peste, in eadem vrbe, ac etiam
domo, alij pereant, alij seruentur. Adeò verum
est, ad labem, ex aere potissimùm con-
trahendam, eousque vale re corporis
dispositionem (quam vtpluri-
mùm intemperans, atque
incontinens vitæ ge-
nus infert)
vt propterea nonnullis
in medio Tiburi,
Sardinia
sit .



*De Causis Subitanearum mortium ex
parte sanguinis.*

C A P V T VII.



X parte sanguinis improu-
sam mortem intentant qua-
tuor præcipuæ eiusdem af-
fectiones. Primò præceps ac
talis diminutio molis eiuf-
dem, quæ, cordi, & cerebro

*Sanguis quadru-
pliciter mortem in-
tentat repentinam.*

subtracta, alternum horum viscerum motum,
& circuli continuationem penitus tollat. Hinc
sanguis a maioribus venæ cauæ, & pulmo-
nicæ truncis, vel a corde, summisque arterijs,
pulmonicâ scilicet, & aortâ, affatim erumpens,
improuisò vitam intercludit.

II. Secundò celerrima pariter, nimisque
abundans eiusdem sanguinis, præsertim effer-
uescentis, ad cor, atque ad cerebrum con-
fluxio, & quâuis ex causâ, mora pertinax,
vbi languescenti vi circumpulsivæ horum
viscerum validè renitatur, & vitæ cursum,
quem in motu posuimus, continuò suspendat;
vt in ijs obseruatur, qui, subito timore, mæ-
rore, vel gaudio perculsi, repentè concidunt;
aut qui nimîâ plethorâ saginati, vel qui post
corporis excalesationem, siue præsentē aliqua
euacuatione, frigido potu, vel balneo vtun-
tur. Non enim capacitas ad continendum

dum, & vis ad pellendum sanguinem in corde, & appensis vasis sunt indefinitæ, atque immensæ; verum proportionem respondent certæ, ac determinatæ moli, & grauitati eiusdem sanguinis, quem nonnisi citra violentam distractionem, ac resistantiam capere, atque vrgerè possunt.

III. Tertiò, vitam sæpè confestim adimit illud sanguinis vitium, quod ab hypochondrijs, ab vtero, vel aliundè, ac præsertim à ventriculo communicatū, propter summam acredinem, vel aliam externis sensibus non satis expositam qualitatem, præcordia, et cerebrum conuellit, & valde efficax est ad fluida, vel coagulanda, vel dissoluenda; quibus in casibus magna interdum feri copia, ex coacto intrà pulmonum, ac cerebri vasa sanguine, violentè extruduntur, & in thoracis, vel cerebri cauitatibus colligitur; hinc frequens erroris ansa apud minùs in arte peritos, qui, lympham in sinibus cerebri inuenientes, illam apoplexiæ causam, cum plerunque fuerit duntaxat effectus, accusare solent.

Lympha in cauitatibus collecta iniuste pro morbi causa plerunque ab imperitis accusatur.

IV. Postremò pestiferum quid, ac planè veneficum in sanguine vitium, haustum ex aere, ex ingestis per os, aut aliundè, recondi posse experimur, quod dato tempore, vires suas in spiritus, cordisque, ac cerebri fibras exerat, ignoto sanè, tacitoque molimine, ac veluti syderatione.

*De causis subitanearum mortium ex parte
te fluidi neruorum , seu spirituum
animalium .*

C A P V T VIII.



Vod deniquè ad tertium maximi vsus fluidum , nempe ad liquidum neruorum , seu spiritus animales , attinet , ijs profectò , vtpote a sanguine deriuatis , eadem vitia congruè aptari possunt , quæ mox ipsi sanguini attribuimus . Etenim primo loco subtractâ , vel interceptâ contumaciter tantâ sanguinis copiâ , quanta per carotides , & ceruicales

arterias , earundemque plexus ad cerebri , & cerebelli cortices naturalitèr fluxura est , vt liquidum neruorum separetur , statim debent et ipsi spiritus , qui ex solo sanguine seceruntur , deficere . Hoc sanè contingit in magnis sanguiferorum circa iugulum vulneribus , vel intrâ cerebrum rupturis , in quibus postremis , si fuerit ingens copia effusi sanguinis , eiusdem procul dubio defectum mortifera cerebri , ac cerebelli compressio sequatur necesse est . Possunt paritèr ijdem spiritus deficere ; cum eorum excursus per neruos ad præcordia , aliasque maximi vsus partes , penitùs interclu-

ditur

Multiplex spirituum defectus improvisæ mortis causa .

ditur vi conuulsionis, compressionis, vel obstructionis, e solo corporis vitio, aut simul animi motibus pendentium. Possunt quoque deesse spiritus ob inedia, ob motuum violentiam, ob nimias euacuationes, ob intemperantem veneris usum, præsertim in senibus, quos satis iam ætas spiritibus destituerat. Quod genus exempla inuenientur abundè apud Authores, quibus hic repetendis frustrà non immoramur.

II. Secundò, nimia etiam eorundem copia, quæ semper sanguinis vbertatem comitatur, nimiam pressuram, & inflatione glandularum corticalium cerebri, neruorum vias ita potest aliquando comprimere, ut fluxuro animali liquido omne spatium adimatur, fiatque propterea, ut, vel in cerebro spiritus non separentur, vel à cerebro (infirmatis villis extrudentibus, & aucta resistantia extrudendi liquidi) in præcordia non dimittantur; quod interdum contingit in ebriosis, alijsque, qui cibis, et potibus, plurimo sale, ac sulphure narcotico referatis, sese ingurgitant.

III. Tertiò, summa spirituum acrimonia ex eodem sanguinis vitio, atque ex lentis animi pathematibus, studijsque intensioribus induta, conuellendis pertinaciter præcordijs, & cerebro, homines, alioquin valetudinarios, ad idem repentinæ mortis genus potest adducere; ut olim in amplissimo Card. vidimus, & passim in exitialibus epilepsijs, quæ dicto citius,
in

Ipforum acrimonia æquè noxia.

Epilepsiæ transitus in apoplexiam ex Hipp.

in fortes definunt apoplexias, de quibus agit etiam ^(a) Hippocrates.

a lib. de gland.

n. 9.

IV. Sed quoniam ætiologiam epilepsiarum, quæ in apoplexias, mortemq; definunt improuisam, hîc scitu summopere necessariam putamus, idcirco attentè considerandum, conuulsionem membranarum, ac sinuum, nec non fibrillarum cerebri, in qua penè tota ratio idiopathicæ epilepsiæ posita est, multifariam, sed duplici potissimum modo contingere; altero scilicet, cum acre, ac ferè arsenicale, vel aliud quoduis liquidum, conuellendis nervis idoneum, non omnia simul cerebri segmenta, sed eadem successiuo quodam, atq; inæquali ordine, ac tempore irritat, & crispat; vndè nonnisi inæquales, inordinatæ, atq; inæqualiter contingentes conuulsiui artuum, ac thoracis motus, per totum ferè paroxysmum, respondent, ac obseruantur. Quod sanè quotidianum, ac vulgare huius morbi exemplum se prodit. Altero verò modo, cum eodem penè tempore, æqualibusq; viribus irritans causa, quaqua uersum per cerebrum diffusa, æqualiter, eodemq; tempore anteriores cum posterioribus partibus, dextras cum sinistris, immò fortè etiam ipsum cerebellum, adeò vehementer conuellit, vt, indè animale liquidum simul, & æqualiter in omnes contranitentes musculos validè expressum, post breuissimas artuum contorsiones, vniuersum corpus tensum, rigidum

Qua ratione huiusmodi transitus fiat.

dum, atq; immobile reddat. Hæc autem, posterior epilepsiæ differentia, ea præsertim existit, quæ si plùs iustò perseueret, frequentèr in apoplexiam transiens, subitum vitæ discrimen solet afferre: quia scilicet, non solum vasa cerebri, si a lenta priùs ægritudine fuerint debilitata, et in varices dilatata, ex illo forti, & vniuersali nixu conuulsionis, ac strangulationis, sanguinem prementis, atque intercipientis, & renixu eiusdem contenti sanguinis, mole, & acie suâ extrorsum vrgentis, sæpè diffiliunt; sed, vel maximè, quia idem sanguis, propter inæqualem suarum partium indolem, vno in loco volatili oleoso spiritu expers, viscidulus ex mora concrescit; alio autem fluxilior, & acrior, suos extra limites, per glandularum orificia, neruorumque tubulos exprimitur: propterea, quanquàm ipsa denique conuulsio deficiat, attamen, perturbatâ iam spirituum, materie, & in alienam naturam conuersâ, ipsdemq; cerebri, neruorumq; vijs, quâ dilatatis, ac discissis, quâ compressis, & obstructis; fortissima inducitur apoplexia, quæ plerunque subitam mortem accersit.

V. Tandem ignotum illud virus, quod in aere, ac sanguine superiùs notauimus, potest in ipsos animales spiritus deriuari, eundemque lethalem, ac repentinum effectum, producere; vt in peste, & venenis, infusis, vel ingenitis frequenter offendimus.

De

De causis subitanea mortis ex parte solidorum maioris usus, & primò ex parte instrumentorum respirationi famulantium.

C A P U T IX:



Luidorum vitijs iam explicatis, ad ea solidorum mala progredimur, quæ sunt mortalis huius exitus principia; illud iterum, iterumque

monentes, quòd vtriusque ordinis causæ mutuam sibi opem, ad subitum inferendum interitum, necessariò præbent; vt pròinde non inuenias vitium solidorum, repentè aptum occidere, quod motui saltem liquidorum non officiat; & vicissim fluidorum vitium lethale absque solidorum læsione.

Solida, & liquida mutuo concurrunt mortem inferunt improvisam.

II. Sed ad mortiferas causas, ex ipsis solidis ortas, propiùs accessuri, illud etiam accuratè aduertendum, solida maioris usus duabus conditionibus naturalitè instructa esse oportere, vt ad vitæ conseruationem conspicerent, nimirum, vt sint integra, scèu organicâ naturali structurâ donentur; deindè, vt in alterno constrictionis, ac distensionis motu perpetuò versentur. Quidquid propterea stru-

Ex parte solidorum maioris usus, quomodo subitanea mors.

D

cturam

aturam, vel motum prædictarū partium maximè, ocysimè, & pertinacitè lædet, mortem quoquè celerrimam, quam subitam dicunt, poterit inferre.

*Varia trachea,
& bronchiorum
mala repentè in-
terficiunt*

III. Sequentes itaquè præfatam initio solidorum distinctionem, asserimus primò, ex parte instrumentorum, respirationi inseruiendum, animalia repentè posse interire, si aspera arteria, eiusque bronchia obstructa, conuulsa, vel compressa, citissimè, ac penitus iter aeri per pulmones intercludant, ut in laqueo suspensis passim animaduertitur, vel in ijs, quibus solidum corpus inter deglutendum laryngis foramen occludat, vel pus, ruptâ vomicâ, vel aqua in demersis, per bronchia, loco aeris diffusa, non reuomantur; vel serum, aut sanguis in repentino pectoris hydrope pulmones, quominus ab aere impleri possint, subitò impediat. Tanta enim est hominibus spiritus necessitas, ut ad rem scripsit ⁽²⁾ Hippocrates, *ut siquidè omnibus alijs abstineat homo, neque cibum sumat, neque potum, possit tamèn plures dies ducere. Si cui verò spiritus in corpus intercipiatur, vel exigua diei parte pereundum sit.*

(2) lib. de flat.
n. 6.

IV. Deindè, si omnia simul inspirationis, atque expirationis instrumenta suis ab officijs citò, ac pertinacitè vacauerint, ob eundem impeditum aeri alternum intrà pulmones ingressum, atquè egressum, illicò extremi fati dies

dies est in procinctu; ob quam sanè rationem
 feruus ille barbarus apud (b) Galenum, coacto
 spontè spiritu, citam sibi mortem consciuisse,
 fertur; cuius profectò voluntarij, si verus
 est, effectus, multæ etiàm morbosæ, ex neces-
 sitate operantes, numerantur causæ, quæ sci-
 licet aptæ sunt diaphragmatis, sterni, costa-
 rumque structuram, continuitatem, vel mo-
 tum ita firmitè lædere, vt alternè supra pul-
 mones concidere, vel à pulmonibus recedere
 nequeant. Ita magna e. g. vulnera, quæ
 vtrunq; thoracis latus, septumque simul tran-
 sversum confodiunt, si aperta detinerentur,
 celerrimam mortem possent accersire: aer
 enim, per dehiscencia vulnera ingrediens,
 & forinsecus pulmones premens, æquilibra-
 retur cum aere, qui per tracheam intrà pul-
 mones labitur, ipsosque pulmones, veluti
 quandam immobilem stateram, cum totius cir-
 culantis sanguinis mora, vitæque perniciæ,
 suspenderet, ac libraret; & sic de quacun-
 que aliâ consimili prædictorum læsione orga-
 norum, respirationi famulantium, paralyfi
 nempe, aut conuulsione (dummodò subita,
 magna, ac pertinax fuerit) erit sentiendum.

*Spiritus sponte
 cohibitus mortis ca-
 usa apud Galenum.*

(b) 2. de Mot.
 muscul. cap. 6.

*Huius effectus
 causæ exponuntur.*

*Quanam thora-
 cis vulnera, exter-
 num cum interno
 pulmonum aerem
 æquilibrando, le-
 thalia.*

*De causis improuisarum mortium ex
parte cordis, & magnorum
vasorum.*

C A P U T X.



*Tria ex parte
cordis, & vaso-
rum ad vitam ne-
cessaria.*

Roximè dicendum venit de cordis, magnorumq; sanguiferorum vitijs, homines celerimè interimentibus; & quanquam omnia, quotquot dari possunt, ad id vni-
cè colliment, vt cordis motum penitus tollant, & lethiferam syncopem inducant; nihilominus tamen, cum ad vitæ necessitatem, ex parte cordis, tria considerari debeant; primò congrua structura tam cordis, quam magnorum vasorum; secundò viarum libertas, tertio vis mouens, quam facultatem pulsuiam dicunt; certè ex vnoquoque fonte maximi oriri possunt morbi, qui confertim perimant.

II. Primò, quòd attinet ad structuram, cum ad eam constituendam integritas, & continu-
itas fibrarum, villorum, & membranarum potissimùm exigatur; quotiescunque aut in-
flicto vulnere, aut lentâ exesione, in aneurys-
matibus, eò tandèm peruenitur, vt continui-
tas parietum cordis, & magnorum sangui-
ferorum auferatur, illicò, prosiliente vberri-
mè sanguine, mors yrget, vt historia V. eo-
rum

rum, qui hâc temporum constitutione repen-
tè interierunt, publico patuit in theatro.

III. Quòd verò spectat ad viarum liber-
tatem, quæcunque causa venam cauam, vel
pulmonicam, & aortam, aut arterias caroti-
tides eousque constantissimè, atque integrè
potest conuellere, comprimere, vel obstruere,
vt sanguis ad auriculas, & ventriculos perue-
nire, aut ab auriculis, & ventriculis in ma-
iores arteriarum ramos, atq; in cerebrum
fluere prohibeatur, subitum minitari potest
interitum, vt de magnis sanguiferorum po-
lypis, ac de tumoribus, vel ossibus, maiora
vafa comprimentibus, vel obstruentibus, me-
morant Obseruatores.

*Cordis vasorūq;
conuulsio, com-
pressio, & obstru-
ctio, mortis causa.*

IV. Denique, quia vis mouens cor non
solum pendet a congrua fibrarum structura,
sed etiā a fluidis nerueo, et sanguineo, idcirco
labefactari potest, vt hominem celerrimè in-
terficiat, si vtrunque liquidorum contumaci-
ter deficiat; (vndè syncope ex cordis, & ar-
teriarum paralyfi) aut quoduis aliud lethale
vitium contrahat, quod sanè accidit non in peste
solum, sed vbi os ventriculi, vel ipsum etiā
cor a vermibus mordetur, vt proindè (a) Tral-
lianus, (b) Mesue, & (c) Schenchiuss referant,
aliquos ex huiusmodi causis repen-
tè decessisse. Vermes enim cuiusdam speciei, non eroden-
do duntaxat, sed veneficum fortè liquidum
sanguini, ac fluido animali penitus hostile,

*Vis mouens cor a
fluidorum defe-
ctu, & vitio letha-
liter labefactatur.*

*Oris ventriculi,
& cordis morsus a
vermibus.*

a Lib. 7. cap. 11.

*b De ægrot. cord
cap. 1.*

*c Lib. 2. obs.
194.*

Cum lethalis.

vul-

vulneribus inspergendo , interimere solent .
 Quod sanè adeò ex antedictis per se clarum est ,
 vt summatim indicasse satis fore duxerimus .
 Illud solummodò memorandum hîc arbitramur , cordis , magnorumque vasorum motum ,
 diuidi in systolem , ac diastolem ; & licèt alter
 duntaxat ex ijs motibus sit agens , vterque tamen
 ad vitam est necessarius : idcirco fieri potest ,
 vt æger repentè moriatur , tùm si cor alternè
 constringi non possit (quod vel eneruatâ penitus
 structurâ , vel prædictorum maximo vitio liquidorum ,
 solet contingere) tùm si alternè dilatari nequeat ,
 quod , vel pertinaci eiusdem spasmo , vel ex causis
 illud validissimè comprimantibus , contractione nempe ,
 vel tumore cordis , pericardij , aut adiacentium
 partium , facilè oriretur . Sic olim vidimus ,
 inflicto vehementèr pugno sub cartilagine mucronata ,
 vitæ nodum ex tempore solum ; nimirum quòd eò loci vnâ conueniunt ,
 validèque per nerueam , ac tendineam cohæsi-
 onem iunguntur sinistrum ventriculi orificium ,
 diaphragmatis centrum , arteria magna , vena caua ,
 & pericardium ; excitâ idcirco repentè , ob fortem
 percussioneis vim , prædictarum simul omnium
 partium conuulsione , subitò pariter , apud imbecillem
 alioqui hominem , tùm respiratio , cùm sanguinis
 motus lethaliter potuit subsistere . Sic ^(a) Rasis
 affirmat , repentinas mortes ex cordis apo-

Systole, & diastole cordis &c. v. traq. ad vitam necessaria.

*Ex inflicto sub xiphoidæ pugno, ob mirabilem partium cohæsi-
 onem subita mors.*

a lib. 7. cont.
 cap 1.

ste-

stematibus euenire . Quamobrem , & cordis dolor, vt in coacis scripsit ⁽²⁾ Hippocrates, *seniori* a lib. 3. sect. 2. n. 17.

sæpius consuescens , repentinam mortem significat.

Præcordiorum enim conuulsio , si pertinax fuerit , atque per id temporis sanguis , qui intercurrere deberet, necessariam fluxilitatem, et crasim amitteret , (vt de cerebri conuulsionibus diximus) etiamsi postea spasmus ille cessaret, non ideo tamen cruor sublatae resistentiæ obsecundaret , cursumque suum repperet; idcirco subitam necem facillimè induceret . Interim verò , indicatas alibi causas omninò veneficas, ex ventriculo, vel alio quouis viscere deriuatas, consultò tacemus .

Vide latius tractatam de cordis dolore materiem cap. xix. n. 2.

V. Sed , cum studium detegendæ veritatis nihil nos vel præterire , vel dissimulare patiatur, aduertendum, istiusmodi veneficos succos, motum cordis subitò eneruantes, intrà nostra corpora cumulari, non vitio duntaxat fermentorum , animi pathematum , aliarumque etiam causarum, a cibis, potibus, atque aere deductarum; sed interdum (vt reticeam quæ palàm venena dicuntur) culpa *arcanorum*, vt iactant, remediorum, per quæ ignauum vulgus magnos morbos proffigatum iri confidit. Quamquam enim in vnaquaque Ciuitate , iustissimis constitutâ legibus, pseudo-chymici, & agyrtae, ne medicinam faciant, semper vetentur, & tamen semper retineantur; sanè accidit non rarò, vt aliquis, siue lue venerea, siue hy-

po-

Movſex Agyr-
tarum arcanis^a

pochoondriorum ægritudine vexatus, poſtquam rectam medendi viam, ob mali contumaciam, vel ſuos ob errores, prorsus inutilem expertus eſt, ijs tandem agyrtis, celerem ſalutem perfrictâ fronte pollicentibus, facile credit. At, cum miſer homo, antimoniale, mercuriale, aliudue huius farinæ medicamentum acceperit, proprio (vtinam poenitentiam delendo) diſcit experimento, ſe non ad ſalutem, ſed ad necem pseudo-mediciſ uſum fuiſſe. Etenim, huiusmodi remedia, ſi malè parata fuerint, veneni naturam induunt; ſi verò extra doſim, aut ſine methodo valetudinarijs corporibus propinentur, variâ ſubinde cum prauis hypochondriorum ſuccis initâ miſcelâ, & foedere, in toxicum conuertuntur, & hominem repente plerunque perimunt. Quod ſanè ubique locorum, ſed in Romana maximè Ciuitate, uſu venire dolendum, in qua multos proinde vidimus, ſumptis, per aliquot dies, huiusmodi arcanis, tandem ſtomachi, ac præcordiorum doloribus correptos, citiſſimè ſublatoſ fuiſſe. Vndè

(a) Brunonianis vocibus exclamare compellimur. O deplorandam Magiſtratum lenitatem, quâ impunè de corio humano ludere conceſſum, quâ datur ita temerè ſæuire in humana viſcera! O inexcufabilem diſſimulationem!

a In lex. Med.
verb. agyrt.

*De causis improuisarum mortium ex
parte cerebri, & neruorum.*

C A P U T . XI.



Vanquàm ex antedictis de vitio sanguinis, & liquidi neruorum abundè colligi possit, quales causæ ex parte cerebri, & neruorum, ad subitum producendum interitum, concurrant: ne tamen hæc nostra elucubratio alicubi manca videatur, præcipuo capite perstringimus eas causas, quæ cerebri, tanquàm solidæ partis, culpâ, homines citissimè de medio tollere possunt.

II. Cum verò, vt superiùs de corde monuimus, tria quoque in cerebro, suisque membranis, ac neruis, ad vitam summopere necessaria, considerari debeant; scilicet primò congrua structura; secundò viarum libertas; tertio motus alternus membranarum, & corticis eiusdem: sanè ex maxima, constantique prædictorum læsione, citissima mors, sub specie fortis apoplexiæ, potest accidere; mutuò scilicèt inter se conspirantibus prædictis vitijs; ita vt maxima structuræ læsio alternum motum, vasorumque libertatem tollat; quemadmodùm cessatio motus supponit, vel infert impedimentum viarum; deni-

*Tria in Cerebrō,
meningibus, &
neruis ad vitam
necessaria; & qua-
lia.*

E

què

què maximum viarum impedimentum statim naturalem cerebro motum aufert, & aliquale structuræ vitium inducit .

*Spirituum descen-
sus ad præcordia
inhibitus rep: mor-
tis causa .*

III. Primò itaque , si capitis , ac cerebri structuram spectemus , quotiescunque eadem ob magnum , profundumque vulnus , vel contritionem ita vitietur , vt inde tollatur membranarum motus , viarum , & fluidorum continuïtas , ad spirituum præsertim animalium , vsque in præcordia , descensum , illicò animal corrui , ac moritur ,

*Magna capitis le-
sio, & parua inter-
dum æquè lethi-
fera .*

IV. Neque solùm ex magna cranij , cerebrique dedolatione , aut contritione , quæ contentis partibus motum , & vasis continuïtatem auferat , homines breuè moriuntur ; sed interdum ex leuibus quantumuis creditis capitis contusionibus , & concussionibus , ob occultam vasorum rupturam , cum ægri maxime conualuisse videntur , tunc subito pereunt , rigore correpti . Ichor enim , aut sanies intrà membranarum , aut cerebri cuniculos colligi solet , acerrimamque , & planè veneficam , ex mora indolem nancisci , ob quam vniuersa cerebri , ac neruorum æconomia subuertitur ; nimirum , crispatis , aut syderatis neruis , & ruptis quandoque sanguiferis , vitale illud commercium cerebri cum corde , & cordis cum cerebro e vestigio intercipitur . Ita ^(a) Magnus narrat , nonnullos sternutantes , agitato violenter capite , disruptisque eo impetu me-
nin-

^a Exerc. 8. de Tabac.
Quomodo ex sternutatione , mors subita .

ningum vasis, subitò interijſſe. Quod ſanè à
(a) Famiano Strada exemplo piſtoris ſubur-
rani confirmatur, qui, cum tèr, ac vici-
ſternuiſſet, vigefimo quarto ſternutamento ani-
mam efflauit. Qua de cauſa, nempe ob vitæ
periculum, eueniſſe putat (b) Sigonius, (quan-
quam à Famiano redargutus) vt, conſueto iam
diù more, ſalutem ſternuentibus a Deo præ-
cemur; ſcilicet, quòd multi tempore D. Gre-
gorij Magni, cum ſternutarent, repentè ſpi-
ritum emittebant.

a lib. 3. prælect.
4. cui titul. cur
ſternuentes ſalu-
tentur.

Ex Famiano Stra-
da exemplum.

b lib. 1. de re-
gn. Ital.

Mos præcandi ſa-
lutem ſternuenti-
bus vnde.

V. Ab internis quoque cauſis lentæ in-
cerebro congeſtiones fieri ſolent, quæ poſt-
quàm diù ægros, nunc hemicraniâ, & ſo-
pore, nunc mærore, & epilepſiâ, iuxta va-
rium preſſionis momentum, variamue inter-
ceptorum ſuccorum indolem, diuexarunt; de-
nique, fortiffimâ inductâ apoplexiâ, repentè
iugulant.

Lentæ in cerebro
congeſtiones tan-
dem repentè iugu-
lant.

VI. Nouimus Equitem Commendatarium
ex familia de Puteo, qui floridioribus annis he-
micraniâ, atque hæmorrhoidibus obnoxius,
poſt quinquageſimum ætatis ſuæ annum in-
certis animi motibus, mærore præſertim,
exagitari cæpit, & paulatim ferè ad triennium
ſuppreſſis identidem marifcis, iugi grauatiuo
circa tempus ſiniſtrum dolore infixo, varias
vices ex medentium auxilijs expertus fuit.
Verùm, cum ex Lauretana Domo rediret,
(præcedente grauiore ſincipitis dolore, ad ſi-

Hiſtoria mirabili
confirmatur.

nistrum oculum protenso , vnâ cum animi
 luctu) Fulginei repentè in leuem apoplexi-
 am incidit , facie subpallidâ , tumentibus
 palpebris, respiratione liberâ , nisi illam sicca
 tussis frequenter interturbasset, quibus febri-
 cula per aliquot dies accessit ; a quo sanè
 paroxysmo , propter opportunam opem ei-
 dem præstitam a Clarissimo Physico Nucca-
 rino, antiquæ probitatis Viro, eoque nomi-
 ne mihi coniunctissimo, vindicatus fuit. Ro-
 mam deinde repetens occurrit nobis cum
 siccâ tussi , meticulosior , taciturnus , obliui-
 osus ; quinimò decursu autumnii, & hyemis
 1694. recurrentibus semel , vel bis in vno-
 quoque mense apoplecticis insultibus , infeli-
 cem planè vitam duxit . Tandem die 26. Ia-
 nuarij 1695. cum se melius habere videretur,
 fortissimâ correptus syderatione , subitò inte-
 rijt. In cuius cadauere præcipuum fuit ob-
 seruare in posteriori hepatis parte, quâ dia-
 phragmati adnectitur, tumorem folliculatum,
 æruginosâ veluti argillâ plenum . Vndè se-
 ptum transfuersum eo loci subrufam coloris
 labem contraxerat ; atque indè siccam tussim,
 quâ æger tenebatur , profectam existimaui-
 mus . In Cerebro autem omnia piæ matris
 sanguifera , ac lymphatica vasa penè in varic-
 es abierant . In ventriculis copiosa serofitas
 continebatur . Sed malorum summa latebat
 sub dextera parte ossis frontis ; vbi dura , &
 pia

*Tussis sicca ex di-
 aphyragmatis labe
 ab hepate contra-
 cta.*

*Lymphatica Piæ
 matris varicosa:*

pia mater in multam crassitiem euaserant, & finitimus cerebri cortex concreuerat in crudum abscessum substantiæ ferè polypeæ, & magnitudinis æqualis illi pomo, quod ap-
pium redolens appellatur. Interim profun-
dior cerebri cortex, eiusque medullæ pars,
quæ tumori substernebatur, adeò difflebat,
vt puris crasim æmularetur.

*Ingens abscessus
polypeus menin-
gum et corticis ce-
rebrî.*

VII. Hoc fanè extispicium non tantum
admirationem excitat, propter ipsam tumo-
ris in cerebro collecti conditionem, quan-
tum propter situm; vt, cum æger de graua-
tuo sincipitis, & oculi sinistri dolore perpe-
tuò quereretur, morbi causa in dextero me-
ningum, cerebrique latere inuenta fuerit. De
cuius phænomeni ratione plura differemus in
scholio dissectionis cadaueris Illustrissimi Præ-
fulis Spadæ.

*Doloris sincipitis
et oculi sinistri in
opposita parte de-
litescens causa.*

VIII. Nouimus item Eminentissimum,
Sacchettum nostræ, ac doctissimi iuxta, at-
que humanissimi Ioh: Trulli curæ traditum,
simili congestione laborasse, cuius breuem
tùm historiæ, cùm extispicij descriptionem, a
nobis exhibitam diligentis. (a) Pacchiono (Iu-
ueni virtutis, & ingenij meritis mihi iucun-
dissimo) huc congruè transferemus. Vir igi-
tur Eminentissimus sexagenario maior, a sup-
pressa podagrâ melancholicus, immemor,
atque epilepticus euaserat; sedulâ tamen cu-
randi methodo, præsertim vini abstinentiâ,
hinc

*a Quam inseruit
sux dissertationi
epist. de gland. et
lymph: mening.*

*Hydatis insignis
supra cerebrum.*

hinc sex supra annos vixerat; Tandem repente sublato, in eius dextera corticali cerebri parte versùs occiput, insignis hydatis, oui columbini molem adæquans, inuenta est, laxa, & lacera, quæ construi videbatur ex ipsamet pia meninge, suis potissimum dilatatis, scissisque lymphaticis, interceptoque liquido. Quod sanè, vel nudis occurrebat oculis ex fluido intus contento. Erat enim lymphæ partim subtilis, & flava, partim in crassam veluti gelatinam conuersa. Vbi, quod mirabilius apparuit, id certè fuit, vt istius folliculi basis, cortex nempe cerebri, ad talem resistantem consistentiam deueniret, quæ planè scirrhusa videretur.

*Quid ex addu-
ctis historijs dedu-
catur.*

IX. Ex his verò duobus exemplis satis patet, obstructis paulatim sanguiferis, ac lymphaticis, posse in cerebro congeri tumores, intercipientes liquida, maximopere viscosa, simulque acria, vel quouis alio modo capiti, & nervis hostilia, quæ, ruptis tandem alicubi repagulis, per proxima vasa diffuant, & quaquauersum subito diffusa, tum animalium spirituum crassim penitus inuertant, tum eorundem vias intercludant, & meningum, minimumque cerebri motum, vnà cum vita penitus tollant.

X. Secundò, quanquam de viarum libertate satis dicat, qui de structuræ vitio agit; adhuc tamen monendum censemus, aliquando,

do, etiamſi vaſorum in cerebro ſtructura nuſquam appareat vitiata, fieri poſſe, vt celerrimè mors inuadat, ratione ſolius repentinæ totalis preſſionis, & obſtructionis vaſorum inferentium, ac referentium, nec non minimarum glandularum cerebri, ac cerebelli, quod præſertim obefis interdum accidere videmus, in quibus ob celerrimam ſanguinis ſtagnationem non modò ſubita vaſorum obſtructio, ſed ſubita quoque paralyſis membranarum, ſinuum, totiuſque cerebri corticis proficiſcitur, cuius exemplum dabimus hiſt. I. illorum, qui hoc anno repentinè interierunt, de quibus etiam habitus eſt ſermo ſuperiùs cap. VII.

Obefis repentina totalis vaſorum intra cranium obſtructio, facilis.

XI. Facit pariter ad viarum interceptionem quidquid neruos, qui ad præcordia, & ad meninges feruntur, ita comprimere poteſt, vt animalium ſpirituum ad eas partes curſum penitus intercludat. Ita mulierem, quam aſtonia, & brachij paralyſis diù detinuerat, repentinè mortuam aperuimus, in qua nihil conſpicuum inuentum fuit, præter ſcirrhofam glandulam, quæ ſub cerebello, ad internum principium ſpinalis medullæ, prædictos neruos validiſſimè comprefſerat. Quid non etiam iidem nerui extra cranium obſtructi, aut comprefſi, poſt aliquas præcordiorum paſſiones illatas, repentinam mortem inferre valent, quamuis nulla ſenſi-

Nervorum ad præcordia & meninges tendentium comprefſio mortifera.

a De auris part.
vfu cap. 5.
Nobile Valsalvæ
experimentum.

bilis causa in ipsis cadaueribus postmodum inueniatur ? Constat enim per diligentissimum ^(a) Valsaluam, cordis nervos ad iugulum canis arctè constrictos, & illicò solutos, adeò in structura insensibili labefactari, vt canis intra aliquot dies, eodem modo, ac si nervi illi amputati essent, indè moriatur, licèt ijdem rursus inspecti, in se nullum sensibilis læsionis vestigium ostendant. Quod sanè multò faciliùs potest contingere, si sanguis, per cor deuoluendus, ob minorem, quàm par est, fluxilitatem, ac volatilitatem, motui renitatur, quod hisce in casibus plerunque contingit.

Meningum, &
cerebri motus mul-
tipliciter ablati.

XII. Postremò, membranarum, & cerebri motus, vt de corde diximus, tolli potest, vel ob recens inductum structuræ vitium, quod ex magnis vulneribus, magnâue ossis depressione accidit; vel ob repentinam meningum, totiusque nervosi generis paralytim, quæ ex narcoticis, alijsque cerebrum afficientibus venenis oritur; vel si præhendat fortis, & pertinax conuulsio, quæ, omnia cerebri vasa strangulando, cursum sanguinis, lymphæ, ac spirituum illicò, & pertinaciter intercipiat; vt contingit in mortiferis epilepsijs, ac potissimùm in magnis, ac subitis animi pathematibus, de quibus egimus cap. VII. quæque in ipso statim cerebro vires suas lethaliter interdum exercent: Etenim, cum

Animi passiones
cur lethales.

cum huiusmodi animorum affectiones , per
 externos sensus a cerebro suscipiantur , si
 viscus hoc naturâ , morbo , vel ætate lan-
 guidulum , simulque fluidum , acie , ac mole
 intrâ cerebri vasa redundans, inueniatur , facile,
 propter subitam vasorum omnium strangu-
 lationem , epilepticam apoplexiam inducunt ,
 hominemque ex tempore tollunt ; cuius pro-
 fectò rei euidens ante plures annos habuimus
 experimentum in Optimate quodam sene , ac
 valetudinario , qui , dum tranquillè alioquin
 cœnaret , improuisè accipiens nuncium de
 aduentu sibi neque grato , neque honorifico
 consanguinei sui , repentina syderatione sub-
 latus est . In huius verò dissecti cadaueris ce-
 rebro vasa vndique tumida ex intercepto , pro-
 pter subitum animi pathema , sanguinis , lym-
 phæque cursu , indeque cauitates tum ful-
 corum , cum ventriculorum vsque ad spina-
 lem medullam , exundante fero , repletæ oc-
 currerunt .

*Exemplo res illu-
 stratur .*

XIII. Ad eundem postremò censum spas-
 modicarum passionum cerebri , & neruorum
 splanchnicorum referri possunt dolores im-
 manes , qui ex artuum , sphacelo correpto-
 rum , amputatione oriuntur , si eâ , quâ non-
 dum mortui sunt , parte (præsertim si de-
 biles fuerint) rescentur ; de quibus apud

*Artuum sphace-
 latorum amputa-
 tiones interdum
 subitæ mortis cau-
 sa ex Hip.*

(^a) Hipp. scriptum legimus, *Magnum periculum* a lib. de artic. n.
est , ne præ dolore in animi deliquium incidant . 8.

Talia verò animi deliquia multos iam e vestigio peremerunt.

Tirillus inter priscos egit de mortibus repentinis.

XIV. Hæc de subitaneorum mortium causis attulisse satis duximus, ne liber in magnum volumen euaderet. Qui ad curiositatem explendam longiorem exemplorum feriem petierit, penum habebit paratam inter veteres quidem in vna Dominici Tirilli Translatione de causis repentinæ mortis, qui fanè Auctor fuit cùm rebus philosophicis, tùm Medicis (vt temporibus illis) satis eruditus. Inter nostros verò in miscellaneis naturæ Curiosorum Germaniæ, in Boneti sepulcreto, & medicina septentrionali, alijsque compilatorum libris, qui priscorum, recentiorumque observationes breui, & concinnâ methodo ad nos traduxerunt.

* *

*



*Subitanei morbi hætenus expositi ad
tria capita rediguntur, ad Suffo-
cationem, ad Syncopem, atque
ad Apoplexiam, quæ
et simul plerun-
que concur-
runt.*

C A P U T . XII.



T consulamus ijs, quos fa-
cile tædet multitudinis idea-
rum, quæ veniunt conci-
piendæ, ad intelligendas pos-
sibiles subitanearum mor-
tium causas, earundemque
operandi modos, opportunum censemus hoc
loco tribus tantum malorum speciebus vni-
uersam hanc, penèque immensam rem so-
lertèr complecti, quæ quidè species sub ge-
nere morbi attoniti, & sensuum, respiratio-
nis, pulsusque officia plùs, minùsue tollentis
comprehenduntur. Cum enim repentinæ mor-
tes ex certis tantummodo repentinis morbis
oriantur, horum sanè interimere potentes sunt.

II. Primò quidè, morbi omnes, qui,
ex aeris vitijs, aut læsionibus instrumento-
rum, respirationi inferuentium, producti, con-

*Sub genere mor-
bi attoniti tota
res ista cõprehen-
ditur.*

festim interficiunt; id fanè faciunt, quia vitam alterno aeris, & illius, quod in aere natat, corporis pabulo defraudant, ac proinde ad præcipitem suffocationem, aut præfocationem tutò referri debent.

*Aer sanguinem
fæcundat.*

*Prohibita respi-
ratione, quomodo
cor, & cerebrum
lædantur.*

III. Cum verò aer reciproca inspirationis, atque expirationis lege, sanguinem obscuro, ac penè ignoto mouente fæcundet, eundemque clarâ nobis pulsione per venam pulmonicam versùs læuum cordis ventriculum vrgeat; idcirco, prohibitâ respiratione, statim vniuersa sistitur circulatio, indèque cor, & cerebrum, proprijs motibus destituta, necessariò in syncopem, atque apoplexiam incurrunt.

*Corde etc. affecto
(in ijs scilt. qui su-
bito moriuntur) cur
cerebri et pulmo-
num motus sistan-
tur.*

IV. Secundò, morbi omnes, ex sanguinis, aut cordis, magnorumque sanguiferorum vitio exorti, si ægros ex tempore interimant, id moliuntur, quia alternum cordi motum celeritè auferunt, ac propterea syncopem inducunt, ex qua facilè est concipere, quomodo cùm cerebri, tùm pulmonum motus continuò sistatur, seu quomodo apoplexia, & suffocatio ex necessitate succedant.

*Cerebro læso, idè
cordi et pulmonibus
accidit.*

V. Postremò, maxima illa spirituum animalium, & cerebri mala, quæ subitam necem accersire posse probauimus, non aliò tendunt; quàm vt motum, ac sensum internis visceribus, externisque organis, & artubus non illicò solùm, sed omninò tollant, seu fortissimas apoplexias inducant. At

verò , positis huiusmodi apoplexijs , e vestigio motus cordis , atque pulmonum extinguitur , ac proinde syncope , & suffocatio necessariò suboriuntur.

VI. Sed non ipsa solùm infelix prædictorum trium successio malorum; quin lethifera etiam eorundem complicatio ut plurimum , tanquam subitarum mortium causa , vno , eodemque tempore concurrit , tunc præcipuè , cum ab interno , fluidoque principio ijdem morbi dependent. Non enim humoralis causa , quæ , cum mouetur , e. g. potens est in cerebro inducere conuulsionem , aut paralyfim eorum neruorum , qui ad viscera maioris vsus feruntur , hominem subito interimeret , nisi per eadem viscera cum sanguine diffusa , in corde syncopem , in pulmonibus præfocationem , in cerebro apoplexiam eodem ferè momento temporis plerunque machinaretur . Hoc sanè præcipuè apparebit ex ijs , quæ in obseruationibus trademus . Magna siquidem vitia fluidorum , statim cum solidis partibus communicantur , & vicissim solida , magnoperè labefactata , fluidas partes diù incolumes superesse non sinunt. Vndè scitè , prudenterque aiebat ^(a) Hippocrates , *Consensus vnus , conspiratio vna , consentientia omnia* . Quod certè non pro seruandâ solùm , sed pro destruendâ animalium œconomîâ intelligendum esse putamus.

Magna liquidorum vitia solidis exitiâlia , & contra.

a de alim. n. 4.

Re-

*Recensita Causa subitanearum mortium
inuincibiles , aut vincibiles
existunt .*

C A P U T XIII.



*Præfocati etc.
ad vitam natura-
liter quâdoquē re-
stituuntur .*

*Subita mortis ca-
usæ non omnes in-
uincibiles .*

Vemadmodum sæpè factum est , vt morbi , qui ad suffocationem , ad syncopem , vel ad apoplexiam referuntur , hominem inopinatò occiderint ; ità non dubitamus ,

quin aliquis suffocatus, aut præfocatus, syncope grauissimâ , vel fortissimâ apoplexiâ correptus ; etiamsi pro mortuo habeatur, ac prædicetur ; ad vitæ tamen officia , naturali interdum viâ , redire possit . Quare inter morbos , inopinatam subitamque mortem inducere potentes , alij penitùs inuincibiles , alij verò , vel ipso negligentia , ac temporis beneficio , vel medicamentorum ope , vincibiles sint oportet .

Inuincibiles quæ. II. Inuincibiles , hoc est omninò insuperabiles , ac verè , subitòque interimentes , sunt omnes morbi , qui , ex insigni aliquo intrà præcordia , cerebrum , vel abdomen sanguifero vase , spontè , aut violenter disrupto , originem habuerunt , quique ex discissâ quomodolibet in iugulo , vel in artubus arteriâ , per quam vniuersus sanguis iam effluerit , dependent .

In-

III. Inuincibiles quoque sunt, qui ex ablata continuatione cerebri cum nervis, præfertim cum scissio nervorum iungitur vulnere, ac discissioni arteriarum, & viscerum. Vndè inter genera mortium expeditissimum æquè, ac certissimum illud est, à quo nemo vnquam euasit, capitis nimirum, vel trunci dissectio; nisi per lulum excipere velimus illum, quem lepidissimus inter etruscos Poetas fabulatur, medium ense acutissimo diffusum, morte nondum cognitâ, quippe partibus adhuc hærentibus, arma tractare non destitisse.

(a) *Così colui del colpo non accorto
Andava combattendo, & era morto.*

a Bern. in suo.
Poemat. ital. Orland.
innam. lib. 2. cant. 24. ottav.
60.

IV. Inter subitaneos morbos, qui itidem sunt inuincibiles, numeratur quoque fortis apoplexia, quæ decrepitis accidit ob concursum duarum simul causarum, hebetudinem, scilicet solidorum ad circumpellendum, ac defectum partium oleoso -- volatilium, quæ ipsa solida, fluidaque mobilia reddunt.

*Fortis senum
apoplexia inuincibilis.*

V. Simile de illa syncope iudicium ferendum erit, quæ ab inductis paulatim erosione, polypo, tuberculo, lapide, & consimilibus, in corde, eiusque vasis, motum sanguinis inhibentibus, proficiscitur; de quibus aliqua etiam dicemus cap. XIX.

*Syncope pariter,
quæ ab erosione
etc. inducitur.*

De-

*In genere, qui-
nam morbi insupe-
rabiles,*

VI. Denique paucis concludendo, causæ insuperabiles repentinæ mortis intrà vires naturæ, vel artis, sunt omnes ij morbi, qui valent inducere integrum defectum sanguinis, vel tollere continuitatem cerebri cum nervis, aut cordis, & insignium sanguiferorum cum cerebro, alijsque magni usus visceribus, aut aliæ huius generis maximæ affectiones, quas sigillatim piget enarrare.

*Vincibiles a me-
dentium Audacia,
& naturæ vi, qui-
nam.*

VII. Vincibiles verò appellamus improvisarum mortium causas, quæ, etiamsi plerunque viæ sint ad interitum, aliquando tamen, vel extrà humanam spem, ipsâ curantium audaciâ, sed non planè temeritate, imò ipsius, (quod frequentius accidit) intromouentis naturæ energiâ, mirabiliter fugantur. Ad huiusmodi autem morbos ij præcipuè referuntur, qui à simplici, celeriterque facta, obstructione, pressione, aut conuulsione instrumentorum, motui aeris, sanguinis, ac liquidi animalis inseruientium, dependent. Ita correptos apoplexiâ ex solo infarctu vasorum, vt Timocratem in Helide, apud (a) Hippocratem, interdum simplex curauit inedia, cuius beneficio, obstructo cerebro, non solum nihil additur; imò verò per validiorem indutam sanguinis subtiliationem, & motum, aliquid perpetuò detrahitur. Ita hystericas, & præfocatas, mortuis quantumvis adscriptas, per ipsam, quæ necem intulisse visa est, pa-

*Apoplexiam per
inediam curata a-
pud Hippo.
a v. epid. hist. 2.*

*Rei ratio assigna-
tur.*

*Hystericarum pa-
roxyismi cur solæ
temporis resur-
quandoq; superen-
tur.*

roxyfmi diuturnitatem , aliquandò reuixisse
 comperimus ; scilicet vsurâ temporis (cum
 cætera sana sunt) subtilissimum illud mias-
 ma , quod intrâ neruorum texturam inter-
 ceptum , enormitèr conuellebat , sensim oleo-
 sis halitibus læuigatum , subtiliatum , ac cir-
 cumpulsum effluit , liberumque reddit corpus,
 quod mortali tensione riguerat . Vndè pru-
 dens Medicus rarò tam abiectam de istiusmo-
 di improuisò mortuis habere debet spem , vt
 sit omninò desperatissimus : nimirum boni
 Medici erit (dummodò internorum vasorum
 rupturæ , aut contumacissimæ obstructions ,
 pressiones , aliæque prorsùs inuincibiles visce-
 rum , neruorumque affectiones abfuerint) su-
 bitò fateri , quàm maximus timor , quàm mi-
 nima sit spes , vt omnem absque famæ suæ
 detrimento mouere lapidem , ægrumque , si
 adhuc viuit , ab orci faucibus possit eripere.
 Ita enim homo fit homini Deus , vt pulchrè
 aduertit ^(a) Tiraquellus , cum Medicus morti
 proximos , ac veluti adiudicatos , atque
 etiam quosdam , qui mortui pu-
 tabantur , reddidit sanitati .

*Medici spes his in
 casibus qualis .*

^a De Nobil.
 cap. 31. n. 434 , &
 597.



*De signis improuisa mortis , & primò
de simulatis , ac suppositis , seu
supplantatis mortibus .*

C A P V T XIV.



Voniàm hætenùs qualesim-
prouisarum sint causæ mor-
tium ostendimus , exempla-
q; ex parte tùm fluidorum, cùm
solidorum, de quibus dice-
re oportebat , subiecimus :
iàm hinc, quibus signis non tàm præsens , quàm
imminens , ac futurus inopinatus interitus sit
cognoscendus , breuitèr inquiramus .

*Fiſſorum mortu-
orum calliditas de-
ſegitur.*

II. Principio itaquè non ſum ignarus, va-
ferimos inueniri homines , qui , vt faciliùs
ex commeritis euadant ſupplicijs , macerato
priùs per inedia corpore , eique inducto
per ſulphuris halitum ſquallore , iniectis itidem
validis ad brachia vinculis , tandèmque , blan-
do epoto narcotico , aut ſpontè parumpèr
coacta reſpiratione , ſubitò mortuos ſe fin-
gunt ; quod , vt expeditiùs patrent , cuſtodem,
amicum , vel ſeruum , quo ex pacto , & con-
uentu rem agant , ſibi adſciſcunt . Sed iſtos,
planè irridendos , ac peiori deinceps pœna-
mulctandos , promptum eſt deprehendere , ſi
eorundem denudata , atque excuſſa corpora ,
ſtagris , ferro , igneque , ſi opus eſt , tra-
cten-

stentur. Arterias enim, solutis vinculis, rursum in carpis micare; & respirationem, violentè coactam, in libertatem redire sentiemus. Quod Iudicum causâ monendum duximus, ut sint posthac, aduersus huiusmodi fallacias, cautiores.

III. Deindè improbi scelerum machinatores proprios sæpè hostes, vel alios, lucri causa, quantumvis planè innoxios, veneno, strangulatione, vel exili intrâ præcordia vulnerare perimunt; & mox ad veram necis causam occultandam, eosdem in flumen, aut puteum demergunt, vel per scalam præcipites agunt; quò nimirum sponte, vel casu mortui palam iudicentur. Nunc, si quis particularia signa ad has, vel illas efficitas, aut veras subitaneas neces detegendas, pro relationibus, præsertim in fori vsum, sedulus atquè curiosus exoptet, adeat ^(a) Fortunat. Fidel., & Quæstiones med. legal. Pauli Zacchiæ.

a lib. 4. de relat. medicorum per totum.

Nos enim hîc causas, & signa potissimum naturalium affectionum quærimus, non forenses coniecturas.



*Exponitur difficultas inueniendi certa
signa, quibus dignoscantur qui
natura, non arte pseu-
do-mortui occur-
runt.*

C A P U T XV.



Illa utique nec præterire volumus, nec debemus, quibus non hominum docemur calliditatem, sed vitia, dixerim, an fuetos naturæ motus, quæ finit aliquandò, ut ij, qui nondùm mortui sunt, pro talibus habeantur.

II. Profectò non ex aliorum duntaxat historijs nobis innotuit, multos, qui decessisse credebantur, vel propè sepulcra euigilasse; sed nostro etiàm experimento id ipsum comprobatum recordamur in Viro nobili, adhuc viuentè, qui viginti ante annos, cum ei iusta persoluerentur in Templo, ad motuum, sensuumque munia omnium cum terrore magis, quàm admiratione rediuit. Meritò idcirco exclamat ⁽²⁾ Fabius -- *Vndè putatis inuentos tardos funerum apparatus? Vndè quòd exequias planctibus, ploratu, magnoque sem-*

² Declamat. 8.

semper inquietamus ululatu ? quàm quòd vidimus frequenter post conclamata suprema redeuntes -- . Prudentèr igitur lege vetitum est quoscunque mortuos , & eos præsertim , qui repentè decesserunt , statim sepelire .

III. Horret meminisse ^(a) Vesalium , neglectæ olim Anatomes parentem , ad mulierem hysterica , quæ mortua credebatur , disseccandam accersitum , eò negligentia suâ fuisse perductum , ut vix alteram nouaculæ impressionem adegerit , cum illa motu , & clamore se uiuam ostendit , quæ sanè res Virum odiosum , ac detestabilem reddidit ; idcirco nil priùs sibi esse duxit , quàm se fugâ subtrahere . Sed ne sic quidè m intestinum terrorem , ac carnificem , quo iudice , nemo nocens absoluitur , fugere potuit ; mæstitiâ enim confectus non multò post , magno rei , et publicæ , & medicæ detrimento , interiit ,

IV. Difficultas autè m noscendi illos , qui , etiamsi mortui nondùm sint , mortui tamèn apparent , exindè oritur , quòd motus alterius aeris , sanguinis , & succi neruorum per organa maioris vsus (in quo sanè motu omnem vitæ rationem consistere dictum est) nostros aliquandò sensus propè fugit , ut ferè soli naturæ innotescat . Vicissitudo nanque motionis pectoris , docente potissimùm ^(b) Galeno , tam minima esse potest , ut , dùm costæ , ad sternum pertingentes , non mouentur , sed

^a Ex Parço lib. 23. cap. 46.
Turpis Vesalij calamitas .

Cur pseudomortui difficultè a mortuis distinguantur .

^b 8. De admistr. anat. , & 4. de loc. affect. *Illorum thoracis , & diaphragmatis motus , qualis .*

*Cordis motus, qui-
nam.*

*Pulsus cur habe-
ant tactui imper-
ceptibilem.*

*Eorum liquidi
nervei motus.*

*Menti, & sen-
sibus non omnia
innotescunt.*

*a Quæst. Med. le-
gal. præsertim
conf. 79. n. 21.*

*Inter signa mor-
tis certissima ca-
daueris fetor, ex
Zacchia.*

solum diaphragmatis centrum tantisper tre-
trepidat, inermes oculos plerunque fallat.
Sanguis itidè, (integris cæteroquin existen-
tibus vasis, proprioque oleoso-volatili sale
fluens) ob solam contractionem summarum
venarum, & auricularum, nudamque cordis,
quasi dixerim, iectigationem, tacitè interdum
per ventriculos vrgeri, & per arterias, vt
passim per venas, adeò lenitè deuolui potest,
vt vitalis hic motus pulsus in solis carpis
exploranti penitè abscondatur. Idem planè
de neruorum liquido sentiendum, quod,
cum fluidissimum suapte natura sit, exiguis
adeò vndis per neruos præcordiorum non-
nunquam agitari potest, vt reliquum illud
minimum animalis vitæ igniculum, ferè nobis
ignotum, conferuet. Vt enim non omnia in-
corporea mentibus, ita nec semper sensibus
omnia corporea manifestò patent; quibus
sanè factum est, vt ^(a) Paul. Zacch. nullum,
quod aliquando non fefellerit, præsentis mor-
tis inuenerit indicium, præter cadaueris liuo-
rem, æstuationem, ac fœtorem.

V. Sed quanquàm qui de pseudo-mor-
tuis iudicare debet, obscuram prouinciam su-
scipere cogatur, & quotidianum, ac fre-
quentissimum sit, creditum vulgo mortuum,
re ipsa decessisse: nihilominus tamen non-
nulla indicia speculari operæ pretium erit,
quibus eos discernamus, qui syncope, aut
for-

fortissimâ apoplexiâ detenti , occubuisse videntur .

De signis , quibus pseudo-mortui a verè mortuis distingui possunt .

CAPUT XVI:



Hoc antè omnia maximè aduertendum censemus , non semper Artis defectui ; sed artificum , atque assidentium incuriæ plerunque adscribi debuisse , quòd ægri, nondum verè mortui , derelicti fuerint , ac vespillonibus traditi , idque potissimùm pestis tempore . Rogo itaque ne dum Medicos, sed etiam pios illos Religiosos, qui Romæ, atque alibi, ex instituto animam agentibus adsistunt , vt sequentibus indicijs diligenter vtantur .

II. Porro , vt Medicus faciliùs iudicet, an reuerà quis vitâ functus fuerit , omnium primò necis causas exploret , quæ si extiterint inuincibiles, de quibus egimus cap. XIIII., liberè decernat, ægrum iam e viuis exemptum fuisse , cum vocem , respirationem , ac pulsum , breui etiamsi tempore , amiserit .

Quòd

Authoris monitum.

Mortuus a pseudo-mortuo distinguitur primo ex prægressis causis .

Quòd si contra causæ occurrant per se vincibiles , tunc acriori sensuum , rationisque criterio sibi opus erit .

*Secundò a sepulto
respirationis , &
cordis motu .*

III. Et quoniam absque voce , vsuque internorum , externorumque sensuum , ac motuum , a voluntate pendentium , vitam aliquandiu protrahere possumus ; sine sepulta tamen , atque exili saltem respiratione , cordisque trepidatione non possumus ; hinc iure meritò scriptores , daturi notas , quibus viventem a mortuo distinguamus , in superioribus hisce duobus maximè versantur .

a Loco cit. n.5. Quidquid in contrarium scribat Paul. (a) Zacch. qui exemplum adducit cuiusdam , quem grassante peste , dum vespillones , vt mortuum , ad destinatum locum asportabant , vitæ signa dedisse viderunt . Etenim quis ignorat , pestis tempore omnem rem nonnisi tumultuariè peragi ; ac proinde leue duntaxat studium , ad discernendum veros a pseudo-mortuis , adhiberi .

*Respiratio sepulta
quomodo excitanda .*

b Primo de morb. inter. cap. 58.

c De relat. med. lib. 4. cap. I.

d Tertio de diff. resp. cap. 10.

*Lana ægri navi-
bus admouenda .*

IV. Respirationem itaque sepultam , atq; inconspicuum tentabimus , primò sternutatorijs acribus , ac vehementibus , quibus maximè fidentes inuenio (b) Hollerium , & (c) Fort. Fidelem . Secundò ipsius (d) Galeni consilio , paleam , tenuemque lanam ægri naribus suspendendo . Si nanque viuit homo , vicissitudine motus aeris , quantumuis lentissimi , lana mouebitur . Quod profectò experimentum

me-

memorat ^(a) D. Gregor. olim susceptum fuisse in Presbytero Vrsino, cui, solutis membris, atque in morte distento, cum Presbytera sua, si quid vitale spiramen inesset, naribus appositâ curasset arte dignoscere, (magno certe ad honestatem tuendam argumento) sensit, se ab ægro, collectâ voce, vehementer obiurgari, *discede a me mulier; adhuc igniculus uiuit; paleam tolle*. Tertio, alij cereum, exiguumque lumen ori, ac naribus moribundi applicant, cuius flamma si a recto fursum tramite defleat, ac tremula fiat, homo etiamnum uiuit. Quarto, abstersum speculum ori apponunt, quod si paulò post maculis foedetur, de vita spes est. Quo sanè speculo feliciter usus fuit ^(b) Albertinus Botton. ad explorandam superstitem vitam in muliere patauina, quæ, hysterico strangulatu correpta, adstantium omnium consensu mortua existimabatur.

a Dial. lib. 4.
cap. 11.

b Lib. 1. de
morb. mul. cap.
45.

V. Tandem, cum ad ipsius motum diaphragmatis, quantumuis minimum, efficiendum, costas spurias, quibus illud alligatur, moueri aliquo modo necesse sit; iure a practicis proponitur, vt, supino firmiter locato ægro, cyathus aquâ plenus ad ima pectoris, supra cartilaginem ensiformem ad perpendicularum ponatur. Tunc si cyathus, contentumq; fluidum, vel minimùm dimoueantur, in uiuis est, si secus, iam mortuus æger.

Cyathus supra
xiphoideam cartila-
ginem locandus.

H

At

*Motus etiam non
vitales aliquando
in mortuis.*

VI. At enim verò huiusmodi superstitis respirationis indicia non obiter, atque oscitanter, sed consultò, ac repetito periculo adamussim sunt expendenda, vt prudentes de vita, vel morte ægri, nunquam pœnitendum, iudicium adhibeamus; contingit enim aliquando, vt certus motus tùm abdominis, cùm pectoris, etiam apud vitâ functos, excitari possit a naturali solidarum partium coincidentia, vel a præternaturali contentorum fluidorum fermentatione, flatuumque præsertim elatere: quibus forsitan factum est, vt minùs in arte periti, vitam cadaueribus attribuentes, non solùm falsi, atquè certè ridiculi interdum euaserint. Sed hæc omnia non tantùm præceptis, quantùm vsu, ac diligentia docentur.

*Cordis motus in
Pseudo-mortuis
quot modis sit per-
quirendus.*

VII. Deindè ad lenem motum deprehendendum summarum venarum, auricularum, & cordis in pseudo-mortuis, longè maiori afficimur difficultate, quàm sit ea, in qua versatur quisquis notas exilis, ac sepultæ respirationis inquirat. Etenim thoracis machina, & circumfusus aer, qui alternè per tracheam in animalibus ducitur, reduciturque, nostris certè sensibus propinquiora sunt ipso corde, eidemque appensis arterijs, quæ, nonnisi tenuatæ, ad extrema corporis pertinent. Accedit, ad rei momentum, consuetudo explorandi pulsus in solis carpis; exinde

dè nanque fit, vt, deficiente arteriarum icu priùs in carpis, quàm in corde, aut in aorta, maioribusque illius ramis, sæpè nonnulli de omnimoda ceflatione motus cordis iudicium ferant, cum primùm in carpis pulsum defiderari cognouerint. Qua de re, vbi locus erit dubitationi, tunc motum cordis, & arteriarum non tantummodò in artubus quæremus, fed, inclinato languentis corpore in finiftrum latus, calidam manum regioni cordis admouebimus, exquisituri, an motus aliquis in corde fuperfit. Deindè validâ etiàm digitorum preffione tentabimus arterias carotides, quæ, cum diametro maiores fint ijs, quæ ad manus fparguntur, nec obliquè, & per angulum in axillis, fed rectâ ferantur ab arcu arteriæ magnæ verfùs caput, gradum impetus fanguinis, etiamfi tenuiffimum, a corde acceptum, faciliùs excipere, & explorantibus oftendere, poffunt. Interim verò fuperfites apud præcordia vitæ fcintillulæ omni arte, admotis quâ intrâ, quâ extrâ corpus cardiacis volatilibus, ac fuaueolentibus, fouendæ, atque excitandæ erunt, vt in arteriarum pulfibus clariùs erumpant.

VIII. Enim verò, quemadmodum cauendum nobis eft, ne occultò viuentem, propter imperitiam explorandæ reliquæ illius, quantumuis tenuiffimæ, arteriarum pulfationis, inter mortuos reponamus; ita diligen-

*Carotides arteriæ
ad fuperfitem
pulsum exploran-
dum cur aptiores.*

ter providendum, ne, vanâ opinione inuenti pulsus, artem nostram in contemptum adducamus. Siquidem exemplum habemus cuiusdam, quem prudens reticeo, qui, cum vni ex summis romanæ Aulæ Proceribus, repentè mortuo, & a nobis iam derelicto, adlisteret, totâ strepente domo, nobisque stoliditatem illius mirantibus, Procerem etiamnum viuere contendebat. Cumque nos credulitatis suæ causam sciscitaremur, pro signo adduxit superstitem adhuc pulsus. Neque sentiebat homo excors, pulsus, quem mortuo attribuebat, sensum esse arteriarum priorum digitorum (erat enim feruidâ fluidorum crasi donatus) quibus cum arctissimè premeret cadaueris carpum, cæteroquin excarnem, & aridum, refluxum liberum ad venas proprij sanguinis impediēbat, ideoque, suis arterijs validiùs ad extrema pulsantibus, sibi, & domesticis errorem hunc ineptissimè obiecerat.

Quæ vitanda ne quis pulsus mortuo perperam attribuat.

IX. Porro, vt redeamus ad pensum, nullus sapiens, sedulusque Medicus curam negliget animalium spirituum, ac neruorum, saltem splanchnicorum, medijs clamoribus in aures, stimulis ad magis sensiles partes, odoramentis, & acribus volatilibus ori, ac naribus adhibitis, alijsque, quorum syluam nemo practicum non nouit, & de quibus plura dicemus in secundo libro, vbi de medi-

Sopitas neruorum motiones excitantia.

dicamentis, quæ hoc anno ijs maximè profuisse visa sunt, qui, subitaneis morbis tentati, feliciter euaserunt.

De signis medicis, quibus repentina mors prænoscî potest.

C A P U T XVII.



ON utilis modò, sed maximè necessaria Medicis videtur scientia præcognitionis repentinæ mortium, cum nostræ (a) Præceptor Artis clarè ostendat, cum non so-

a Hipp. in vestib. lib. progn.

lùm culpâ vacaturum, verùm etiam boni Medici nomen, atque admirationem consecuturum, qui, cum omnes sanos facere non possit, futura saltem præsentiat, atque prædicat. Hanc itaque spartam ornaturi, illud in primis cauendum ducimus, ne quis tanti putet notas, quas subnectimus, ut eas vel omninò certas, & ut aiunt, pathognomonicas credat, vel sine delectu, ac singillatim accipiat. Si quod enim in vniuersa medicina difficile, arduumque negotium, hoc procul dubio in ferendis futurorum iudicijs locatum est. Multa siquidè anni tempestatibus,

agro-

Summa prudentia in arte medica est necessaria.

a Lib. 2. predic. n. 3.

ægrorum continentia, vel incontinentia, lætis, aut tristibus animi pathematibus mutantur in melius, aut in deterius; vt proinde etiam ad rem medicam pertinere putauerim, quod in Iuris doctrina passim vsurpatur, nempe vel totam esse prudentiam, vel sine prudentia exerceri non posse. Atque, hinc ^(a) Hip. voluit Medicum tum in cetera arte, tum in prædictionibus consultissime se gerentem, ac probe intelligentem, eum, qui prædictionis successum consecutus sit, apud prudentem ægrum admirationi fore, qui vero deerrauerit, præterquamquod odio grauabitur, eum ne insania quidem suspicionem effugere posse.

Prudentia quomodo aquirenda.

II. Vt igitur Medicus, prælagiturus inopinatas mortes, in ipsamet coniecturali arte verax, ac propè securus euadat, primò, multis aliorum, & proprijs obseruationibus diligenter studeat; deindè ex tota signorum messe manipulos quasi colligat, & ad suas quosq; classes reducat, vt postmodum, cum occasio postulat, maturè, ac studiosè recogitando, & cogitata cum rebus conferendo, cautus, ac prudens pronunciet.

Internæ varices cognitu difficiles.

III. Nemo autem interea in spem erigatur, dari signa, quibus omne genus improvisæ mortis præsentiri, ac prænunciari possit. Etenim, quæ ab internis, sed cæcis, nullaque indicia producentibus, principijs veniunt, vt inter alia sepultæ in ventribus venarum

varices existunt, eæ quidè m Medicis rarò innotescunt . Illæ duntaxat nobis aliquatenùs patuerint , quæ fluunt a morbosis dispositionibus partium tum solidarum , cum fluidarum maioris usus , a quibus , ut munus ritè suum peragentibus vita , & salus , ita , deerrantibus, morbi paulatim inducuntur, primo quidè m aspectu leuiore , sed qui tandem , acruatim erumpendo , inopinatò solent interficere .

IV. De singulis suo tempore , nunc dicimus de vniuersis ; vnum postremò summæ necessitatis huic loco adijcientes , scilicet non quemcunque ægrum , cui subitanæ mortis periculum imminet , de eodem esse commonefaciendum . Etenim omnes quidè m homines , etsi seuerioris virtutis , animi tamen affectionibus sunt obnoxij , eisdemque aliquatenùs perturbantur ; ast ij maximè , qui vehementèr timidi , atque imbecilles existunt , quos ipsamet mortis opinio , aut in mortem , aut in mortis discrimen adducit . Hinc rectè

Cuilibet ægrotanti mortis periculum non est aperiendum.

(a) Galenus alitèr cum sapientibus, alitèr cum timidis , & stultis agendum esse consuluit ; & (b) Hippocrates multò priùs scriptum reliquit , pleraque futurorum ægroto occultanda esse . Sed interdum fit , ut , contrariâ penitus ratione , generosis Viris subitanæ mortis periculum sit enunciandum ; ut timore ad ea flectantur vsurpanda remedia , quæ aliàs nimis fiden-

a 6.epid.sect.2. comm.43.

b de decent.ornat.n.9.

fidenter spernere consueuerunt .

*Mors repentina
quibus potissimum
accidat .*

V. Quoniam verò repentinæ mortes ijs potissimum solent accidere , qui morbos aliquos , vel propter symptomatum leuitatem , vel propter assuetudinem , sibi familiares reditos , facile despiciunt , sperantes , se aut sola naturæ ope conualituros , aut nonnisi præuiâ longi agonis admonitione fore decessuros : idcirco vnumquodque futuræ mortis indicium , ex vnoquoque genere huiusmodi malorum erit depromendum .

*Eius signa ex quibus
fontibus hau-
rienda .*

VI. Itaque eodem planè ordine , quo repentinæ mortis causas persecuti fuimus , utemur etiam in examine signorum , quæ easdem neces nobis portendunt , distinguentes huiusmodi notas ; primò in eas , quæ colliguntur ex læsis instrumentis respirationis , & aere ; secundò in illas , quæ veniunt ex affectu corde , magnis vasis , & contento sanguine ; tertio in reliquas , quæ proficiscuntur ex morbis cerebri , neruorum , atque liquidi eorundem .



*Agitur de signis futura mortis repentina,
petitis ex læsione instrumentorum,
respirationi famulantium.*

C A P U T XVIII.



Inter notas, quibus repente
futurus indicatur interitus,
non ultimum locum tenent
illæ, quæ ex læsione pecto-
ris, & pulmonum deducun-
tur.

II. Primò sanè ortophnæa cum tussi apud
Senes, si diù humida persistens, statim mu-
tetur in siccam, morbo interim de sua vi
nihil remittente, improuisam necem, vt plu-
rimùm, præfagit: scilicet quòd lymphæ co-
pia, quæ, suppressâ anacatharsi, in pulmo-
ne, iam languido, atque obstructo subsistit,
facile parit suffocationem, præsertim, si
æger intemperantiùs, aut incontinentiùs vi-
xerit.

*Diuturna tussis
humida in siccam
conuersa, quando
exitialis.*

III. Secundò tussis molesta, & suffocatiua
ex acri latice, per glandulas arytænoideas, tra-
cheæ, & bronchiorum affatim secreto, si
magno cum impetu identidem recurrat, mor-
tem subitam portendit, præcipuè si æger,
vel senex, vel languidus, atque etiam in
vitæ regimine sit aliquantò liberior: apople-
xia nanque pulmonum, quam suffocatiuum

*Suffocatiua quo-
modo.*

*Pulmonum apo-
plexia mortifera.*

a 2. De morb. n.
52.

catarrhum dicunt , ab irritantium serositatum confluxu , & articularum pulmonum conuulsione , vt cum ^(a) Hippocrate loquamur , producitur . Quod fanè mortis genus nos frequenter vidimus , & primùm quidem , supra viginti annos , in Carolo Petrazzino aromatario ad Capitolij radices ; is enim , cum senex esset , atque huiusmodi tussim sperneret , mediâ tandem nocte , vt eidem prædictum fuit , suffocatus interijt .

*Interni pectoris
dolores quinam
lethales .*

*Ex inæqualis mor-
bus latens argua-
tur .*

IV. Tertiò interni pectoris dolores , qui modò spirandi difficultatem , præsertim per accliuia , modò cordis angorem , sæpè pulsus inæqualitatem comites habent , quique non sinunt ægrum in vtrumque latus æquali facilitate decumbere , & corporis gracilitatem inducunt , ex tempore solent interficere , præcipuè si ægri subeant violentos aliquos corporis motus , parùmque laudabili cibo sese ingurgitent . Gerunt enim sepultum plerunque in altero pulmonum lobo tuberculum , vel aliam congestionem , aut venæ pulmonicæ dilatationem , quorum , propter repentinam rupturam , aut propter inductam quaquauerfum validissimam conuulsionem , liber transitus per cor , & pulmones tam sanguini , quàm aeri ocysimè tollitur . Quam certè moriendi viam non pauci inierunt ex ijs , quos nouimus ; atque horum numero adscribendus videtur Doctor Medicus Vinciguerra , qui

qui elapso anno , cum diù leui anhelitu , sepul-
tisque in pectore doloribus vexatus fuisset ,
tandem intempesta nocte , domesticis , ac Sa-
cerdote vix accersitis , e viuis sublatus fuit .
Vide quæ scripsit experientissimus ^(a) P. Po-
teri de ijs , qui illicò moriuntur ob ru-
pturam venæ pulmonicæ iuxta sinistrum cor-
dis ventriculum ; illi enim respirandi quâdam
difficultate , deambulantes , corripiuntur , & , ob
præcipitem virium lapsum , propinquis tenen-
tur niti adminiculis .

V. Quartò magis adhuc repentina mors
prædici potest in consimilibus casibus , si id ,
quod in pulmone congeritur , fuerit de natu-
ra vomicæ , quæ potissimùm cognoscitur ex
sicca tussi cum fætore quasi cadauerico , quem
ægri , aerem educendo , identidèm sentiunt .
Rumpitur enim incerto alicubi tempore , cum
erosus , vel nimium distractus fuerit follicu-
lus , & plerunque occiditur , dictum factum ,
homo , vt scripsit ^(b) Tulpius . At enim ve-
rò , si huiusmodi morbus hominem corripiat ,
qui se in cibo , potuque contineat , noxium-
que aerem præcaueat , tunc neque magnam
in molem augetur , neque semper ex tem-
pore diffilit , aut si diffiliat , subitam ne-
cem afferre solet . Quinimò nonnullos super-
stites , atque sanos , vt ^(c) Willisio contigit ,
nos etiam vidimus . Secùs atquè , si æger
bacco , & genio indulgeat , tunc Medicus ,

^a Cent. 3. obs.
cap 22.

*Venæ pulmonicæ
rupturam quænam
præcedant ex Pote-
rio .*

*Ex pulmonum vo-
mica repent: mor-
tis prædictio .*

^a Lib. 2. obser:
cap. 10.
*Quinam supersti-
tes .*

^c De morb. pect.
sect. I. cap 11.

ratione contrariâ , securius iudicium de subitaneo interitu pronunciare poterit .

Asthma conuulsiuum aliquando mortiferum .

VI. Quintò cum ad motum thoracis tan-
to perè nerui concurrant , fit aliquandò , vt
conuulsiua asthmata ad repentinam necem
deducant ægros , qui , antiquato iam malo ,
putant se miserè viuere , si medicè uiuant ,
morbumque propterea nouo morbo cumulan-
tes , externâ plerunque accedente causâ , re-
pentè moriuntur .

*Ex anni tempesta-
tibus , quæ ad subiti-
tam mortem ducant .*

VII. Tandem cum in respirationis ma-
teriem veniat aer , & quidquid in aere la-
titat , non immeritò inter subitanæ mortis
signa reponendas esse putauerim particulares
quasdam tempestatum , acrisque affectiones ,
quippe quæ multos , lentè cæteroquin ægro-
tantes , repentè solent occidere , & quidem
non vi primarum tantum , vt aiunt , qualita-
tum , sed pulsu , & variâ mixturâ particula-
rum , quæ miris modis nostrarum partium
officia variant , atque perturbant . Sagax ita-
què , & peritus Medicus vtatur consilio
Hippocr. , qui sparsim docet , ex magnis tem-
porum mutationibus mala præaffectis iam cor-
poribus euenire . Sed clariùs de subitaneis
mortibus loqui videtur (a) in libro de
aere , locis , & aquis , cuius sanè integrum
hîc textum , vtpotè plura docentem , tran-
scribimus -- *Præcipuè verò maxima anni tem-
porum mutationes obseruandæ sunt , vt neque me-
di-*

a n. 3.

Locus Hipp:

dicamentum purgans iubentè exhibeamus , neque partes circà ventrem uramus , aut secemus , ante dies decem , aut etiam plures . Maxime tamen sufficient decem . Ac maximi periculi plena sunt ambo solstitia , præcipueque æstium . Periculosissima etiã ambo æquinoctia existimantur , maxime verò autumnale . Syderum quoque ortus obseruandi , præcipueque caniculæ , deindè arcturi, & vergiliarum occasus . His enim potissimum diebus morbi indicationem subeunt , & alij quidè perimunt , alij verò desinunt , alijque omnes in aliam formam , & statum transeunt . -- Et reuerà multos ordinario etiam rerum cursu in æquinoctijs , & mediâ potissimum æstate, summoque hyeme repentè mori obseruamus.

VIII. Qua de re Medicus , iunctis causarum , & signorum ideis , non admodum difficultè aliquem inopinatò moriturum poterit diuinare , si illum , fractis viribus , ex diuturno morbo partium maioris vsus , circa prædictas magnas temporum mutationes, deteriùs affici animaduernerit . Nequè profectò aliter iudicet de ijs , qui salubre cœlum mutant in pestiferum , cum potissimum ipsi valetudine non admodum prosperâ freti fuerint.

Probi aeris in deleterium mutatio mortis causa .

IX. Sed quoniã multa symptomata , quæ ad respirationem pertinere viderentur , radicem omninò morbosam habent in ipso corde , eique appensis vasis ; idcirco sequenti

ti capite, acturi de signis, desumendis à corde, & sanguiferis, perstringemus nonnulla, etiam indicia, quæ subitanæ mortem præfagiunt, læsâ etiam respiratione.

*De signis futura subitanæ mortis
à Corde, Magnis Vasis, &
Sanguine.*

C A P U T XIX.

*Ex cordis &c. affectionibus, plura
subitæ mortis præ-
ludia.*



Tatam hanc, confusamque materiem certis capitibus distinguamus, placet hujusmodi notas deducere, primò ex pulsuum vitiis, secundò ex palpitatione, aut dolore cordis, tertio ex animi deliquiis, quartò ex hæmorrhagiâ, atque aneurysmate, quintò ex habitu plethorico, & obeso, tandem ex quarundam suppressione euacuationum.

II. Illud verò antè omnia hîc aduertimus, recensitas passiones tam cordis, & magnorum vasorum, quàm sanguinis, & omnium fluidorum, quæ cum sanguine circumferuntur, vel à sanguine separantur, subitanæ interitum vix unquam indicare posse, cum eadem seorsum, & singulæ ægros diuexauc-

xauerint. Experimento enim docemur, has notas tunc improvisò morituros præmonstrare, cum inter se variè permixtæ fuerint. Undè diligens Medicus, rectè diuinaturus, neutiquam celeritèr pronunciabit, sed maturè signa coniunget, vt nos cap. xvii. jam ostendimus, id quod pluriès in lib. de progn. inculcavit Hippocrates, quandò signum aliquod lethale esse decernit, sæpè repetendo, *sed oportet alia signa contemplari.*

III. Et quidem primò quantùm spectat ad pulsuum vitia, etiamsi apud aliquos inæqualitas, atque intermittentia tanti fiat, ut indè ^(a) Gal. subitam mortem Antipatro prædixerit. Nos tamen signum hoc non solum in pueris, & senibus, ut idem asseruit Galenus, sed etiam in iuuenibus, & robustis frequenter nullo modo funestum obseruauimus, cum scilicèt ex levi connutrito organorum vitio, vel ex hypochondriorum irritatione procedit, cuius forsitan indolis extitit intermittentia pulsus illius Oeconomi, quem ipse ^(b) Gal. tanquam sanum ad consueta negotia ingenuè remisit. Etenim si sola pulsus intermittentia hominem, benè cæteroquin valentem, detineat, adeò optimos Medicos à subitanæ mortis præfagio dehortatur, ut potiùs eos in spem adducat, leue illud malum, antequam grauius euaferit, opportunâ medelâ fore tollendum. Huius veritatis ex me met ipso experimen-

Signis non seorsim sed collectim sumptis tutius repentina mors prædicatur.

a 4. De loc. affect. cap. vlt. & 3. de prælag: ex puls. cap. 4.
Pulsus intermit- tens non semper funestus.

b De prælag. ad posth. cap. vlt.

Proprium experimentum.

rimentum promam, qui, cum tria ante lustra pertinaci, mihiq; sensibili cordis contractione, indeq; ortâ pulsus intermittentiâ, ex hypochondriorum consensu, per sexennium laboraverim, plûs aliis, quàm mihi officiosus, & cautus, usu tandem rhabarbari, chalybis, & juris viperati, perfectè convalui. Vt igitur intermittencia pulsus improuisæ necis certius omen esse possit, necesse est, ut jungatur omni inæqualitatum generi, palpitationi, anhelitui, aliisque similibus pectoris passionibus, de quibus infra.

Quando periculosus.

Pulsus tarditas quando exitialis.

IV. Pulsus utique tarditas, si eadem, singulis ictibus languidè recurrens, alterius pulsationis intermedium tempus ferè totum pertinacitè absumat, probabilius exhibet inopinatæ mortis indicium; præsertim si patiens debilis, ac senex fuerit, ut sæpè nos experti sumus. Etenim quæcumque sit causa, scilicet vel simplex (quod rarò evenit) ex defectu animalium spirituum, in præcordia descendentium, vel mixta ex fœculento, minùsque mobili, per cordis ventriculos, sanguine, semper talis pulsus integram, firmamque eiusdem cordis paralyfim, aliquando futuram, præmonstrare solet, maximè tempore somni, quo, instrumentis languidiùs pellentibus, idem sanguis (etiam subobscurè agnoscen-^(a) Hippocr.) tardiùs mouetur.

Indicium futuræ cordis paralyfis.

^a Deflat. n. 20.

V. Secundò palpitatio cordis, ipsa quoque

que subitæ mortis fit prænuncia, si fuerit frequens, si magna, si cum anhelitu, animi deliquiis, omni genere inæqualitatum pulsus, tandem si æger congruâ vitæ ratione minimè utatur: Etenim, si hæc symptomata magnâ ex parte simul conspiraverint, significatur, magnum quoque dari vitium in corde, aut summis vasis, cui accedente aliquâ causâ procatarticâ, nullo labore motus ipsius cordis, & sanguinis ex tempore lethaliter sistitur. Quemadmodum verosimile est, Galenum, iis admonitum indiciis, toties decantato Antipatro improvisam, quam postea subiit, mortem prædixisse.

*Cordis palpitatio
perniciosa, quæ.*

VI. E contrario autem, si palpitatio oritur ex causa, cordi obstinatè nequaquam adjunctâ, sed cum fluidis circulante, ut plerunque esse solet acerrimus ichor, vel quidquid aliud, quod, ad irritandas cordis fibras, planè fugitivum, pertingit; rarò abrumpendam illicò vitam minitatur. Multos proptereâ novimus, qui à recurrentibus palpitationibus, evacuâtâ copiâ stranguriosæ urinæ, penitus liberati fuerunt; e quibus Illustrissimus Præsul Bonauentura, Sanctiss. Domini Nostri intimus Cubicularius, & Eleemosynarius, splendore generis, & propriis virtutibus, laudatissimus. Latex porrò salino-acer ab hypochondriis maximè redux, ità interdum cordis musculos convellit, ut stranguriosum veluti tran-

*Quanam minus
periculosa.*

*In his Urinæ
stranguriosa salu-
taris.*

fitum sanguinis per eiusdem ventriculos cum palpitatione producat .

*Diuturnus cordis
dolor in senibus
subitam mortem
significat ex Hipp.*

VII. Dolor similiter cordis, præsertim in senibus, sæpiùs recurrens, inopinatam necem solet indicare , juxtà illud Hippocratis in Coacis, *Cordis dolor, seniori sæpius consuescens, repentinam mortem significat* . Vel enim sumatur hæc passio pro molestâ ipsius cordis, & orificiorum eius sensatione , vel pro affectione ventriculi , quæ secum trahat ipsum cor , & græcis cardiogmos vocatur : utroque sanè modo res est subitanei periculi plena, præsertim apud senes . Inuisimus olim Virum , cui , cedente iam podagrâ , atrox cordis dolor identidem recurrebat ; is repentè, oborta suffocatione , circa Æquinoctium , sublatus est . Similem offendimus historiam apud (a) Hollerium cuiusdam septuagenarji , cui dolor iste cœpit esse frequens cum angustia spiritus , & suffocationis periculo , is etiam , domum rediens , repentè obijt .

^a In Comm. 1.
lib. 3. coac. sect.
2. coac. 17.

*Idem portendit
cardiogmos .*

^b Lib. 1. prædict.
n. 9.

*Hipp. auctoritas,
& rationes addu-
cuntur .*

VIII. Nequè dubitandum , quin dolor ventriculi , cardiogmos dictus , sæpèque rediens , si ex summoperè pravis humoribus , in ægro delitescentibus , oriatur , inopinatæ mortis unà simul causa , & signum esse possit : rectè siquidem admonebat (b) Hippocrates ijs verbis , *Oris ventriculi dolor cum præcordio distento , & capitis dolore , malignum , & quidpiam anhelosum . Nam ij repentè moriuntur , ve-*
lut

lut in Dysode. Significatur enim in eo corpore liquida eousque acria redundare, ut veneficam naturam induerint. Etenim, quemadmodum arsenicum, sublimatum, aliaque hujus generis venena, villos, & fibras erodendo, convellunt ventriculum, & cor, ac propterea citam necem inferre solent; ita multò faciliùs, ac celerius ingenita ista venena aliquando interimunt; nimirum quia interiùs collecta, & naturalibus fluidis recter admixta, expeditiùs per canales quaquaversum feruntur. Quorum sanè veneficorum succorum prænuncia signa existunt dolor ventriculi, ad præcordia propagatus, cum distensione, & anhelitu, pertinacitèr atque identidem recurrens. Confer huc quæ scripsimus cap. v. hujus libri versus finem.

IX. Tertiò, inter signa futuræ mortis improvise, illud nostris, aliorumque experimentis magis certum, comprobatumque est præsagium, quod ⁽²⁾ Hippocrates in hanc sententiam exponit. *Qui frequenter, ac fortiter*

sine causa manifesta delinquant animo, repente moriuntur. Vbi una est omnium Commentatorum, ad usque clarissimum Lucam Tozzium, sententia, ut, pro veraci hujus prognoseos exitu, tria simul conjungantur; primò, ut frequenter; non enim satis est, aliquem semel duntaxat in anno viribus cecidisse; secundò ut fortiter, nempe usque ad syncopis confi-

a 2.Aph.41.
In animi deliquio, ut subita mortis sit præsagium, tria requiruntur.

nium; denique, ut id absque causâ manifestâ; hoc est obuiâ, & externâ contingat. Ità enim significatur, magnum, fixumque aut cordi, aut finitimis partibus hærere malum, quod, motum præcordiorum, & sanguinis penitus tollens, subitam necem aliquando sit illaturum. Etenim non rarò in corde, quod passim, etiam in reliquis muscularibus partibus, accidit, ut modò pauciores, & laxæ, modò numero, ac vi maiores fibræ, vasaque influentia, & refluentia cum congrua proportionem, aut sine ea ad suam integrandam structuram concurrant; profectò in istis casibus, fortissimus musculorum (ut cor ab ^(a) Hippocrate appellatur) ad naturales systoles minori, vel maiori, quàm par est, vi erigitur: undè talis orta imbecillitas, vel extraordinarium robur, non solum tempore contrahit morbos, quibus ad frequentes, fortesque animi defectiones, subitæ mortis prænuncias, deducitur; sed homines vel nimium timidos, vel nimium audaces potissimum constituit, quorum sanè priores, utpote maximè pusillanimes, improuisum, ac vehemens pathema sæpè deicit, ac prosternit; eò quidem facilius, quò animi passio inceptum, occultumque in præcordijs malum, veluti pessimam interitus radicem, inueniat.

26. De cord. n. 4.

Cordis robur, aut imbecillitas sæpè timoris, aut audacie causa.

X. Quartò cum nulla frequentior sit via, per quam repentè de medio tolluntur homines,

nes, quàm larga profusio sanguinis intrò, vel extra corpus: idcirco secura etiam, & certa repentinæ mortis indicia à Medico peti poterunt ex signis, quibus docemur imminere rupturam summorum vasorum in thorace, utero, intestinis, hæmorrhoidibus, alijsque internis sedibus. Sed inter signa non dubia properæ mortis in hæmorrhagijs, illud sanè est, quod tradidit ^(a) Hippocrates in Coacis, inquit; *Si quibus sanguis efluxit, rigor superveniat, & ulcera maligna sint, ij, vel loquentes, inopinanter moriuntur*; Hoc passim in vulneribus capitis, in carcinomatibus sanguifluis, aut malignis alijs ulceribus usu venit, scilicet, ut, cum ægri, post hæmorrhagias, rigore corripiuntur, (dissipata dulci ac volatili sanguinis parte, & fermento quodam acri, ac penè venefico ad præcordia, & cerebrum reassumpto) subito vitam deferant.

XI. Enim verò, postquam frequentiora reddita sunt humanorum corporum extispicia, quibus antiqui, præ horrore, parcius utebantur, nobis clarè innotuit, multos, qui ex tempore moriuntur, internis aneurysmatibus, aut varicibus laborasse. Certissimum propterea sollicitæ necis signum deducemus ex semeiotica varicum, atque aneurysmatum, quæ paulatim ad talem, tantamque exilitatem sanguinea vasa redigunt, ut aliquando, momento temporis, disrumpant. Et quidem hîc
loci

In hæmorrhagijs mors inopinata quando, ex Hip: a Iuxtà diuision. Holler. lib. 4. sect. 2. coac. 3.

Frequens cadauerum sectio ignotas aliquot subitæ mortis causas detexit.

*Interna aneurysmata ut inconi-
nentes subito, ita
sobrios lentè inter
ficiunt.*

loci dissimulare non possum, sæpè experi-
mentis comperjisse, aneurysmata illos potissi-
mùm ægros inopinatò interficere, qui minùs
continentem, frugalemque vitam ducunt;
eos verò, qui parcè, sobriè, continenterque
vivunt, aliud morbi genus, ac lentus, ut
plurimùm, subortus hydrops, longo cum ago-
ne, solet interimere. Quare Medicus, etiam,
iuxtà ægrorum mores, ac vivendi consuetu-
dines, judicia sua prudenter disponat, & pro-
ferat.

*Athletis quando
idem eueniat.*

a p. aph. 3.

b Lib. 2. cap. 2.

*Duplex mali euen-
tus causa.*

c Lib. de flat. n.
17.

XII. Quintò, ex habitu athletico nulli
dubium erit, quin repentinæ quoque mortis
indicia desumi debeant, quoties athletæ, non
solùm bonum habitum sine mora, juxtà (a)
Hippocratis præceptum, minimè solverint,
anticipantes humorum diminutione discrimen;
verùm etiam lautâ mensâ, somno, at-
que otio plenius saginentur; quem sanè ple-
niores, & coloratiorem corporis habitum,
iure suspectum bonum appellauit (b) Celsus:
etenim athletarum plenitudo, cum ad sum-
mum devenerit bonitatis, duplici via citam
mortem minatur, tùm quia vasa intus, foris-
que infarcit, ac premit, spatiumque propte-
reà fluidorum motui, ac miscelæ aliquando pe-
nitùs aufert; tùm vel maximè quia eadem
sanguinea vasa disrumpit, ubi minor illorum
resistentia, vel major sanguinis impetus oc-
currit. Vndè ad rem scripsit (c) Hippocrates

com-

compressus sanguis sua copia, quâ maximè compressionem fecerit, Venas perrumpit.

XIII. Ad hoc ipsum genus signorum referatur etiam obesus, ac nimium pinguis habitus, de quo sanè idem locutus est ^(a) Hipp. dum inquit, *qui natura admodum crassi sunt, citius intereunt, quàm graciles*; ij enim vasa omnia, propter nimiam pinguedinem, ita habent compressa, atq; exilia, sanguinemq; propter volatiliū spirituum penuriam, adeò lentescentem, ut eiusdem circulationis, minimo interdum negotio, repentè intercipiatur. Quorum exempla nemo medicorum proprijs experimentis plura non congeffit, præter innumera, quæ passim a nostris collectoribus referuntur; ut in ijs commemorandis tempus terendum non sit. Illud tamen prætereundum nobis minimè videtur, in huiusmodi athleticorum, pinguiumque habitu, tunc præcipuè subitam mortem a sedulo, doctoquæ Medico diuinari posse, cum apparuerint faciei, & oculorum color mutatus in liuidum, respirationis difficultas, cordis angor, motuumque impotentia, venter, aut vertigo.

*a 2. aphor. 44.
Obesi cur repenti
nam mortem præ
gracilibus incur-
rant.*

*His imminens
mors unde dignos-
catur.*

XIV. Tandem non aspernanda venturæ ex abrupto mortis indicia colliguntur ex suppressis criticis euacuationibus, aut decubibus tum sanguinis, tum fluidorum quorumcumque a sanguine secedentium. Etenim sæpè accidit, ut vitiosa fluida, vel reassumpta,

*Crisis suppressa
ubi subita mortis
prænuincia.*

vel

vel non vltra propulsa lethalitèr subsistant in cerebro, & præcordijs. Pauca hîc sub exemplo fumamus.

XV. Puerperam improuisò decessuram, penè tutò poteris pronunciare, si prauis humoribus redundans, interdum præfocetur, lochiaque, odorum olfactu, continuò introrsum reuocentur; ad cor enim subito resiliunt, & ad cerebrum ascendunt; atque vtrobi- que lethiferam stationem inducunt.

*Hæmorrhoides
item Senum sup-
pressæ.*

XVI. Simili prognosi vti poteris in sup- pressis hæmorrhoidibus apud senes, qui il- lorum fluxui assueuerunt, si capitis grauita- te, ac vertigine, vel cordis oppressione, aut lipothymijs post siccitas mariscas diù tentati fuerint, eoque maximè si vini, lactisque abu- sus ad necis causam accedat.

*Physicis quale
æquinoctiū lethi-
ferum.
a 3.aph. 10.*

XVII. Improuisò paritèr moriuntur phty- fici, quoties circà æquinoctium, præfertim (a) autumnale, pus per anacatharsim non am- pliùs excernant.

*Variolarum retro-
cessio quando mor-
talis.*

XVIII. Si variolæ, ac morbilli, cum in- ter secundum, ac tertium stadium versantur, pertinacitèr retrocedant, ægerque in lecto ia- ctetur, illum inespectatò moriturum poteris prædicere. Non absimili quidè m præfagio vtere, cum in ægro, cæteroquin languido, & cholera humidâ laborante, spontè, vel ar- te excretiones atrabiliaris, vel alterius exo- ticæ indolis immaturè subsistunt. Neque a-

ve-

verò deerrabis, improuisam necem solertèr diuinans in senibus potissimùm, apud quos ani
 fistulæ, crurum vlcera, nares, vel aures, *Emisarius occlu-*
 acri sanie manare consueta, ab eo opere pe- *sis unde subitæ ne-*
 nitùs vacauerint, præcipuè si in cerebro, aut *cis præludium.*
 in præcordijs inceptæ iam stagnationis, atq;
 irritationis indicia se proderint.

XIX. Hæc autèm satis fore arbitramur
 prudenti æquè, ac perito Medico; ex ijs
 enim in reliquas prognoses, a suppressis eua-
 cuationibus ventriculi, cutis, aliarumque
 partium deducendas, ipse ex se argumenta
 desumet. Illud tamèn sedulò, ac semper
 aduertimus, suppressas euacuationes aliquan- *Suppressæ euacu-*
 dò esse tantùm signa, aliquandò etiam cau- *ationes modò si-*
 sas improuisæ mortis. Sunt quidèm ferè nu- *gna, modò inepina*
 da signa, cum ea liquida, quæ solebant ex- *tæ mortis causæ.*
 cerni, nec multa, nec prauæ admodùm in-
 dolis extiterunt. Exemplum habemus caute-
 rij exiccationem in senibus, quæ illorum in-
 teritum præcurrit, eò quia apud eosdem vni-
 uersa iam fluidorum, solidorumque machina,
 de suo sensim robore remittens, omnia œco-
 nomix animalis, ac potissimùm secretionum
 munera languidè exercet, quibus penitùs de-
 ficientibus, tandèm mors obrepit. Vndè non
 ineptè ^(a) Roder. Castren. -- *Clauditur fonticu-*
lus, quia homo est morti proximus; non est ho-
mo morti proximus, quia fonticulus clauditur.

*a In suo syntag.
 prædict: part. I.
 cap. 6. particul. 4.*

L

Sunt

*Interdum sunt
causæ simul, &
signum.*

XX. Sunt verò causæ simul, & signum
properæ necis suppressæ illæ euacuationes,
quæ non copiâ tantum, sed deleteriâ mixtu-
râ egerebantur: eæ nanque, cum intrâ cor-
pus subsistunt, in aliquam iam ante debili-
tatam partem maioris vsus decumbunt, ocys-
simumque exitium plerunque portendunt.
Neque interim Lectores tædeat nos adeò in-
culcare, ne Medici ex tempore præfagia sua
effutiant; non enim semper, vbi consuetæ
restituerint euacuationes, subitus mor-
bus ingruit; interdum lentus indu-
citur, qui longo etiam cum
agone viam sternit
ad interitum.



*De signis improuisa mortis à cerebro ,
neruis , & liquido animali.*

C A P U T XX.



Tiamfi suprà meminerimus multorum signorum , quæ ex perperam operantibus instrumentis facultatis animalis improuisam mortem præmonstrant , de ijs tamen

plura nunc , & apertiùs dicere constituimus , cum clariùs ea doceri , atque intelligi soleant , quæ suo stant ordine distributa , quo confuso , etiam disciplinarum peritura sint omnia.

Ordo est animæ disciplinarum.

II. Primùm itaque capitis , & neruorum affectiones , quæ fortem apoplexiam minantur , clandestinam etiàm necem plerunquè prænunciant . Hæc tamèn præfagia , vt exitu comprobentur , non quibuslibet leuissimis etiam cerebri symptomatibus niti debent , sed validè fundari in cumulo , & congestu causarum , passionum , & circumstantiarum , quæ omnia syndromen signorum constituunt. Aggregatur verò ista syndrome primò ex ætate ipsius ægri , quæ a quadragesimo quinto per totum ^(a) senium excipiendis syderationibus aptior esse solet . Secundò ex superpressa euacuatione hæmorrhoidum , ^(b) fistularum ; herpetis , muci narium , & consimi-

Ad improuisam mortem ex cerebro præfagiendam signorum syndrome requiritur .

1. ex Ætate .

a 3. aph. 31. & 6. aph. 57.

b 6. epid. sect. 3. 2. ex Alicuius euacuationis superpressione .

3. *Ex præuijs capit-
itis &c. affection-
ibus.*

lium, quæ quidèu euacuationes, ac decubitus, sicuti cum vigent, multorum sunt medelæ morborum, ita cum spontè, vel arte in senibus potissimùm sanantur, facili negotio fortem inducunt apoplexiam, quoties in cerebro talem vaforum, ac fibrarum imbecillitatem inueniant, per quam plus sanguinis accipiat, quàm remittatur. Tertiò ex præuijs capitis, & neruorum affectionibus; rarò enim forti apoplexiâ quis præhenditur, nisi horum præludia symptomatum præcesserint. Hæc autèm sunt dolor, grauitas, atque imbecillitas capitis, memoriæ iactura, in somnum procliuitas, vertigo, cæcitas, membrorum torpor, & præ omnibus, leues, quæ anteuenerint, apoplexiæ: eæ nanque in fortem, ac subito interimentem tandèm desinunt.

*Exitiosa apople-
xia quo tempore
potissimùm contin-
gant.*

III. Et quoniam Hippocrates vult Medicum adeò in diuinando peritum, vt non solum ipsam mortem, sed illius etiam tempus præfagire nouerit: idcirco sciamus, oportet, apoplexias, ocysimè interimentes, non tantum circa æquinoctia, sed etiam circa solstitia frequentissimè contingere, vt aliàs monuimus. Quarè per hæc tempora eas diuinare poterimus, vbi signa præcurrant; & constitutio aeris fuerit inæqualis, pluuia, aquilonaris, & australis; aut æger vtatur parum laudabili viuendi normâ, ac præcipuè insalubrium ciborum, & vini sit appetentior.

Atque

Atque hinc senes utriusque sexus, quoties ex cerebri, neruorumque decubitu cæci euaserint, & post hyemale solstitium inter ipsas noctis tenebras, se ignem, aut splendorem identidem videre videantur; ij quidem facilè, cum sol in taurum ingreditur, forti apoplexiâ correpti, repenti decedunt: significatur enim magnum iam tremorem, pressio- nemque ad thalamos neruorum opticornum, & partem medullæ cerebri post illud solsti- tium inductos fuisse, quibus ob responden- tem quadraturam, longè maior, iminò ma- xima, & violentissima distractio, & pres- sio succedere solent, quæ, præsertim ad ce- rebri circumferentiam simul, & centrum in se- nibus factæ, breuissimè necant. Huiusmodi verò prædictiones, ex obseruationibus medi- co-astronomicis deductæ, non Artem modò, sed ipsos etiam Artifices illustrent.

Quinam senes fa- cile euadant apo- plectici.

Medico-astrono- mica obseruatio ad præsagiendum pro- ficua.

IV. Secundò, qui iam diù epilepticis re- cursibus tentati fuerunt, indèque immemo- rem, languidam, ac melancholicam ducunt vitam, hanc sanè repentinâ morte claudere solent, rupto plerunque intrâ cranium vase san- guifero, post inductam supra cerebrum conge- stionem. Quare prudens, & sciens Medicus in ijs casibus tutò fatalem improuisò diem prædi- dicere poterit.

Ex epilepticis qui repenti pere- ant.

V. Tertiò qui ex capitis vulneribus, aut contusionibus laborant (etiã in tuto esse

Capitis vulnera &c. inopinatò ene- cantia, quæ,

esse imprudentioribus viderentur) si rigore corripiantur, breui tempore decedunt. Significatur enim factam fuisse sub cranio vasculorum rupturam, vndè effusa liquida, dissipato per moram volatili, eaque ratione euersâ crasi, in acerrimam, & veneno similem naturam abjerunt, quæ tandem quaquaversum in neruorum principium, ac fines repente diffunduntur, mortiferamque convulsionem inducunt, in quorum cadaveribus ferè semper inuenitur abscessus in hepate, cuius ætiologiam exhibemus in nostro ad Hip. lib. de vulner. capitis commentario.

VI. Hæc sanè, quæ tribus capitibus improvisæ mortis signa perstringimus, cæterorum indiciorum, etiam illorum, quæ ex animo veniunt, exemplar esse possunt, ac documentum, rati oportere Medicum ita prudenter in hoc negotio se gerere, vt, si non semper verè diuinet, saltem non sæpè fallat. *Certitudinem nanque exactam in Medico*, vt ait (a) Hipp., *rarè videre contingit*. Vndè laudauerim, vt quis potius à prædicendo se abstineat, quàm imperitiam suam palàm ostendat.

Turpe siquidem est illum, quem
improvisè moriturum pro-
nunciauimus, vel eua-
sisse, vel lento
morbo deces-
sisse:

*Medici prudentia
in ferenda prognosi*

^a De vet. med.
n. 16.

Agi-

*Agitur in genere de methodo præ-
servandi a subitaneis
Mortibus.*

C A P U T XXI.



OST signa proximum censemus de præservativa methodo subitanæ mortis verba facere. Etenim, ut homo gravius, ac frequentius brutis animalibus ægrotat, atque idcirco, pluribus inventis, excogitatisque pharmacis, huic infortunio medetur; ita, cum crebrius quoque improvisæ neci, ex internis causis ortæ, sit obnoxius, rationi consonum est, ut subitaneum diem, aut penitus declinare, aut saltè pro viribus studeat retardare.

II. Scio apud ethnicos antiquissimum fuisse problema, quodnam genus mortis, lentæ ne, an verò subitæ hominibus fuerit exoptandum? ac proindè ^(a) Iul. Cæsarem pridie antè mortem, cum apud Marcum Lepidum cœnaret, hoc moto sermone, omnes antiver-
tisse exclamantem, *inopinatum*. Sed o fallacia hominum desideria! o votum inane, & punitum! Ipse siquidem Cæsar proprio didicit ex-
peri-

^a Apud Plut. in Cæsare.

*Inopinata Mors a
probo, & pruden-
ti viro haud exo-
ptanda.*

*a Ex Gratian.in
eius vita lib. 4.
cap. ult.*

perimento , omnium pessimam esse necem inopinatam , quippè quæ nequè ipsi cum indolentiâ contigit , vt fortè putabat , nequè sinè contumelia . Nos verò , quorum mentibus in tanta caufarum obscuritate Deus Opt. Max. altum , æternumque fidei lumen immisit , illam multò magis mortem , tùm optimam opinari , tùm salutarem optare debemus , in qua (vt insignis pietate , ac iudicio Vir Cardinalis Commendonus ^(a) ex D. Augustini Sententia , dicere solebat) animum sensibus integrum morti componere , & Deum nobis per Christianæ disciplinæ sacra , piaculæque possumus propitiare .

III. Quid ? quòd si de solis humanis foret consulendum , nobis certè nunquam subitum , atque inconsideratum e vita discessum concupiscere oporteret . Quis nanquè adeò ferox inter commercia hominum adoleuit , qui acerbè , penitusquè , & suos , & sua oderit , vt antè mortem testamenta conscribere , mutare , obsignare , dicere aliquid , aut reddere , si cui debet , ad patriæ , ad affinium , ad sui denique tranquillitatem pertinacitè nolit ? Qui liberis consilia , amicis , vt fecit Socrates , dare oscula negligat ? Timeamus itaque , quantùm humana , quantùm sunt æterna æstimanda , timeamus inquam inopinatam , subitamque mortem , Deumque propterea vniversalis Ecclesiæ vocibus enixè præcemur ,

cemur, vt nos ab eadem pro immensa sua benignitate tueatur.

IV. At nostri suscepti memores instituti, partem esse putamus, diligenter expendere, quâ methodo a causis huiusmodi interitus solertè declinemus.

V. Enim verò daturi methodum præferuandis improuisis mortibus, quæ ab internis causis dependent, initio admonemus, hanc normam per Medicos vnicè deriuandam esse ab hygiene, & therapeia illarum affectionum, quæ in aliquem ex subitaneis morbis possunt transire, vndè ægri repentè decedant: propterea quicumque studiosè legerit capita superiora de signis, certè non obscurum tenebit principium, a quo huiusmodi præcautionis discrimina desumenda veniunt. At, quoniam innumeræ, vt exposuimus, existunt nostrorum corporum affectiones, quæ subitam mortem inferre valent, idcirco sapiens, oportet, expertusque sit Medicus, vt consilium, vnicuique congruum, adhibeat. Sed cum adhuc nonnulla in genere demonstrari possint, ea nunc summatim exponere non omittemus.

VI. Corpora, improuisis hisce casibus subiecta, vel sunt aspectu sana, vel euidenter ægra. Ab hac verò vniuersalissima diuisione mihi petenda videtur præcipua partitio methodi præseruatiuæ. Et quidè, vt de

*Corpora impro-
uiso fato subiecta
nunc tanquam sa-
na; nunc velut æ-
gra consideranda:*

M

viro-

utroque membro diuisionis absque vlla confusione differamus. Sit.

Qua methodo præseruanda sunt corpora aspectu sana.

C A P U T XXII.

Corpora aspectu sana tripliciter expenduntur.



Corpora, quæ tanquàm sana nostros incurrunt in oculos, & summa nihilominus cautione egent, ne inopinatò diem suum obeant, tripliciter considerari possunt; primò cum nimia plethora, seu cum athletico habitu; secundò cum nimia obesitate, & corpulentia; tertio cum nimia animi imbecillitate.

a p. aphor. 3.

Athletica quomodo præseruentur.

II. Primò corpora athletica, cum ad summum bonitatis deuenerint, iuxta ^(a) Hippocr. effatum, statim soluenda sunt, celeri adhibitâ phlebotomiâ, diætâ, vini abstinentiâ, atque corporis exercitatione. Etenim athletæ (vt Plinius aiebat de Luna, quæ orbe pleno repentè per eclypsim est nulla) propter nimiam partium foris, intusque canales plenitudinem, repentinâ interdum morte eclypfantur; ac proindè solâ iuuantur diminutione

ne

ne quantitatis sanguinis , ac subtractione molis , qualitatisque alimentorum , & potuum , vt hâc ratione , si quid reliquum extremis vasis hæret impactum , motu corporis dissoluatur , remisceatur , atquè , in gyrum actum , maiori deniquè parte transpiret . Nequè porò apud istos exercitatio procuranda est , priùs quàm vasa depleta sint , & diminutum alimentum , ne illud idem , quod in præcautionis auxilium inducitur , improuisam mortem disruptione vasorum acceleret .

His quando imperanda exercitatio.

III. Sed omnis certè prophylaxis hisce in corporibus inutilis euadet , nisi altior quædam plethoræ radix optimè cognoscatur , & parumper debilitetur . Hæc autem illa est , quâ sani homines tantoperè gaudent , stomachi nimirum validitas ; vndè non leuis apud eosdem peccandi in ratione victus fiducia , atquè incitatio proficiscitur . Ij enim cibos non modò nimios , sed absque vllò delectu ingerunt , citòque in chylum conuersos intrâ sanguifera transducunt . Sed , cum non æquali proportionem transpirent , necesse est , vt illorum vasa impleantur , diffilitura ple-runque , cum plus æquo distracta fuerint . Sciant igitur qui bono , validoque sunt stomacho , præsertim si , extrâ adolescentiam positi , studijs incumbant , hostem intrâ se gerere , qui , nisi accuratè cauerint , improuisæ morti causam aliquando præbebit . Etenim

Stomachus validus morbosæ plethoræ fomes.

Ab exercitio, & ætate cibi indigentia definienda.

Quenam partes, & cur minus perspirent in sessilem vitam ducentibus.

ij, quoties se motibus non exercent (hoc autem diligentèr notandum) modico egent cibo, tanto scilicèt, quanto duntaxat opus est ad reparanda fluidorum dispendia, quæ non multa impenduntur in illorum transpiratu solidorum, quæ motui aeris, sanguinis, & liquidi neruorum tantummodò inseruiunt: minimum enim est, quod à penè quiescentibus istorum artuum musculis, & succutaneo organo insensibilitèr perspirat.

a In sua statica sect. 3. aph. 35. Saluberrimū Sanctorij præceptum.

Debiliores stomacho cur plerunque longæui.

b In eius vita a semetipso descripta.

IV. Nequè verò in alimentorum, potuumque genere vlla vnquàm securior, pro tuenda valetudine, inueniri potest via, quàm quæ indicatur à ^(a) Sanctorio, & sequenti aphorismo perstringitur -- *Ille cibi quantitas est saluberrima, dum a cibo corpus suis negocijs eadem agilitate vacat, ac si esset ieiunium* -- Hoc autem consilium opportunum est non pro solis plethoricis, sed pro alio quouis habitu, qui sanus, atque incolumis feruari cupiat. Falsò propterea homines de natura sua vulgò queruntur, quòd ventriculi languore, atque imbecillitate afficiantur. Ijs enim ipsemet morbus tùm peccandi, tùm se se interficiendi facultatem adimit; cum, si semel horum quis cibo, siue prauo, siue copiosiori, usus fuerit, statim erroris admoneatur. Hinc stomacho debiliores plerunque euadunt longæui. Vt præ cæteris insigne, ac vulgatum habemus exemplum in celeberrimo ^(b) Ludou.

Cor-

Cornaro , qui folius adminiculo sobrietatis prosperâ valetudine vixit vltrâ sæculum. Verùm longiùs fortasse progredimur , fallente nos cupiditate plethoricos habitus præferuandi.

V. Deindè, obesa nimium, & pingua corpora a repentino mortis periculo tuentur primò ea omnia, quæ tollunt plenitudinem lymphatico-pinguem viscerum, vasorum, & carniùm; cuiusmodi sunt epicraticæ purgationes cum pillul: tartar:, aloeticis, de amoniacò, & similibus; secundò, quæ benignè dissoluunt residuam mucosam, viscidulamque fluidorum partem, eamque potissimum per vrinam deriuant; nimirum terebenthinata, oximel: scill: , acidulæ etiàm aluminosæ; dummodò tamen homo ætate sit vigenti, ac iuuenili, quem in sensum accipiens est (a) Timæus, cum in obeso nimium corpore huiusmodi aquam proficuam obseruauit; tertio parca victus ratio, quæ partem detrahat ciborum præsertim humidorum, eisque substituat mediocriter exiccantia, atq; aromatica; quartò ea, quæ ab ipsis carnibus perpetuò demulcent ichores viscidulos, vt frictions, & fonticuli; tandèm accurata, & nunquàm intermissa corporis exercitatio, per quam fibræ musculares supra vasa, & supra glandulas validè nitentes, humoresurgent, comminuunt, volatilizant, aptosque reddunt ad diuresim, ac diaphoresim, quæ
qui-

Epicratica purgatio quam plenitudinem adimat.

Plura Obesis proficua remedia.

a cas. med. lib.
6. cas. 3.

quidem sunt viæ , per quas sanis in corporibus ea recrementa secedunt , quibus collectis, præcoces morbi , mortesque sæpè accersuntur.

*Timidi quomodo
præcauendi.*

VI. Denique illi homines , qui quantumvis corpore sani videantur , animo tamèn ægrotant, cuiusmodi sunt extra modum timidi , ac pusillanimes , saluberrimum præcautionis consilium inuenient , si ipsi se , & alij illos tueantur a subitis , atque improuis gaudij , aut timoris occasionibus . Etenim cum huiusmodi corpora sortita sint cerebri , & præcordiorum fibras cum tono minimè resistenti , seù maximè languido , idcirco prudenter fugere debent ea omnia pathemata , quæ improuisam , validamque in cerebro excitant ideam lætitiæ , vel timoris , propter quam alterantur diametri vasorum , perturbatur motus sanguinis , nec non rithmus vndarum fluidi animalis per neruos , præsertim in præcordia ; ac proindè subuertitur motus cordis , & totius sanguinis non sine euidenti discrimine integræ dissolutionis ipsius vitæ , quæ cum perenni , ac regulari motu istorum præcipuè fluidorum per corpus circumagitur .

De methodo præseruandi a subitaneo interitu corpora valetudinaria.

C A P U T XXIII.



ON arbitror in id mihi studium incumbendum, vt sub isto capite exponam singulas præseruandi rationes, petitas ab omnibus singillatim, morbis, qui ægros in subitas

neces possunt adducere; immensam enim ac penè infinitam rem imprudens tentarem: cum quilibet Medicus ex particulari vniuscuiusque morbi pathologia, ac therapeia (vt cap. XXI. inuimus) methodum, ac remedia præseruatiua ex se ipso copiosè ducere valeat. Quæ enim factum iam morbum tollunt, plerunque antefacta prohibent. Dicemus itaq; breuiter, ac veluti per genera, vt, signatis quibusdam quasi sedibus, Practicorum memoriam iuuemus.

II. Et quidè, vt hîc etiàm loci congruum ordinem sequamur, considerabimus ex huiusmodi valetudinarijs corporibus alia, interiùs, alia exterius ægrotare, iuxtà quam diuisionem prophylacticas medelas apertius inueniemus.

*Ex valetudinarijs
alijs interiùs, alijs
exterius ægrotant.*

III. Inchoantes verò ab internis morbis, quantum isti varijs modis inuicèm permisceantur;

tur; immò rarò malum vllum sine complicac-
tione prorogetur; attamen quò clariùs, ac
firmiùs medelarum notiones Curantium ani-
mis hæreant, operæ pretium censemus in re
præsenti generales tùm ipsarum ægritudinum,
cùm remediorum ideas omninò distinctas tra-
dere, quas Medicus pro sua deindè pruden-
tia in particularibus casibus facilè componet.

*Triplex affectio-
num genus valetu-
dinarios ad subi-
tum interitum dis-
ponit.*

IV. Præternaturales affectiones partium
maioris vsus, quæ homines valetudinarios de-
tinent, tandemque repentè possunt occidere,
ad tria præsertim genera reducuntur; primò
ad lentas corrosiones; secundò ad pertinaces
conuulsiones; tertio ad congestiones. De
singulis seorsum agemus, etiamsi corrosio
spasimum, spasmus congestionem, & e con-
trario, vel perturbato ordine, singulæ sin-
gulas inducant.

*Primum est in-
ternorum sangui-
ferorum lenta cor-
rosio.*

V. Lenta corrosio internorum sanguife-
rorum, siuè aneurysma sit, siuè varix, vt-
potè frequens causa inopinatæ mortis, meri-
tò omnium prima se nobis offert perpenden-
da: vtra enim sit, cum alicubi integrum
tollit membranarum repagulum, illicò trans-
uersam, deterrimamque sanguini viam intrà
cavitates aperit, morteque perimit impro-
uisâ.

*a Lib. I. de morb.
n. 10.*

VI. At verò, vt plura simul comple-
ctamur, illud, præ omnibus, hisce in casibus
valere censemus, quod proponit (a) Hipp.
in

in pectoris , ac pulmonum varicibus , quarum sub nomine aneurysmata comprehendere videtur ; inquit sanè . *His confert , si circa exordia curandos susceperis , ut manuum vene relaxentur , & victus ratione utatur , ex qua siccissimus , & maxime exanguis euadat .* Neque certè diuturna praxis ullam tutiorem præservandi methodum nos edocuit , quàm si huiusmodi ægri , post parcas inter initia phlebotomias , in viuendo sint continentes , abstinentesque . Plures idcirco nouimus religiosos Viros , qui præcordiorum aneurysmatibus correpti (^a) vt superiùs obscurè indicauimus) propter accuratum vitæ regimen ad vltimum vsque senium peruenerunt , ac nonnisi ex lenta tabe , vel hydrope paulatim decesserunt . Contra verò quotquot istiusmodi mali genere diuexati , genio , & gulæ indulserunt , vel immoderatis motibus corpus exercuerunt , omnes repentina morte ad sepulcrum festinasse recordamur .

VII. Nostris porrò experimentis ratio non dubia suffragatur . Etenim is , qui varietate utitur , ac multitudine ciborum , potuumque , necesse est , vt multum indè sanguinem , varijs etiàm acredine pollentibus particulis refertum , ingerat . Is paritèr , qui vehementibus tam aeris , quàm exercitiorum motibus sese obijcit (quoniam solida contra fluida , & vicissim fluida contra soli-

Varices pro aneurysmatibus accipit Hipp.

Horum prophylaxis ex eodem .

Authoris exemplum .

*a Cap. 19. n. 4.
Sobrietas , & moderatum exercitium iisdem prodest .*

Experimenta ratione comprobantur .

da maiori nisu impellit, & vrget) necessariò inceptam iam vasorum corrosionem; ac distractio-
nem promptiùs auget, ac perrumpit, quàm qui rectâ vtitur, ac moderatissimâ ratione sex rerum nonnaturalium, & præsertim diætâ, quam tan-
aDe Fract.n. 29. toperè laudat ^(a) Hipp. in vlceribus. Euidens sanè, si ab animantibus etiam discedamus, exemplum præbent flumina, quæ, licèt ripam pluribus locis perruptam habeant, tamèn extra illam non diffluunt, neque in vicinos campos euagantur, nisi cum noua, magnaue accedat recentium aquarum copia, vel aduersus ventus profluentibus vndis vehementissimè obsistat, ac renitatur.

Quomodò lymphatica in præcordijs vel cerebro debilitata, ne breui distrumpantur, præcauenda.

VIII. Quod de solis sanguineis vasis hucusque protulimus, ad lymphaticorum quoque texturam debilitatam referri posse non dubitamus. Etenim, si huiusmodi lymphaticorum vitium, in præcordijs, vel cerebro existens, teneat hominem, qui modicum cibum, & parciorem potum vnâ cum benignis vulnerarijs vsurpet, is plerunque consenescit, ac lentè quoque cum ipsa vasorum ægritudine commoritur. Contra verò, si homo iste helluo fuerit, & bibax, magnâ ocysimâque subortâ feri intrà ventres effusione, alijs etiàm concurrentibus causis, interdum occidit inopinatò.

IX. Pauca nunc addenda putamus de vulnerarijs decoctionibus, quæ, cum satis superque apud Medicos innotescant, longo ser-

sermone non indigent . Dicemus duntaxat , illas , si temperatæ , nec admodum resinosæ fuerint , acre , quod in fluidis dominatur , facile absumere , talemque sanguini crasim conciliare posse , per quam fibræ discissæ , aut planè coalescunt , aut saltèm ab vltiori plerunque vindicantur erosione . Quinimò quoties impendit periculum effluxuri e vasis magnâ copiâ sanguinis , ad sauciatorum , vt aiunt , anchoram erit confugiendum , scilicet ad opium vstum , ad fungum melitensem , ad medicamenta ex vitriolo præparata , aliaque huius generis , quæ , & sanguinis impetum , & vaforum laxitatem coercendo , futuram ex nimia hæmorrhagia improuisam mortem saltèm suspendunt .

X. Rationem deindè præseruandi a subita nece illos homines , qui pertinacibus conuulsionibus detinentur , (quam secundo loco tradendam posuimus) nemo proximè attingere , multò minùs complecti poterit , nisi priùs loca , & causas conuulsionum accuratè distinguat . Etenim , si spasmodicæ passiones fuerint in stomacho , hypochondrijs , vel vtero , pendeantque a succis ad subtile , & sulphureum acre exaltatis , eo in casu conducunt aquea , subacida , emplastica , balnea , duciæ , serum , & lac . Quinimò ad antidota etiam recurrendum erit , vbi venenorum sit metus ; quemadmodum , si dolores vrgeant , ad moderata quoquè narcotica , sulphur vitrioli , ens veneris , aut bezoar-

Ex vulnerarijs decoctionibus quales ad vsum reuocanda .

Ratio præseruandi in spasmis a materia subtili productis .

Ex materia viscida aliter tractandi.

ticum iouiale. Si verò viscidulum sit fermentum, sed absque suppuratione, tunc oleosa cum fluidis, martialia, amara myrrhata, & præsertim rhabarbarum, & cortex peruuianus, cum specificis anthystericis, & antispasmodicis, mirè conferunt; eoque magis si vermes in discriminis causam venire cognoscantur; quo in casu etiam ad mercurialia tutò deuenimus.

In pectoris conuulsionibus pars affecta diligenter perquirenda.

XI. Si conuulsiones obseruentur in pectore, videndum, vtrum in pulmonibus, an etiam in corde, & magnis vasis; & tunc maximè ad causas respicere oportebit, & potissimùm cognoscere, vtrum de sepulto tuberculo, vel aneurysmate sit dubitandum, ad quorum malorum discrimina prophylaxis quoque erit dirigenda. Porro; si solitarius fuerit, aut cum simplici lymphæ congestione thoracis spasmus, tunc vsurpanda erunt, iudicio Curantis, oleosa, sulphurata, terebinthinata, succinata, camphorata, emulsiones, aliaque multi generis aquea, & diluta. Si, præter spasmodicas contractiones, dolores, & febres vrgeant, laudantur iuxtà doloris gradum, ægrique vires, etiàm phlebotomiæ, & mitissima paregorica, de quibus prudens, ac sciens Medicus opportunè decernet.

His phlebotomia quando conueniat.

Cardiaca præscribendi ratio.

XII. In reliquis, vbi malum hæret præcordijs, & erosionis metus longissimè fuerit, identidè sunt præscribenda cardiaca,

atque

atque etiam, si opus fuerit, quæ ex stibio, vipera, mumia, & myrrha conflantur.

XIII. Deindè si conuulsiones existant epilepticæ, vel ad epilepticam indolem tendentes, perpendendum erit, num affectio sympathica sit, ex infernorum scilicet viscerum, totiusque corporis consensu, an idiopathica ex peculiari cerebri passione. Etenim iuxta hanc diuisionem præseruatorias curationes inter se admodum diuersas instituemus. Siquidem, si fuerit vitio stomachi, & succorum intestinalium, omni alio pharmaco melior est vomitio, & alui deiectio, per epicrasim instituta. Hinc passim Romæ occurrunt multi, qui, licet scotomijs, alijsque capitis affectionibus, fortes apoplexias, subitasque neces minitantibus, iamdiu tentati fuerint, senes adhuc decrepiti, ope Pill. de Succin. Craton., de spuma chalybis, vel alterius benigni soluentis, identidem intrà annum repetitorum, seruantur incolumes.

Sympathicæ epilepsiae vomitus et epicratica purgatio proficua.

Hæc Romæ præsertim ab apoplexia præseruat.

XIV. Si verò huiusmodi affectiones a recurrente vasorum sanguineorum plenitudine, aut suppressis hæmorrhagijs dependeant, tunc phlebotomiæ interdum instituendæ, ac fonticuli etiàm admouendi erunt.

Phlebotomia quædam celebranda.

XV. Quòd si tandem eadem mala, ob inductam in cerebro labem, idiopathica etiàm euaserint, nullo certius remedio extra limites inferendæ subitæ mortis contineri possunt, quàm

In epilepsia idiopathica abstinere a uino magnum est medium.

quàm, si æger abstemius spontè factus, specifica antepileptica, ac laudabile vitæ regimen perpetuò adhibuerit. Nec meditata solum, sed diù etiam experta in præsens referimus; quibus sanè observationibus ipsius quoque ^(a) Hippocratis consilium accedit; is enim agens de insomnijs, comitiales morbum, aut insaniam significantibus, monet, ut *egri cibis paucis utantur; ita namque integram valetudinem sibi tota vita comparabunt.*

a Lib. de insomn:
n. ult.

In congestionibus
curandis Medicus
sit prudens.

XVI. Denique circa congestiones nonnulla breuiter differemus; eæ nanque, cum nimio, varioque inter se discriminentur intervallo, Medentium ingenia, usu firmata, ad capiendum consilium in arena duntaxat mouere possunt. Prudens itaque Medicus in horum morborum curatione ita se exerceat iuxta ^(b) Hippocratis oraculum, *ut prosit, aut non noceat.*

b 1. epid. sect. 2.

XVII. Cum verò congestiones modò imo in ventre, modò medio, modò in capite fieri contingat; nunc ab humoribus lentis, & crassis, nunc a salinis, & acribus, nunc demum a mixtis, & sulphureis, siuè cum suppuratione, siuè sine ea; equidè arbitror summo Curantium iudicio, atque experimento opus esse, ut hisce in casibus recta præseruandi ratio instituat. Illud solummodò in genere admonemus, scilicèt ubi viscidum, ac salinum phlegma in aliquo ventre peccauerit,

con-

Iuxta congestæ
materiæ indolem
prophylaxis dirigenda.

conducere rhabarbarata , aloetica , chalybeata , stibiata , potum Thè , vel Coffè , therebinthinata , aliaque gummofa , tenacitatem soluentia : vbi falinum , & acre , iuuare aquea , succos herbarum epicerausticarum , diluta , lactiginofa , oleofa , & alcalica , partim fixa , vt stibium diaph. , partim benignè volatilia ; vbi tandèm vitium est in sulphureis , mixtisque principijs , mixta remedia vtilia fore , præfertim si de occulta dubitetur suppuratione , quo in casu , post phlebotomiam , initio morbi , si res postulat , institutam , ea vsurpanda , quæ pus , ac saniem dulcificare , quæ sphacelum arcere , quæ demùm , rupto abscessu , vlcus abstergere , & consolidare valent . Eligat itaque peritus Medicus ex omnibus optima , & vnicuique adhibeat in re tunc præfenti , quæ magis congruunt , illius apud
 (a) Celsum consilij perpetuò memor , nempe
 -- nulla re magis laborantem iuuari , quàm tempestiua abstinentia , semper querentes non quid Medico liceat , sed quid ægro salutare sit , cui vehementer nocet , quoties in eius , quod assumitur , vel tempore , vel modo , vel genere peccatur .

a Lib. 2. cap. 17.

Opportunum Celsi consilium.

XVIII. Sed , stante eâ diuisione , quam circa initia huius capitis posuimus , superest , vt agamus etiàm de methodo prophylacticâ dirigendâ ad homines externis morbis valetudinarios . Cum verò certum sit apud ista corpora idcirco fartam , tectamque interno-

Externi morbi diuturni valetudinarijs potissimum vtilis , & cur .

rum

*Quomodo tractan-
di ne subito peri-
mant.*

rum viscerum texturam seruari, quia prauum humores ad artus cum podagra, aut quouis tumore, vel ad superficiem corporis cum vlcere, fistulâ, scabie, vel alio morbo decumbunt; profectò vniuersa ratio præseruationis a subitis malis, subitas necesse inferre valentibus, versari videtur circa auxilia, quæ primò seruare possunt firmum, validumque fibrosum rete internorum viscerum, & vasorum, vnâque simul congruam fluxilitatem; dulcedinem, & crasim liquidis conciliare; vndè quidquid intus redundat incongruum, atque impermiscibile, excitato confectum stimulo, foràs vtilitèr propellatur, ac veluti despumetur; deindè, quæ simul tollere valent in affectis externis locis ea impedimenta, quæ aliquando obijci possunt ipsis salutaribus fluidorum propulsionibus, remoris, ac secretionibus.

Methodus generalis præseruatiua.

XIX. In genere itaque iuuabunt alimenta optimi succi, iura interdum viperata, serum cum infusione rad. chinæ, & alia eiusmodi, quæ robur solidis partibus, benignamque volatilitatem, ac fluxilitatem humoribus tribuunt; simulque ea omnia, quæ partes externas ita tuentur, ac disponunt, vt nullo callo, nullo lœue, etsi minimâ, constipatione laborent, per quam internis nîsibus renitantur. Nunc ad Artis Magistros, non ad solos Candidatos scribimus; eâ proptèr non pudet breuia tantum

me-

medendi monstrare compendia . Illud tamen docuisse nunquam satis contenti erimus, frustra nempe præseruandi rationes a subito interitu illum foris quærere ex medicaminibus, qui domi spreuerit diætam . Cætera Medicinæ præsidia interdum fallunt, vnum nullo vnquam tempore fefellisse comperimus, rectum scilicet vitæ regimen, ac tranquillum, infractumque in benè, vel malè valentibus animum : ijs enim duobus veluti axibus vniuersus ferè præseruationis orbis a subitanea morte circumagitur . Nequè profecto hâc super re decipi nos patitur Diuinum illud monitum apud ^(a) Marcum, vbi Christus Discipulos admonet, vt sobriè viuant, & a grauibz temperent Mundi curis, ne subitis mortibus causas exhibeant -- *Attendite vobis, ne fortè grauentur corda vestra in crapula, & ebrietate, & curis huius vitæ, & superueniat in vos repentina illa dies: tanquam laqueus enim superueniet in omnes, qui sedent super faciem omnis terræ.* Sileat igitur Medicus, vbi Deus ipse loquitur; & quidem sine parabolis certiores prophylaxis rationes nos edocet, quas certè annuâ calamitate docti, vt mox videbimus, viuâ deinceps memoriâ retinere debemus.

Diætæ cæteris remedijs præstantior.

a cap. 21.

Recto viuendi regimini animorum tranquillitas iungenda; ex diuino etiam Oraculo.

Finis Primi Libri.

O

De

DE SVBITANEIS
MORTIBVS

In particulari

LIBER SECVNDVS.

DE SVBITANEIS MORTIBVS

ILLARVMQVE CAVSIS

Quæ decursu annorum
1705. & 1706.


ROMÆ CONTIGERVNT.

LIBER SECVNDVS.




*V*oniam Libro præcedenti quaesitum est in genere quid subitæ mors? quales sint eius causæ? quæ etiam signa, quæque ad illam auertendam remedia, ut vires nostræ tulerunt, ostendimus. Iam hinc supereſt, ut ſecundo Libro agamus in particulari de ijs ſubitaneis interitibus, qui Romæ per hæc tempora crudeli- ter deſauierunt; daturi etiam exempla- rum ſubitarum ægri- tudinum, quæ va-

gabantur , tùm nonnullorum , qui eisdem correpti vel euaserint , vel decesserint . Admonentes intereà , ut ad memoriam reuocentur ea , quæ in limine prioris Libri Benigno Lectori proposuimus circa rationem , propter quam de Subitaneis Mortibus scribere decreuimus .



Quaritur , an causa repentinorum mortium , quæ Roma per hæc tempora grassata sunt , fuerit uniuersalis , & simplex , an verò particularis , & mixta .

C A P U T I.



Acturi nunc de mortibus , quibus hoc anno tot Romani Ciues , atque Incolæ repente sublati sunt ; inuestigabimus primo loco , communis ne , an particularis earundem causa latuerit in singulis .

II Nos minimè fugit , libitinam certis annis , annorumue tempestatibus , non modò in hominibus , ex pestilenti aeris constitutione proficiscentem , sed vel in brutis animalibus , pecudibus nempe , capris , aliisque ex certa aeris labe , vel aquarum , & pascuorum defectu , vitioque natam , improuisò debaccari . Vndè aureis versibus cecinit (a) Fracastorius noster .

Mors repentina quandoque grassatur in homines & bruta ex causis uniuersalibus .

a In syphil .

Inter

*Interdum pœnas animalia sola dedere ,
 Aut multa , aut certa ex ipsis : memini ipse
 malignam
 Luxuriam vidisse anni , multoque madentem
 Autumnum , perflatum austro , quo protinus
 omne
 Caprigenū pecus è cunctis animantibus unum
 Corruit :*

*Repentina mortis
 Romæ nunc gras-
 santis causa non
 fuit vniuersalis ;
 sed cuiumq: mo-
 rienti particula-
 ris , et propria .*

III. In nostra tamen hypothefi probabilius ducimus , causam improuifarum mortium non vnâ omnibus absolutè communem , sed singulis morientibus maiori ex parte propriam extitisse . Quod sanè , tametsi præ meratiocinando ex signis facilè fuerim affecutus ; tum verò mihi tandem placui , cum internum animi sensum externo ipsius rei testimonio , atque certâ experimentorum fide comprobatum intellexi . Ex sequentibus enim apparebit , peculiare , suasque præcipuas cuique causas , seu immaturæ dissolutionis , vt ita dicam , femina paulatim genita , denique confestim ad actum fuisse reuocata , iuxta illud ^(a) Hippocratis , *non enim repente morbi hominibus accidunt , sed , paulatim collecti , acceruatim apparent .*

a 1. de diæt. n. 3.

*Huius discrimi-
 nis causa non fuit
 vsus tabaci .*

IV. Quid enim tabacum incusabimus ; cum nonnulli , quorum nares nunquam puluis iste inquinauerat , ex tempore viderint

occasum ? Quid veneficas ex terræ motibus exhalationes ; cum ij præcipuè a subitaneis tum morbis , tum mortibus se feliciter vindicauerint , qui diruta ex soli conuulsionibus loca potissimum incoluerunt ? Quid cuculatæ abusum ; cum qui a triginta iam annis nunquam non semel , sæpè bis in die (quos inter Cl. D. Placentius Med. Urbis Senior , & octogenario maior , vt & ipse ego , cæterà cauti , numeramur) hoc potu vsi sunt , nullo , vel minimo per hæc tempora symptomate laborauerint . Contra inter eos , qui nunquam illam degustarunt , multi subito interierunt ? Quid tandem ignotum aeris venenum culpabimus ; cum extispicia varias , notissimasque causas rerum naturam diligenter quærentibus apertissimè detexerint ?

Non exhalationes ex terramotibus .

Non Cuculata .

Neque veneficis aeris .

V. Firmant verò sententiam de particulari in singulis causarum concursu præteriti etiam euentus illorum , quos vitam cum improuisa morte commutasse nouimus , priusquam à SUMMO PONTIFICE imperatum nobis fuisset , vt anatomico cultro sepulta veritas erueretur . Etenim nonnulli sublati fuerunt cum indicijs subito disrupti sanguiferi canalibus , quem iam varix , aut aneurysma intrà thoracem , vel abdomen debilitauerat . Multi per fortissimam apoplexiam , ob interceptum , effusumque sanguinem intrà cerebrum . Alii demum ex magno , ac pertinaci præcor-

Authoris experimenta de causa particulari in singulis morientibus

*Nemo nisi val-
tudinarius, & in-
temperans repen-
tè perit.*

*Subita mors in-
ijs ad malam cri-
sim referenda.*

diorum spasmo , aut paralyfi , vel ex obstru-
ctione viarum cordis , magnorumque vaso-
rum ; vndè , impeditâ sanguinis traiectione
à corde tùm in pulmones, cùm in cerebrum,
vitale illud , ac reciprocum istorum viscerum
commercium ex tempore interciderit . Hoc
verò perpetuò est obseruatum, vltimum nem-
pe diem repentè a nemine , quod sciam , vi-
sum fuisse , qui labe aliqua fluidorum , vi-
scerum , aut saltem canalium a multo tem-
pore non laborauerit, quique simul non fue-
rit stationarius miles in castris bacchi , aut
veneris . Quibus fit, vt ipse crediderim, re-
pentinis hosce casus non sanorum plerun-
que mortes , sed quandam veluti humanæ
naturæ despumationem, seu malam crisim,
extitisse apud illos , qui iamdiù palàm , vel
secretò , infirmâ , atque ægrâ valetudi-
ne fuerunt : crisis enim apud theo-
ricos definitur , subita mu-
tatio in morbis ad salu-
tem, vel ad mor-
tem .



Demonstratur, inaequalem aeris constitutionem fuisse etiam inter causas vagantium repentinarum mortium.

C A P V T II.



Icèt dubitationi non sit locus, quin celeres interitus, Romæ hoc præsertim tempore contingentes, magnâ ex parte prædispositis vitio aliquo corporibus debeantur:

negare tamen non ausim vniuersalem aliquem cœlestium, terrestriumque causarum concursum ad hunc producendum effectum conuenire potuisse, sine quo forsitan, nec adeò numerosa, nec adeò subita morientium clades contigisset. Hic autem concursus, vt mea fert opinio, acceptus potissimùm referendus esse videtur præteritarum indoli tempestatum, quas nemo, vel lippus, non vidit excessu quodam intemperierum insidias ægris iam corporibus facilè parauisse. Præcessit enim æstas feruida, atque admodùm sicca; deinceps Autumnus, austro plerunque comitante, pluuiosus; tandem hyems viguit inæqualiter borealis, & australis. Vndè nil mi-

Constitutiones aeris quomodo subitam mortem sollicitauerint.

rum , si tùm solida fuerint enervata, tùm fa-
les acres , partesque sulphureæ a præferuida
elapsi anni æstate (balsamico-oleosa , aquosa-
que, & dulcia sanguinis componentia plùs iustò
dissipante) intrà Romanorum corpora præ-
dominium acceperint ; indèque propter no-
uos motus , & aculeos , periculum valetudi-
narijs struxerint improuisum . Nihil enim
tàm promptè subitanèam mortem solet infer-
re , quàm si momentum impetus , adauctum
in fluidis , debilitatam alicubi resistantiam soli-
darum partium maioris vsus constanter vr-
geat , superetque .

*Impetus liquidus
auctus intra solidum
minus resistens sepe
funestissimus .*

*a De morb. sacr.
n. 15.*

*Auster & Aquilone
noxij ex Hipp.*

II. Quæ autem , & quot sint mala , quæ
nobis obueniunt ex austro , & aquilone , cla-
rè , ac sapienter edixit ⁽²⁾ Hippocrates per
hæc verba -- *Cerebrum ab austris quidèam solui ,
& humectari , & venas laxiores reddi . Ab
Aquilonis verò flatibus , quod sanissimum est in
cerebro , compingi , quod verò morbosissimum , ac
humidissimum est , excerni , & forinsecus circum-
alluere .*

*Roma Auster
deterior .*

III. Cum verò , experiamur fermentati-
uas particulas , ex Africa per austrum adue-
ctas , deteriores reddi exoticorum quorun-
dam miscellâ principiorum , quæ ex romano
solo passim eleuantur ; exinde facile est cau-
sam inuenire , cur multigeni , intrà prædispo-
sita ciuium corpora collecti , erodentes humo-
res , certo quodam tempore delitescere , sen-
sim-

simque vires, per aeris pabula captare potuerint; vt denique, accedente nouissimâ quâcumque causâ, necem subitò intulerint, inductâ post nouum, extraneumque motum, sanguinis plerunque coagulatione, quam serositatum defluxio, atque exundatio consequitur, & de qua, coacti exemplo lactis, egregiè idem locutus est (a) Hippocrates, cum modum exponit, quo ea operantur, quæ ex cœlo nobis obueniunt, si ad ea, quæ in corpore genita sunt, corrigenda inepta fiant. Sales enim acres, ab autumnii pluuijs in fluorem nostris in corporibus euecti, nunc per aquilonares ventos perspirare impediuntur, nunc verò ab austro vlteriùs fusi, transfusim aguntur.

Sanguinis coagulationem serositatum exundantia consequitur.

Hipp. de lacte, coacto exemplum. a 4. De morb. n. 26.

IV. Interim, si cupis modum, quo aer extraneis, atque humanæ naturæ infensis particulis imbuitur, & quomodò interdum per ventos huc illucquè transferatur, plenè id habebis a (b) Franc. de la Boè Sylu.

bIn append. ad prax. tract. 10. n. 124. & seq.



Adducuntur quædam argumenta ad confirmandum non ex vniuersali solum causa tot hominum discrimina Romæ contigisse , sed ob morbosas eorundem corporum dispositiones , ac potissimum intemperantiam .

C A P U T III.



Nobiles, & temperati repentinam mortem non subierunt .

a Loc. sup. cit.

Contrarium accidit ubi ex causa vniuersali, testante Syluius .

Ria hîc obseruatione digna ulterius occurrunt , quæ veris , obscurisque detegendis subitaneorum interituum huius anni causis nouam lucem afferre possunt . Primum illud esse videtur , quod nemo fortè Nobilium , aut eorum , qui frugi vitâ vtuntur , vtcumque subitaneis morbis correptus , vitam subito deferuerit : certissimo quidem argumento , non a solo aeris vitio vagantes Romæ morbos , mortesque ortum habuisse ; cum affectus olim apud Leideneses epidemicus , quem tantâ sedulitate describit ^(a) Syluius , & cuius omnem causam ex aere , tunc plurimum a statu naturali recedente , deriuandam putat , prius & grauius in opulentiores , ac delicates ; ferius , & quodammodo

dò leuiùs in plebem sæuierit .

II. Et quanquàm hisce temporibus nonnulli ex diuitibus apoplexiâ tentati fuerint, adhibitâ tamen opportunâ medelâ, vel ipsi vtcumque conualuerunt, vel syderationes in paralyfes concesserunt. Scilicet quia illi, qui euechymis cibus nutriuntur, qui ab aeris inclementia se se tueri magis valent, quique tandèm, quoties morborum prodromis pulsantur, statim ad remedia confugiunt, vel certè cautiùs deinceps in viuendo se gerunt, talem vitiosorum fluidorum cumulum in se minimè congerunt, qui subitam necem afferre possit. Contra verò pauperes, quemadmodum facultate destituuntur deligendi cibum, & potum, cæteraque ad valetudinis tutelam necessaria, ita passim ad vulgaria, minùsque plerùnque salubria, sunt incontinentiores diuitibus; quinimò, quoties alicuius morbi præludijs tentari incipiunt, curationes, vel nullas suscipere, vel prorogare solent; idcirco in ijs tùm solida, præcordia præsertim, ac cerebrum, sensim labefactantur, tùm fluida, ad morbos inferendos, ac prædictis in partibus manifestandos, magis exacuuntur.

III. Alterum deindè, quod accuratè pariter, diligenterque considerandum venit, versatur circa sexum, in quem istarum decursu tempestatum mors furere visa est; hæc enim, vt contrà masculinum hostilitèr agere, ita

*Diuites vtcumq;
repentinis morbis
correpti præ pau-
peribus felicitiùs li-
berati sunt, et cur.*

*Lethalis hæc la-
bes Mares potius
inuafit quam fæ-
minas.*

se-

sequiorem sexum ferè intactum relinquere consuevit ; vt vix paucas fœminas subitò mortuas ad hunc vsq; diem numerare potuerimus . Conditio sanè morbosæ constitutionis, persimilis alteri, quæ Iustiniani tempore obseruata fuit Constantinopolis , vbi popularis quidam morbus mares magis, quàm fœminas absumebat. An quia mulieres , catamenijs repurgatæ , morbificum apparatus ad irritatiuam , ac suffocatiuam plenitudinem colligere , vt plurimum prohibentur ? An satiùs quia fœminæ, etiàm plebeia, temperantiùs vitam plerunque ducentes , minùs prauorum succorum solent congerere ?

IV. At illud certè ex duabus hisce obseruationibus præcipuè constare videtur , continentiores in cibo , potu , ac venere a subitaneis mortibus se huc vsque opportunè vindicasse ; incautos verò , luxuriosos , vinososque improuisis facilè mortibus concidisse .

Non unicum signorum genus improuiso morientibus præiit .

V. Postremum sedulò animaduertendum illud sanè est , quod morbi , vndè subitæ mortes ortæ sunt , non semper ijsdem signis , ac symptomatibus stipabantur . Etenim aliquibus , per aliquot ante mortem dies , efflorescentia ad cutem apparuit , quâ repulsâ fortissima superuenit apoplexia : vt contigit in primo casu illorum , quos post repentinam mortem dissecuimus . Nonnulli verò, diù ante necem, anhelitu , palpitatione , vertigine , atque animi deliquio sæpiùs correpti , morte

tan-

Apud Sigonium de occident. imper. lib. 20.

Vnde hoc .

tandem occubuerunt, vt in V. casu obseruatum. Vidimus etiam non paucos, qui, præcurrente thoracis, totiusque corporis conuulsione, sublati fuerunt, quorum numero quartus casus accensendus. Nec defuerunt qui, ex affectione ferè scorbuticâ diù valetudinarij degentes, propter improuisam tandem choleram, subito conciderunt: quemadmodum accidit cuidam Sacerdoti Societ. Iesu. Denique, vt paucis concludamus, non eadem omnibus communia signa mortem præcesserunt, & comitata sunt: vt iure merito fateri possimus, libitinam ex peculiari vniuscuiusque corporis dispositione magnâ ex parte in Romanos grassatam fuisse. Contra verò fit, cum ex principio duntaxat vniuersali frequentes interitus in genus aliquot animalium debacchantur; tunc enim eadem semper indicia, actionumque læsiones, mortem præcurrunt. Hinc legitur apud ^(a) Sylu. anxietates, nauseam, ac vomitum suos in primis ægros inuasisse, & apud ^(b) Fracast., de caprigena clade canentem, signa futuræ mortis tussiculam semper præcessisse.

Si ab vniuersali causa, eadem continuò signa adsunt.

a Loc. sup. cit. n. 4., et seq.

b in Siphil.

VI. Accedit etiam, morbos, qui elapsis mensibus ad mortem iter fecerunt, nullâ contagione in affines, necessarios, aut in cadauerum sectores migrare obseruatos fuisse; indicio sanè non obscuro, nullum in ijs viguisse virus, per quod de vllo epidemico,

Q

aut

aut pestilenti morbo fuerit metuendum.

Plures Italiae Urbes hac peste alias correptæ.

^a De caus. sub. mort. cap. I.

VII. Nouum sanè non est per interualla, incertis redivis , hîc illîc subitaneas mortes ex sporadicis morbis in terris apparere . Etenim non solum Venetijs, sed & Romæ, alijsque Italiae Ciuitatibus id contigit circa initium præteriti sæculi , vt narrat ^(a) Dom. Tirillus in tractatu , quem de hoc eodem argumento illâ occasione satis diligenter conscripsit . Pariter Romæ sub Alexandro VII. cadauera quamplurima repentè mortuorum adaperia fuerunt a Ioh: Trullio Chirurgo Pontificio, qui, ferè in omnibus, vasorum vel intrâ pectus, vel intrâ cranium rupturas, comperijt . Nouimus etiam ante multos annos in Heturia crebrò homines ex tempore mortuos , quorum causæ modò in cerebro, modò in thorace deprehendebantur, de quorum sanè casibus locutum fuisse arbitramur doctissimum Caro-

^b In dissert. epist. de cereb.

lum ^(b) Fracassati. Vt proinde seriò quidem de ipsa morte cogitare , sed mirari minimè debeamus, eandem non rarò clanculum, ac festinanter ad nos venire .



*Numerus morientium in Vrbe forsitan
hoc tempore minor extitit, licet
maior visus sit, ex quo con-
sueti, & exitiales Ro-
mæ morbi nequa-
quàm vaga-
ti sunt.*

C A P U T IV.



N admirationem certè nul-
lam peritiores Medici hoc
anno duci deberent ex pau-
lò frequentiori subitò mo-
rientium numero in Vrbe, si
aduerterint decursu superio-

rum tempestatum, æstatis nempè, autumnì,
atque hyemis, in quibus crebrò repentini ho-
minum interitus contigerunt, morbos Romæ
consuetos, malignas nimirum febres, pecto-
ris inflammationes, aut prauas dysenterias,
ex quibus multi solent decedere, rarissimè
inualuisse; ita vt in hanc nostram temporis
constitutionem illud aptè quadrare videatur,
quod (a) Hippocrates ætate sua obseruauit

*Grassantibus re-
pentinis mortibus
cæteri morbi, et
mortes Romæ mi-
nùs frequentes.*

-- Resolutiones, nimirum, cæpisse ex syderatione,
& quidem multos ex ipsis subitò mortuos fuisse,

a 1. epid. con-
stit. 3.

*cum morbus esset satis popularis . Ceterà incolu-
mes debebant . Vndè, si subitanæ huius anni
mortes , quæ ferè solæ contigerunt , confe-
rantur cum vulgaribus mortibus singulorum
ex superioribus annis, credimus, hosce interi-
tus longè minores inuentum iri . Quid igitur
erit causæ , cur nunc miremur, ploremusque,
(animarum excepto periculo) fortè non
adeò magnum numerum acutissimorum mor-
borum, repentè interimentium , cum plures
mortes ex alijs , ac potissimùm acutis ægri-
tudinibus, elapsis annis , impauidi siccisque
oculis spectauerimus ? Ille siquidè prauo-
rum humorum apparatus , qui aliàs ex æsta-
te pluuiæ , ac prauitate fructuum nostris in
corporibus paulatim colligi , & vi cuiusdam
fermentationis , ac penè putrescentis liqui-
di, ægros longiori viâ de medio tollere con-
suevit ; hoc anno in se ipso magis existens,
vt ^(a) Hip. dicto vtar, promptior ad motum ,
& potentior hîc ad solida irritandum, scinden-
dumque, illic verò ad fluida coagulandum, aut
dissoluendum , redditus fuit, proindèque adeò
præcípites mortes valuit inducere . Exinde ani-
mos ad spem ereximus, transacto verno æquino-
ctio currentis anni 1706., per nouam aeris, ac ter-
raquei orbis re fermentationem , perq; ventorum
permutationem, morbosum istum particularum
concursum, & commixtionem variatum iri: vn-
dè lethalis , ac mortifera constitutio , de sua*

Ratio adducitur.

a De vet. Med.

re-

remitteret fœuitie , Deoque omnium bonorum largitori debitas laudes sospites , hilaresque redderemus . Quod sanè præfagium exitu maximè comprobatum nunc cernimus , cum opus hoc , in lucem edituri , expolimus . Sed quoniàm nullum in terris bonum absque mixturâ mali hominibus accidit , indè fit ,

vt , dùm de felici , faustâque repentinarum cessatione mortium iure gaudemus , & gratulamur , sub fœnore beneficium nos accepisse

Cessatis repentinis mortibus consueti morbi , et lethales recrudere.

præsentiamus . Nunc enim , vel decursu æstatis , acutas febres , lethalesque peripneumonias fœuire passim intuemur , dolemusque .



*Quæ remedia hoc anno ijs maximè profuerint , qui a subitaneis morbis ,
repentinas mortes minitantibus , euaserunt .*

C A P U T V.



Vm fatis pateat ex antedictis, Nobiles , ac diuites, immò , vt postea resciuimus, nonnullos etiàm pauperes , subitaneis morbis tentatos , hoc anno conualuisse, non dubitamus , quin pius , utilisque noster futurus sit labor in ijs diligentè recensendis , quibus iidem ex repentinis mortibus euaserunt . Ita Medici, recurrentibus aliquandò consimilibus anni constitutionibus , firmata nouis experimentis inuenient præsidia, quorum ministerio ægri vel a morte penitùs vindicari , vel saltem tantum temporis lucrari valeant , vt anteaactæ crimina vitæ (quod cardo rei est) sacrâ exomologesi expiare , seque Numini commendare possint.

II. Et quoniàm ægri , qui morbi vim superarunt , quantùm nobis innotuit, apoplexijs cum epilepticis , vel syncopalibus affectionibus , absque vllâ tamen vasorum scissione ,

aut

aut rupturâ, potissimùm tentati fuerunt; idcir-
cò rationi consonum ducimus, ea nunc reme-
dia indicare, quæ in hac temporis constitu-
tione plerunque vtilia deprehendimus.

III. Inter ea verò, quæ maximè profi-
cere visa sunt, primas tenuit sanguinis mis-
sio ab ijs, vel illis venis, iuxtâ ægrorum
vires, consuetudines, aut suppressas euacua-
tiones celebrata, & præsertim in Viris ple-
thoricis, nunc ex brachio, nunc ex pede.
Vbi aduertimus in affectionibus apoplecticis,
cum resolutione alterius cruris, nos proficuum
expertos fuisse venæ sectionem ex syderato
talo institutam; fluente enim ex affecto mem-
bro sanguine (quemadmodum in coxendi-
cis doloribus apertâ sub eodem poplite, vel
in crure, quam ischiadem vocant, venâ,
feliciter contingere obseruamus) facilius, ac
fortiùs dimoueri possunt obstacula conuulsio-
num, & obstructionum, quæ in vasis læsæ
partis spinalis medullæ, vel cerebri basis per-
tinacitèr hærent. Quibus autèm hæmorrhoi-
des, aut menstrua restitissent, iuuat ex pede,
atque ex podice. Tandem ijs, in quos, vel
ob prouectiorem ætatem nulla inferiorum ve-
narum sectio cadebat, vel post alias phlebo-
tomias contumax adhuc strangulatio arteria-
rum carotidum, & sinuum duræ matris per-
seuerabat, miram opem tulit aperire venas
frontis, nasi, & præsertim iugulares, ex qua-

*Sanguinis missio
varie administrata
vtilis fuit.*

*Eadem in syde-
rata parte pro-
ficua.*

rum

*Iugulares , nasi
&c. venæ quando
aperiendæ*

rum profectò sectione , quanquam serò ; & citrà præuias dispositiones tentata , aliquam tamen vtilitatem reportauit Illustrissimus Præsul Rota , qui , cum acutâ feбри , & suffocatiuâ pulmonum plenitudine correptus esset , indicatæ missioni sanguinis ex cubiti flexura (dolente nobiscum D. D. Bernabeo diligenti eiusdem Physico) omninò repugnauit : perperam enim hâc de re astra sibi familiaria consuluerat: factâ postmodum ad cerebrum metastasi , in apoplexiam incidit, & cum minùs speraretur, vt resiperet, incisâ iugulari, statim ad sensuum officia redijt , & suæ compos mentis multas horas pro salute animæ consecutus fuit ; licèt eâdem pulmonû affectione redeunte, tandem decesserit.

*Quare vtile sit per
hæc vasa sanguinem
mittere .*

IV. Rationes verò , ob quas phlebotomia venarum frontis , nasi , ac potissimùm iugularium in calidis , & sanguineis cerebri affectionibus iuuare plurimùm solet , petendæ forent ex pródromo nostro , quem Antepoxim morborum cerebri inscribimus ; vbi solidè agimus de peculiari sanguinis itu , reddituq; per cerebri vasa , ac de sublimi artificio , quo instrumenta respirationis, iuxtà indigentias œconomix animalis, augment, vel minuant impetum, ac proinde molem eiusdem sanguinis, tùm propellendi per arterias carotides, quæ non rectâ , sed obliquâ , atque inflexâ viâ cranium perforant , cùm reducendi a iugularibus , quæ non sparguntur per cerebri
sup-

superficiem , sed medijs duræ matris sinibus sanguinem hauriunt . At enim verò , cum hîc versemur intrâ limites propositi thematis , satis erit indicare , prædictas venas , cum per lanceolam scinduntur , affatim illum , vel illi proximum sanguinem profundere , quo intercepto , sinus tument , cerebrum , ac nervi irritantur , ac premuntur ; & quo expeditè recirculante , cor , & pulmo vltro grauarentur . Vndè nil mirum , si , hoc particulari detracto cruore , liberior redditur sanguinis fluxus in cerebro , & præcordijs , ac pro ratione virium causæ morbificæ , atque ægrorum tollerantiæ , istorum viscerum conuulsiones , ac sanguinis quoque moræ impediuntur .

Inguarium incisio cerebri et præcordiorum leuamen .

V. Similitèr incisio venarum sublingualium in aphonis , detrahens ex affecta parte sanguinem , ea vasorum tollit impedimenta , quæ nervos , inductâ pressione , aut conuulsione , suo priuabant officio .

Sublingualium in aphonis utilis .

VI. Sed , redeundo ad hypothesim , contulit porrò meâ sententiâ in constitutione istâ repentinorum morborum sanguinis missio , quia ægri , quorum mala inducias pro tentandis remedijs Medico præbuerunt , inter illos numerabantur , qui vtplurimum probis alimentis , vino , & cuculatâ vti fuerunt . Deinde verò , quia illorum non aspernanda , inter externas , causâ fuit præferuida , & sicca æstatis constitutio , quâ sales sulphurei , maximè-

Bene nutrita corpora feliciorè sanguinis missionè sunt experta ; et cur .

R

que

*Hippocratica va-
forum interceptio
nis modus expo-
nitur.*

que acres intrà optimè saginatam sanguinis
massam exaltari solent, qui sales, cum solito
maiori momento motus quaquaversum per
corpus ferantur, minimo negotio intrà ten-
dineo-musculares membranas sinuum duræ
matris, ac magnorum vasorum cerebri, aut
præcordiorum impingunt, easque rigidas fa-
ciunt, & crispant; exinde, angustatis sangui-
ferorum finibus, & caudicibus, libera tollitur,
apud huiusmodi viscera, ipsius sanguinis circula-
tio, quam, vasorum interceptionem, vocavit Hip-
pocrates, qui sanè primus hisce in casibus phlebo-
tomiam laudavit. Et quidem huiusmodi affectio-
nes si rupturâ vasis caruerint, remittunt missio
sanguine, quia nempe scissâ venâ simul cum
ipso cruore, quâ datâ portâ, illud effluit acro-vo-
latile, quo detractò, statim eneruatur, ac de-
bilitatur excessus momenti eiusdem sanguinis
contra vasa, quæ propterea excessu tensio-
nis, & crispaturæ contra sanguinem niteban-
tur. Insuper, inducto per phlebotomiam no-
uo in sanguiferis spatium, fluidorum motus,
& remixtio liberior redditur, indèque, si quæ
alicubi vrget canalium conuulsio, vel obstru-
ctio, rapiditate introfluentis liquidi remittit,
ac cedit.

*Hanc phleboto-
mia tollit teste Hip-
pocrate.*

*Sanguinis missio
Romæ non semper
proficua.*

VII. Hic seriò aduertendum putamus, nos
missionem sanguinis non semper in epilepticis,
apoplecticis, ac suffocatiuis affectionibus Ro-
mæ proficua expertos fuisse; idcirco, cum
in

in subitis casibus nostræ confusio mentis primum faciat iter ad errorem, caueant Medici, ne ad huiusmodi, quod tantoperè apud aliquos laudatum, expeditumque est remedium, inconsultò descendant; cupientes enim sanare ægrum, ut Celsi dicto utamur, ex tempore iugulabunt. Sedulò itaque videant, quæ scripsit ^(a) Hippocrates, circa indicationes, ac signa pro mittendo in ijs casibus sanguine; & de tempore quoque, in quo conuenit, (quod circa mali principia esse solet) consulant doctissimos Viros ^(b) Ballonium, & ^(c) Martianum.

a De vict. rat. in morb. acut. n. 37. et seq.

b Lib. 2. consil. in com. ad histor. I.

c In com. ad suprad. Hip. textū.

VIII. Quid? quòd Romæ rariùs, quàm in montanis regionibus venas incidere conuenit, præsertim cum vel corpora ingluuiei multigenæ, & impuræ sunt assueta, vel æstas viget pluuiæ, fructusque ad perfectam maturitatem non peruenerint; quibus de causis incolæ, ac Ciues apparatus cumulant humorum, ex quibus plus impuri, quàm balsamici sulphuris, plus fixorum, quàm volatilium salium redundat, & proindè laxata fluidorum compages ad eam prona fit crassim, quam scholæ satis barbarè putredinosam, ac malignam appellant, in qua quidè, propter volatilium partium penuriam, instar toxici esse solet Phlebotomi lanceola. E contrariò, cum optima præcessit victus ratio, atque æstas pertinacitè feruet, ac sicca permanet, fructus-

In male nutritis corporibus sanguinis missio cur perniciosa.

*In bene pastis quā
uis senibus ea-
dem salutaris.*

*Mira ad hanc rem
historia.*

que abundant maturi, Romanorum in corpo-
ribus sulphur, salesque, etiāsi acres, vo-
latiles tamēn, vt superiūs monuimus, eue-
huntur, & subseruiunt vtilitati, ex ipsa san-
guinis missione capiundæ; quemadmodum,
contigit hoc anno, quo etiam in senibus be-
nē nutritis mirum, vel ipsā docente naturā,
habuimus experimentum. Dominicus Vec-
chiottus septuagenario minor, habitus ple-
thorici, ac pinguis, fessili vitæ deditus, &
carniuorus, cum per mensem circiter capitis
grauitate, ac somnolentiā adeò premeretur,
vt in ipso telonio, pecunias numerando, ce-
dulasque scribendo, dormitaret; vndē iam
in limine apparens timebatur apoplexia: no-
cte quadam improuisò largā e naribus corre-
ptus fuit hæmorrhagiā vndecim librarum pon-
dere, quā sanē non modò nullam ipse pas-
sus est sensibilem virium iacturam, sed ab
illo capitis veterno, se valde leuatum sensit;
immò post 15. dies, alijs quatuor libris ef-
fluentibus, omninò vindicatum. Magnum
profectò docilibus Erasistrateis lumen, atque
exemplum; ita vt Clarissimus, parique do-
ctrinā, & facundiā præditus, Iacobus Sini-
baldus in consilium vocatus, visā integrā
iudicatione, nihil innouandum censuerit,
solā admonitione contentus in diætæ regimi-
ne, & præmaturā deinceps phlebotomiā, cum
primū turgentiae signa fuerint apparitura.

Se-

IX. Secundò, ea paritèr omnia in corporibus benè nutritis iuuamen attulerunt, quæ ad superficiem, atquè ad extremas corporis partes illam reuellere potuerunt irritationem, quam in præcordijs, aut cerebro, sub forma strangulationis canalium, tanto cum ægrorum discrimine incuneatus subtilis ichor moliebatur. Immò hoc remedij genus eò securiùs opem tulit, quò magis irritatio euacuationi ferositatum salino-acrium tanquàm causæ morbificæ iungebatur. Idcirco ex usu fuerunt non solum frictiones, & cucurbitulæ, sed phœnygmi quoque, & vesicantia plantis pedum, artubus, & occipiti, statim admota.

Laudantur Reuellentia.

X. Neque porrò dubitamus, quin vesicantibus opus sit in curatione huiusmodi subitaneorum morborum, dummodò a vasorum rupturis non profisciscantur. Etenim, cum istorum plerunquè causæ malorum sint succi, ex omninò præternaturalibus particulis coalescentes, motuque penitus inordinato prædicti, qui non continuò congruunt cum fecerniculis naturalibus, ad naturales, & consuetos recrementitios humores excipiendos comparatis; necesse profectò est in repentinis hisce affectionibus ad artificialia, & morbosa emissaria recurrere; vt ægri, apertâ per artem viâ, statim id assequantur, quod vix serò, & difficulter naturæ beneficio impetrarent, quæ & ipsa, vbi viribus magis valet, nixu suo, non-

Vesicantia opportuna si vasorum ruptura non adsit.

Eadem sunt emissaria artificialia, ad sup. lementum naturæ, et imitationem.

nonnisi nouis patefactis vijs , nempè per ab-
fcessus , laboranti succurrit .

XI. Silentio deindè minimè prætereun-
dum videtur , quod a D. Doctore Misti-
chello non aspernandum accepimus , nimi-
rùm a se obseruatum fuisse in Xenodochio
Insulæ Tyberinæ , vbi curandis agrotis præpo-
situs est , aliquos de plebe , quos nullum
quantumuis validum , atroxque remedium a
fortibus apoplexijs excitauerat , per admota
plantis pedum ignita ferramenta ad vitæ of-
ficia subitò reuocatos . Scilicet , quemadmo-
dum (a) Claudinus consulit in apoplexia , &
syncope punctiones volis manuum , & post
(b) Fort. Fidel. , (c) Henricus ab Heers nar-
rat , se aciculam prælongam inter pollicem pe-
dis sub vngue cuiusdam apoplecticæ , nullum
vitæ signum præbentis , adegisse , illamque
momento citiùs excitasse ; ita certò credimus
multò efficacius præsentem ignem , validissi-
mè irritando fines neruorum , maximum in
ijsdem tremorem , & subtilissimarum partium
excursum per eorundem filamenta inducere
posse , qui , ad vsque principium propagatus ,
fortitè etiam excutiat quidquid cerebro , &
neruorum ostiolis pertinacitè hæret , & per
talem duntaxat maximam neruorum succus-
sionem , & particularum ignearum penetra-
tionem amoueri potest . Quo fit , vt omnes
ferè Practici in curatione fortis apoplexiæ me-
mi-

*Ignita ferramen-
ta plantis pedum
admota .*

a Empyric. Ra-
tion. lib. 3. cap.
17.

*Punctiones item
volis manuum .*

b De relat. Med.
lib. 4. cap. I.

c Obs. 21.

*Acicula sub pol-
lice pedis adacta.*

*Ignis vis quando a
cerebro, neruisq.
impactum excu-
tiat.*

minerint, non tantum fonticulorum occipiti, sed etiam laminarum ignitarum, ipsis futuris admouendarum. Ac propterea anilem censemus metum nonnullorum, qui, ne morbi causam, forsitan igneam, exacuant, a vesicantium, ignisque usu, in huiusmodi malis, omnino abhorrent. Aliud enim est methodicas, regulares, aut praeferuatiuas, aliud coactas ac repentinas morborum curationes instituire.

Lamine ignite in forti apoplexia commendatae.

In curatione coacta valida non damnanda remedia.

XII. Terrio, leuamen pariter non leu porrexerunt ijs, qui, post sanguinis missionem, vel sine illa, deglutiendi potestatem recuperarunt, ea, quae aluum laxare, ac mox validius mouere potuerunt. Atque hinc, si quando infimi tensio, ac renixus ventris (quod saepe accidit) occurrebat, statim exhibuimus oleum amygd. dulcium, & iniicienda curauimus clysmata emollientia, simulque irritantia. Vbi vero ventris durities aut minimè deprehendebatur, aut mox per oleosa cedebat, maximè etiam profuit pul. Cornacchini, vel aliud validissimum soluens, cum superhaustu copiosi diluti ex iure, vel aqua hordei, ad tollendam scilicet siccitatem, ac stimulum, qui a forti cathartico induci solet. Neque sanè de huius quoque pharmaci utilitate ambigendum nobis fuisse, visum est per haec tempora, in quibus non massa duntaxat sanguinis, sed ipsa quoque hypochondria apud aegros multitudine bilioso-acrium par-

In abdominis tensione emollientia irritantibus miscenda.

*Vomitus aliqui-
bus proficiuus.*

particularum redundabant . Quinimò profecit etiàm vomitus apud illos , qui vel huic affueti fuerunt egestionì , vel ex crudioris adhuc cœnæ pondere laborabant .

a 7 epid.n. 83.

*Diluentia tempe-
perata etc. ab Hip-
etiam laudata.*

b In com.præd.
hist.

*Martiani præce-
ptū in apoplecticis
curandis.*

c Vers.64.

XIII. Quartò , non leuitèr iuuarunt in-
curationum progressu ea omnia , quæ aquo-
so fluido laxante , ac temperato redundant ,
cuius generis extiterunt potus aquæ , iura
simplicia , distillata magistralia , succi herbarum
epicerausticarum , emulsiones amygd. dulc. ,
gelat. C.C. , & similia , quæ nimirum tum sales
acres , & sulphureos temperare , diluere , at-
que irretire , tum vel maximè conuulsas ali-
cubi vasorum fibras laxare valent . Hæc
quidè m apprimè congruunt cum ijs , quæ
tanquàm salutaria experta proponit (a) Hip-
pocrates in curatione Androthali , qui cum
aphonia , rerum obliuione , ac delirio per inter-
ualla detineretur , leuabat post sanguinis missionem
aquæ potus , & aqua mulsa ; nimirum quia causa
morbi erat humor biliosus , & atrabilarius , qui
temperantibus mitescit , vt exponit (b) Valle-
sius . Quâ sanè in re laudarem , vt Clinici sæpè
manibus tererent notationes Prosperi Martia-
ni ad Hipp. textum 2. de (c) morbis , vbi per
hæc verba aduersus eos , qui in apoplexiæ
curatione calefacientibus vtuntur , exclamat .
-- Videant posteriores , quantum a Præceptoris do-
ctrina , & ex consequenti a veritate recedant ,
dum cuiuslibet apoplexiæ causam , aut saltè m

pro

pro maiori parte in pituitam frigidam, & humidam referentes, curationem perpetuò calefacientibus, & exiccantibus instituunt; quandoquidem, facta totius corporis purgatione, si morbus præbet inducias, ad vulgata sua decocta ex guaiaco, sassafras, alijsque similibus, tanquam ad columnas Herculis, confugiunt; cum animadvertere deberent ex tribus apoplexiæ speciebus unicam tantum, & de rarò contingentem, in frigidos succos, Hippocratis consilio, referendam esse.

Apoplexia in frigidis succos rarò referenda ex Hippocr.

XIV. Tandem non tenuem opem tulerunt ea, quæ benignè discutiant, mitesque spiritus refocillant, & expediunt, cuius ordinis sunt tincturæ ex confect. de Hyac., & Alchermes; guttulæ aliquot spiritus ceras. nigr., vel mannae, quem vitæ appellant; itidem tinctura auri absque menstruo corrosiuo parata; ut etiam sales volatiles cornu cerui, cranij humani, succini, & similibus, quæ sanè largo semper haustu fluidi aquei miscebantur. Profuere pariter theriaca, castor., & spirit. salis armoniac. naribus, ac temporibus admota;

Multi generis volatilia, et cordialia in usum vocanda.

ita tamen, ut perpetuò cauerimus a vo-

latilibus vinosis, alijsque sincerè,

Non tamen vinosa.

hoc est absque copiosi flui-

di admixtione, per

os exhibitis.

OBSERVATIONES

Physico-Medica

NON NVLLORVM,

Qui, cum primùm istiusmodi repentinis morbis tentati fuerint, feliciter euaserunt.



*ED iam observationes aliquot adi-
ciamus, & sum-
matim describamus
historias nonnullo-
rum, qui Medica
Artis ministerio a
grauissimis huiusmodi morbis vindica-
ti fuerunt, quorum curationibus unà
cum praestantissimis Urbis Physicis in-
terfuimus, & ex quibus ad consimiles
casus exempla, & documenta petan-
tur.*

OBSERVATIO I.

*Apoplexia cum aphonía , & paralyſi
dexteræ corporis medietatis , phle-
botomia , catharticis , ac
diaphoreticis ſoluta .*



Rimus , vel certè dignior ,
maximèque ſuſpiciendus , qui ,
inter Nobiles , elapſo anno ,
vim mortis euasit , fuit Il-
luſtriſſimus , ac Reuerendiſ-
ſimus Archiepiſcopus Botti-

nus , Vir octogenario maior , probitate , ac
doctrinâ inſignis , habitus ſanguineo-carnoſi ,
miræque morum ſuauitatis . Hic , poſt gra-
uia animi pathemata , quæ in ſublimioribus
ingenijs non rarò efferueſcunt , mediâ æſtate
anni 1705. ſubiit intenſiora quædam ſtudia ,
indèque paſſus fuit capitis excalefactionem ,
& ſuppreſſionem conſuetæ per os matutinæ
euacuationis viſcidulæ lymphæ .

II. Tandèm circa initium Auguſti , poſt
capitis grauitatem cum leui manuum tremo-
re , apoplexiâ correptus fuit , a qua euasit , ſuc-
cedente paralyſi totius dexteræ medietatis , ac
perſiſtente aphonîâ , quam fanè , cum inijecti
clyſteres , exhibiti ſales volatiles , admota-

Aphoni sublingualium a venarū incisione curata.

Oris collutiones in aphonis.

Muris mōtani adeps ad paralyfem.

que femoribus , brachijs , & nuchæ vesicantiā tollere nequirent , profectò mirabiliter , quod repentè acciderit , vna soluere potuit missio sanguinis ex sublingualibus venis . Et quoniā superuenit ab initio febris , plura exhibita fuerunt pharmaca partim aluum mouentia , partim diluentia , ac benignè dissoluentia , inter quæ postrema primas tenuerunt stibium diaphoreticum , ad viginti dies continuatum cum iure ex herbis alchalicis ; nec non guttulæ spiritus , quem vocant vitæ , ex manna sublimatum ; & quædam oris ablutiones actu calidæ ex decocto emollienti , & cephalico , additis nunc sale prunellæ , nunc spiritu salis armoniaci . Quibus remedijs , & multa per aluum biliosa recrementa , & copiosi sudores eruperunt . Sed , quod maximi interfuit , antiqua reuocata est tenacis lymphæ per os excretio ; sicque Æger , qui nunc sextum suprâ octogesimum implet annum , simplici falsæ infusione tractatus , consueque meliùs paulatim processit , vt spatio quinquaginta dierum e lecto surrexerit , illo etiam crure , quod syderatum ab initio fuerat , ad ambulandum soluto . Deinceps verò , cum affectum brachium fricari cœpisset manibus , inunctis adipe muris montani , quem Matthiolus italicè vocat *marmontana* , tantum profecit , vt modò epistolas suâ manu subscribere , & Missæ Sacrificium ritè possit celebrare .

Si-

III. Simile commodum per hæc tempora ex eodem montani muris adipe (quantum ex aliorum relatione nouimus) reportauit Diues etiam in Vrbe Senex , qui post præteritam apoplexiam , atque aphoniam , contumacissimâ paralyfi detinebatur . Hic enim adeps mirè valet ad soluendum quidquid extremis tubulis , ac villorum poris hæret impactum , simulque ad emolliendas musculares artuum fibras .

IV. In hac verò Præfulis medelâ , quam in vltimo senio fuisset constitutus , diligenter obseruauimus vtilitatem ex phlebotomia , & prodigio similis nobis occurrit linguæ ad loquendum solutio , eo ferè momento temporis contingens , quo sanguis ex venis raninis affatim fluebat ; indicio certè admodum euidenti , morbum ex interceptione vasorum sanguinis ad cerebri potissimum basin , & ad linguæ radicem , adglutinante muco , ortum habuisse , quâ solutâ interceptione , contiguorum , & continuorum neruorum libertas emicuit , quam ex earundem sectione venarum videtur spondere ^(a) Simon Paulli in quodam Consilio ad aphoniam .

*Raninis incisus cur
statim loquela re-
dierit .*


*a Adnex. ad cal-
cem tract. de feb-
maling.*

V. Huic verò curationi interfuerunt Viri Clarissimi DD. DD. Placentius , Manfredus , Bernardini , & ipse ego , iussu CLEMENTISSIMI PONTIFICIS , qui egregij huius Præfulis iacturam grauissimè ferebat .

OB-

OBSERVATIO II.

*Fortis Apoplexia cum relicta paralysi
feliciter curata in Matro-
na sex agenaria.*



Atrona quædam nomine Cherubina Leopardi , corpore subpingui , sexaginta annos nata , ob suorum probitatem morum , eximiasq; virtutes , annis profectò digna nestoreis . Hæc diù spasmodicis circa col- lum , & pectus doloribus , leuique vertigi- ne diuexata , meliùs interdum se habebat , cum sanguis flueret ex hæmorrhoidibus , qui- bus resitantibus , & præcurrentibus alui tor- minibus , ac fluxu , deindè verò sinistrorum artuum contractionibus , pridie Kalendas De- cembris 1705. in subitam incurrit apople- xiam , quæ externos , internosque sensus proprio usu , partesque omnes motu priua- uit; sed , adhibitis illicò cucurbitulis , vstione , suppositorijs , vesicantibus dexteris artubus , & ceruici , admotoque naribus spiritu salis armoniaci , balbutiens resipuit Matrona , quæ sequenti mane , hausto syrupo persico , lauda- biliter purgata est . At verò , cum adhuc gra-
ui

*Suppressis hæmor-
rhoidibus fortis a-
poplexia .*

ui sopore detineretur , etiam post paralyseos decubitus ad sinistras corporis partes , accersor ipse , & facti conscius , non dubitavi cum solertibus Physicis curantibus D.D. Pierleono , & de Rubeis , quin ex hæmorroidali resistente hæmorrhagia , atque ex acri , sulphureâque hypochondriorum saburrâ atrox malum magna ex parte penderet . Quoniam verò sales volatiles viper. , succin. , cornu cervi , craniij humani , aliaque cephalica calida , minimè conducere , propterea mariscas aperiri iussimus , quæ phlebothomia vtilitatem attulit , cum inde , amotis imi ventris repagulis , sanguis liberiùs per vasa moveri cœperit , vnde febris non sinè magno leuamine excitata fuit . Ægra enim , quæ priùs ferè muta , obtusa , inersque sensibus fuerat , loquacissima euasit : sed cum facilè in soporem recideret , idcirco syderatis etiàm artubus , noua admota sunt vesicantia , quæ affluenter , & commodè viscidulâ lymphâ per octiduum manarunt . Interea temporis , cum nondùm cerebrum integrè extranea sibi fluida remisisset , iuuat præbere pillulas de succino Cratonis , atque adijcere frequentes clysteres : cumque sitis vrgeret , largas potiones hausit ex iure cornuceruino , & aquis cephalicis . Demùm transactâ trigessimâ die , & repetitis pillulis de succino cum flor. cassiæ , tantùm solâ infusione eboris , & salsæ processit , vt mitiori superue-

Isdem arte reuocatis morbi diminutio .

Vesicantium utilitas .

Salsæ infusio .

ueniente veris tempestate , ac proindè , libe-
riore succedente transpiratione , ad consue-
tum ciuilis vitæ vsum , proprijs innixa pedi-
bus, redierit .

II. In hac profectò Matronâ vim humoris
penè furentis , quem Prisci vocant melan-
cholicum , atque atrabilarium, apertè obser-
uauimus ; acre enim , ac sulphureum fermen-
tum , ab hypochondrijs per venas ad præcor-
dia , & cerebrum exaltatum , loca omnia ,
per quæ gradiebatur , & in quæ decumbe-
bat , miris modis , doloribus videlicèt , ver-
tigine, conuulsionibus , apoplexiâ , sopore , &
febris affectu ; vt nullum fuerit dubium ,
quin Oraculum ^(a) Hippocratis nouam sem-
per veritatis lucem ab experimentis mutue-
tur , *morborum nempe omnium vnum , eundem-
que modum esse , ipsum verò locum illorum diffe-
rentiam facere* . Etenim , quanquàm colli , &
pectoris dolores, vertigines , alui fluxus, mo-
tus conuulsiui , apoplexia , & paralyxis , pro-
ptèr locorum diuersitatem , nihil inter se si-
mile habere videantur , vna tamèn sæpè , ea-
demque est , vt idem subdit Hippocrates , il-
lorum species , & causa .

a Lib. de flat.
n.4.


*Morbi ex locotan-
tium differunt in-
ta Hip.*

III. Illud insuper circa vesicantia ad me-
moriâ hîc reuocandum censemus , quod po-
stremo huius lib. cap. monuimus, scilicet magnâ
ex ijs vtilitatem euacuatione viscidulæ acer-
rimæque lymphæ in huiusmodi casibus præ-
sta-

stari posse ; quia nimirum validius est remedium , ad omninò præternaturalem humorem extrahendum , morbosa emissaria subito artificio aperire , quàm inani spe illius concredere euacuationem ordinarijs secerniculis, quæ, cum consueta sint nonnisi sensim congruere cum fluidis , mixturâ , ac motu naturali gaudentibus , nec subitò , nec tutò præternaturalibus excipiendis liquidis aptari possunt : parcendumque propterea est ijs Cl. Viris , qui , in factitanda medicina nunquam vesicantibus vtentes , illorum vim experiri , ac suspicere non possunt . Vndè in subitaneis morbis sæpè accidit , vt , dum Medici solius consopitæ naturalis œconomix munera formidolosè promouere student , ægri properent ad interitum .

*Vesicantia secerniculū excitant li-
quido præternatu-
rali expurgando
idoneum .*

*Solis secerniculis
naturalibus cur nō
semper morboſi li-
quidi repurgatio
concredenda .*



OBSERVATIO III.

*Subita capitis occupatio cum aphonìa ex
affectione cerebri partim idiopa-
thica , partim sympathica ,
prosperè cedens .*



Euerendissimus Pater Alde-
ranus Malaspina, Abbas S.
Pauli ex Benedictina fa-
milia, sexagenario maior,
corporis habitus mediocris,
ingenio constanti, serioque,

cum ex varijs per Italiam itineribus, curis-
que animi, malignam febrim Cæsenaë, ni fal-
lor, ante annum contraxisset; indèque valedi-
tudinarius de hypochondriorum plenitudine,
de stomachi cruditatibus, deque capitis do-
lore, Mutinam profectus, quereretur. Tan-
dèm summâ hyeme anni 1706. Romam ve-
nit, vbi, cum fortè paulò largiori vteretur
victus ratione (quæ, tametsi plerisque Fla-
miniaë, & Galliaë Cispalinæ incolis ita sit
innoxia, vt, proptèr subtilissimum illius cœ-
li temperamentum, potius sit necessaria, in
Urbe tamen, potissimùm apud illos, qui sessi-
lem vitam in studijs plerunque ducunt, sem-
per est periculosa) accedentibus etiam prin-
ci-

*Videtur plenus Ro-
ma quibus praser-
tim noxiis.*

cipio sui ministerij pluribus, tedi oque plenis laboribus, incidit in comatis speciem cum aphonia, ad quam curandam accitus eruditissimus Ioh. Trullus, vnà cum alijs Cœnobij Phycis, statim catharticum, variaq; cephalica, prudenter exhibuit. Cumq; postridie, ob mali momentum, ipse quoque in consilium adhibitus fuerim, non dubitavi, quin morbus partim esset sympathicus ex stomacho, & hypochondrijs, partim idiopathicus ex languidiori reddito membranarum, vasorumque capitis tono, hærenteque crassiori lymphâ ad cerebri præsertim basim. Vndè tria potissimum, pro abigendâ ægritudine, omnium consensu, decreta fuerunt remedia, scilicet primò citissima phœnygmarum admotio femoribus, brachijs, & ceruici, secundò epicratica purgatio cum pillul. ex rhab., pulu. stomach. Quercet., & granis scam. sulphur., succini, & casto; tertio omnimoda vini subductio; quibus sanè auxilijs, intra triginta dies conualuit. Sed, cum post vernum æquinoctium ad Monasterij curas properè, atq; adhuc impotens redisset, improvisò in aphoniam recidit, quæ, licet comati non iungeretur, adhuc tamen futuræ apoplexiæ metum assidentibus incussit. Sed propinato statim puluere Cornacchini, nouisque admotis femoribus, & occipiti vesicantibus feliciter, citiusque reualuit. Et quoniam languor stomachi pertinaciùs vrgebat, idcirco plùs viginti dies hausit magno cum

*Curatio Comatis
ex consensu stomachi,
et capitis.*

Ad stomachi languorem ius appropriatum.

fructu ius pipionis turratil. in cuius ventre parum lignorum sassafras, & Visci Quercini, cum rad: , & herbis deobstruentibus, stomachicis, & cephalicis inclusum fuerat.

*Phlebotomia cur
omissa fuerit.*

II. In hoc sanè Præfule cum subitus capitis morbus vitio tum primæ digestionis, cum collectæ in vniuerso corpore, sed in cerebro præfertim lentæ, ac viscidulæ lymphæ ortum habuerit, nulla mentio de mittendo sanguine facta fuit, ac solerter vtilitatem, ex aluum soluentibus, atque ex vesicantibus reportandam, loco phlebotomiæ, constituimus, vt de Ægro nobis pollicebatur. Et quoniàm religiosissimus

Vir, congruâ deinceps corporis exercitatione, diætâ, atque purgatione per epicrasim, vsus fuit; idcirco firmiùs sanatus est.



OBSERVATIO IV.

*Apoplexia cum affectione epileptica, &
 syncopali in paralysim dexteræ
 medietatis corporis, salua
 tunc Aegri vita,
 concedens.*



Illuſtriſſimus, & Reueren-
 diſſimus Bartholomæus Spa-
 da, Cam. Apoſt. Clericus,
 & Baſilicæ Vaticanæ Vica-
 rius, annorum 50., ſtatu-
 ræ proceræ, habitus ad gra-
 cilem tendentis, moribus ferijs, ac religio-
 ſis, linguâ ab infantia paululum tardus, ſter-
 no admodum depreſſo, conuulſiuoque aſth-
 mati per interualla obnoxius, cui fluida
 ſempèr profuerunt, cum ferè antè an-
 num ex duabus ſibi diù conſuetis euacuationi-
 bus, ſanguinis nimirum hæmorrhoidalis, nec-
 non acris narium muci, illam haberet, ſi
 non valdè diminutam, ſaltèm non largè fluen-
 tem, hanc verò penitùs ſuppreſſam (forſitan
 ob inſpirata recentis effluuia calcis, ex nouo,
 iuxtà quem incautè dormiuit, muro) pau-
 latim, præterito autumnò, fluxionem rheuma-
 ticam, erraticamque febrim incurrit; inde-
 que

*Suppreſſio nari-
 um muci ex recen-
 tiſ calcis effluuijs.*

que, collectis apud hypocondria, & præsertim læuum, tenuis obstructionibus, res eò deuenit, vt febris, ac dolores contumacissimè redierint. Sed Medici antiquæ memores utilitatis, ex fluidis reportatæ, illum varijs temperantibus curarunt; quinimò vsu etiàm chinæ chinæ tùm febris, cùm dolores penitus exularunt. At, cum Æger pietate, ac lege sui muneris impulsus, integram Sanctissimi Natalis noctem anni 1705. in Basilica Diui Petri, frigore, atque inediâ tortus, peruigilasset, postero die graui febre, cum acutissimo in coli flexura dolore corripitur, cui licèt oleum amygdalinum, externaque fomenta, & clysteres opportunè profuissent; attamen vix hebdomadâ morbus quieuit, quâ transactâ, atrox sub poplite dolor subitò inuasit, qui paritèr laxantibus cessit. Post hæc, secundo Februarij 1706., dum, flante boreâ, Valetudinarius publicè Sacris adesset, ob inopinatum animi deliquium, domum reducitur, & sequenti nocte immani tentatur dolore circum dexteræ mandibulæ articulationem cum faucium phlogosi, a quo malo exemptus fuit cucurbitulis scarificatis, fomentis anodynis, injectisque clysteribus.

*Vagi externarum
partium dolores
 tandem in apople-
xiam cedentes.*

II. Sed, cum Æger fortasse nunquàm se melius, quàm die 18. eiusdem mensis, habuisse videretur, proximè cœnaturus, apoplexiâ repentè corripitur, post irregularem totius cor-

po-

poris motum , cui dexteri brachij sydera-
tio , oris tortura , auctaque linguæ hæsitatio
illicò successerunt . Accurrunt Medici , &
prætumidam , ac subrubram illius faciem ,
consuetumque hæmorrhoidum fluxum perpen-
dentes , iubent mitti sanguinem ex talo ; cum-
que constaret fluidum acre , olîm per nares
excerni solitum , hâc illâc pererrasse , con-
sultò admouerunt vesicantia femoribus , &
cruribus , nihilque omiserunt , quod succo-
rum acredinem mulcere , tonumque cerebri
firmare potuisset . Nequè verò vllum de ex-
hibendo statim cathartico consilium fuit , cum
hypochondria subtenfa , atque irritata , beni-
gnam laxantis pharmaci facultatem subito
postularent . Hinc exhibitum oleum amyg-
dalinum cum syrupo violato , indeque iniectis
fortibus clysteribus , copiosè fluxit aluus .
Sed cum omnia feliciter progredi videbantur ,
postridiè prætumida , ac subrubra recurrit
facies , turbatur mens , conuelluntur labia ,
atque artus ; mox in syncopem recidit Ægro-
tusquem proptereâ sine pulsu , respiratione ,
ac voce , lugent vt mortuum . Recens hoc
mali augmentum docuit ex hypochondrijs ,
per albas , rubrasque venas , liquida fibras irri-
tare , & conuellere apta , in præcordia , atq;
in cerebrum , indeque per neruos in vniuer-
sum corpus erroneo motu transduci : vndè ,
excitato priùs Ægro a paroxysmo cum spiritu
sa-

*Hypochondriorû
tensio sublata.*

*Syncopis, et con-
uulsionum recur-
sus vndè.*

*Horum Curatio
extra paroxysmum*

salis armoniaci , & oleo Matthioli ; omnium consensu Curantium propinatum fuit pharmacum ex infusione fennæ , & tartari cum syrupo violato , præmisso bolo ex stybio diaphor. , cui accesserunt antepileptica , ex cinnabari natiua , & succino , atque , ob gracilem Præfulis habitum , copiosa , ac temperata diluta .

III. Cum verò in hac morbi recrudescentia oculi subtensi , ipsaque taciturnitas satis admonerent , cerebrum minùs per venas refudisse , quàm accepisse per arterias ; idcirco nouum occipiti vesicans admouendum iudicauimus , quibus remedijs Æger circa mentis operationes meliùs se habuit , vrinis redditis circa septimum copiosis , atque interdum etiàm stranguriosis .

*Morbi ad exteriora
conuersio .*

IV. Sed , quanquàm ferositates acres , ex vesicantibus largè fluentes , vnà cum rubicundis quibusdam herpetibus sub affecta scapula , & circa dexteram dorsi partem spontè obortis , multum de præcordiorum , & cerebri infarctu extra corpus deriuasse visæ fuerint ; nihilominus tamen recurrentes pulsus inæqualitates , vrinæ stranguriosæ , rubor faciei , circumtensius capitis dolor , oculorum immobilitas , splendor , ac strabismus , deniq; taciturnitas , ac subobscuræ motiones mentis non mediocrem incutiebant metum , ne acerrimi succi , qui in cerebro , & hypochondrijs pertinacitè adhuc in-

intercipiebantur , mortiferas syncopes , & epilepsias aliquandò renouarent . Qua de re ad istam causam magis diminuendam purgans benignum , duodecima die , repetitum fuit , & hirudines mariscis , præter solitum tumidioribus , ante 14. admotæ sunt ; non omis-
sis frictionibus , pediluijs , & laxantibus , sub-
tenso abdomini adhibitis .

*Syncopis , & epi-
lepsiæ periculum
detractum .*

V. At verò , licèt omnia sensibili fructu ad vsum venerint , nondum tamèn sæuitia morbi pelli omninò potuit ; etenim a die 13. vsque ad 20. non semèl syncopes , vaniloquia , & conuulsiui motus redierunt ; quorum sanè potior malorum causa , superatis tandèm præcordiorum anfractibus , cerebrique flexi-
bus , per nervos extra cranium fuit paulatim detrusa , atque in femore , & crure dextero intercepta , quibus in locis paralyfim , tan-
quàm opportunum decubitum , induxit .

*Ab his opportu-
nus transitus in
paralyfim .*

VI. Intereà temporis nulli non Curan-
tium perspicuum erat , mixtum hunc morbum ex apoplectica , epileptica , & syncopali affe-
ctione in Viro graui , & melancholico , a san-
guine , miscellâ salium lixiuialium , & impuri sul-
phuris imbuto , atque infecto potissimùm produci , ideòque locum habere illud ^(a) Tral-
liani , quo monitos vult Medicos , ne in cu-
ratione paralyseos decipiantur , fumentes (lo-
quitur enim iuxtà vulgarem sui temporis hy-
pothesim) calidam causam pro frigida . Id-

a Lib. I. cap. 16.

circò vnicè studuerunt diluere huiusmodi penè igneos sales , exhibitâ aquâ Nucer. , nunc simplici , nunc in speciem iuris , aut emulsionis , nec non tentatis Balneis aquæ dulcis . Sed profectus nonnisi incerti , ac diarij vsque ad 27. extiterunt . Quaproptèr ad depulsa cerebri vasa , quæ splendidis , rubentibusque ex oculis tumentia perspiciebantur , applicitæ fuerunt hirudines ad venas narium ; indèque vaniloquium , atque insomnium magna parte remisit . Cumque persistens capitis grauitas , dolor , ac taciturnitas arguerent hærentem in membranis , & intrâ cerebrum acerrimam lympham , quâ olim illius nares manabant , eâ ratione tunc noua dedimus antepileptica , partim ex crystall. mont. , corall. , & rad. valer. , partim ex pane , & croco metallor. , iuxtâ Quercet. normam , parata ; & præcipuè fetonem ceruici admouimus , cuius ex vlceribus crassa , copiosa , & acris fluere cœpit fanies , vt breuè , depleto cerebro , grauiora eiusdem symptomata mirabiliter cesserint .

Seto Ceruici vtiliter admotus .

Medici labor in solidorum morbis .

VII. His certè auxilijs , & omnimodâ vini abstinentiâ compesci , non planè profligari morbus passus est . Cum enim fluida iunguntur solidis ad maleficia , oporteret Medicum permutare posse totum hominem , vt prudenter scripsit Aretæus , quod nèc Dijs suis facile fore putauit . Itum igitur nunc arescentibus , nunc reuirescentibus symptoma-

matibus vsq; ad 50. diem, quo tempore præcordiorum, & cerebri mala, aperto etiã spontè in coccyge tuberculo maiori parte sedata sunt.

VIII. At enim verò, post factas cum morbo multorum mensium inducias, urgebant tamen Ægrum, primò inuincibilis paralytis dexteræ corporis medietatis; secundò summa gracilitas cum lenta feбри, & pulsu frequentèr inæquali, ad tabem festinans; tertio animi angor, in vna præsertim cogitatione reassumendi publica sua officia defixus; quartò alui stypticitas; quintò recurrentes interdum præcordiorum contractiones cum anhelitu; sextò voracitas, & impatentia ciborum, quibus, etiamsi affatim deuoratis, Ægrotus nihil proficiebat: Alimenta enim, etsi copiosa, quæ ab ore in ventriculum acris irritatione fermenti iucundè descendebant, a ventriculo tamèn, atque intestinis minùs defæcata, immò vitiatâ mixturâ, minori, quàm par est, mole per galaxiam, ad marasmm auertendum, ascendebant. Tandem ea etiam vlcerosa lassitudo, viriumque imbecillitas vexabat, quæ nullum corporis motum, nullam vel minimùm actuosam medicamentorum facultatem sustinere poterat.

Superstes in Ægroti symptomatum cumulus.

IX. Quare, cum mecum optimi Romæ Medici rursùm in consilium vocati fuerint, DD. DD. Placentius, Sinibaldus, Saxus, & Gattuccius, quorum vnanimi consensu, om-

nia etiam initio morbi decreta fuerunt , statui-
 muſ, medicam artem vehementes iſtius ma-
 li impetus obtundere potuiſſe , morbum ta-
 mèn prorsùs tollere nequiuiſſe ; atque id-
 circò Nobilem Virum ijs adſcripſimus , qui
 morbo ſuccubuerunt , quorum integram cu-
 rationem nemo ſciens , ac prudens citrà im-
 maturum Ægri periculum , artiſque dedecus
 tentare audeat ; Propitio interim Numini tri-
 buètes, ſubitaneum, ſemperq; atrociùs recurrens
 malum , quod Romæ tot , tantoſque repentè
 ſuſtulerat , noſtro adhuc Præſuli peperciſſe .

ÆTIOLOGIA.

a ex aph. 33. lib.
4.

b 2. de morb. po-
pul. ſect. I.
Morborum occa-
ſiones perpenden-
da ex Hipp.

Ingenitum orga-
norum vitium in
Ægrotante.

Nemo inuoluti huius morbi ætiolo-
 giam apprimè poterit intelligere,
 quin attentè perpenderit , apud
 (a) Hip. , morbos in ijs corporis
 partibus ſtatui , atquè firmari , quæ antea
 laborauerint ; ſimulque aduerterit eiufdem.
 (b) Hippocratis monitum , occaſiones nimi-
 rum , vndè quis ægrotare cœpit , conſide-
 randas eſſe . Etenim cum illuſtriſſimus Præ-
 ſul ab incunabulis linguâ parumper hæſitaue-
 rit , ſternoque depreſſus , conuulſiuo aſth-
 mati fuerit obnoxius , proculdubio cerebri
 ſimul , & præcordiorum inſito , atque inna-
 to ſtructuræ vitio ipſum laborare neceſſe fuit.
 Nil igitur mirum , ſi prædictis viſceribus,
 iſſe

ijſque appenſis vaſis nouiſſimè incubuerint morbi , quorum fanè cauſa petenda maximè videtur ab occaſione ſuppreſſionis narium, fluoris , qui , cum copiâ , atque acredine ſuâ
(a) cerebrum , & maſſam ſanguineam perpetuò defæcaret , ſtatim atque ob hauſtos recentis calcis vapores ſubſtitit , eaſdem partes cœpit inquinare . Et quoniam ab initio quodcumq; vige-
bat robur in vaſculari , ac muſculari textura præcordiorum , & cerebri , ſimulque morbida fluida nondum ad ſummam plenitudinem, ſummamq; acredinem euecta erant, decubitus ad artus , atque ad imi viſcera ventris ſolummodò contigerunt . Sed poſtquàm præcordia , ac neruorum principium paulatim languidiora reddita , fluida verò copioſiora , & vitiata magis fuerunt, repente epilepſia , atque apoplexia , deindè etiàm ſyncope ſubortæ ſunt , quarum certè affectionum geneſeos modos is digito quaſi tetigerit , qui magni textum Hippocratis lib. de (b) flatibus , tacitâ circulationis lege ibidèm vtentis , diligenter expenderit; dummodò quod ipſe aeri, tanquam iſtorum cauſæ morborum , adſcribit , acribus liquidis tribuendum didicerit . Sanguis enim , acerrimorum miſcellâ ſalium fœdatus, natiuam volatilitatem, ſuamq; dulcedinem amittit , & conſiſtentiâ , ac ſuperficie euadit inæqualis, vt demùm vaſa ipſa irritare , & corrugare ſit potens ; atque ita duabus de cau-

a Huc confer quæ ſcribit D. Val ſalua de foraminibus expellentibus morboſa fluida ex cranij cauitate per aures, nares, et os, in lib. de Aur. part. vſu cap. 5.

Vigentibus Cerebro et præcordijs morbi ad artus et abdomen detruſio.

Iſdem languentibus morboſæ materiæ retroceſſio.

b n. 21.

Sanguine vitiato quomodo circulationis inæqualitas ſuccedat .

Hippocratis testi-
monium.

causis sua nempe , ac vasorum , in præaffectis partibus sibi cursum perturbat. Vndè *alio quidè loco* (sunt verba Hippocratis) *sanguis consistit, alio lentius penetrat, alicubi autè citius* . Quà sanè factâ inæqualitate transitus sanguinis per cerebrum , & præcordia , omnigenæ inæqualitates , & ægritudines artuum , pulsuum , respirationis , atque animorum in hominibus contingunt .

Quomodo para-
lysis in his contin-
gat .

II. Verùm , vbi contumax est inæqualitas motus sanguinis in cerebro , ac medullâ oblongatâ , sæpè partes aliquæ fluidorum minoris motus intrâ , & iuxtâ horum , aut illorum neruorum texturam , aut motricium fibrarum vtriculos , atquè intermedia spatia , vel vrgentur , vel subsident , & impingunt , & tanquàm capita mortua ferè indissolubilitèr figuntur ; indè , iuxtâ neruorum discrimina , varias paralyseos species inducunt , quæ , in nostro casu , primùm brachij dexteri , deindè etiàm femoris , & cruris eiusdem lateris extiterunt .

Aegri huius in-
teritum quam
præcesserint .

III. Sed , dum hæc scribebamus , quasi gratulantes , metum dissimulare minimè potuimus , ne aliquandò syncopis , vel epilepsiæ simul , atque apoplexiæ insultu correptus Aeger , diem suum obiret ex tempore . Quod sanè prognosticum impletum vidimus die VI. Kal. Octob. 1706. Etenim Patiens post crescentem ulcerosam lassitudinem , ac sæpè recurren-
tem

tem syncopem, vehementissimâ vexatus sinistra medietatis epilepsiâ, non sine Amicorum lacrymis decessit. Vbi notandum, per octiduum ante mortem intenso crurum frigore, ab aliquali oedemate tumidorum, fuisse detentum; quo tempore lotium turbidum, crassiusculum, nec magnâ copiâ reddebatur; aderat inapetentia; & spirandi quædam difficultas identidem vexabat cum laryngis, & præcordiorum sensibili strangulatione. Quare,


ne ad plenam istius ægritudinis cognitionem quidquam desiderari possit,

ea, quæ in cadauere obserua-

tu dignora comperimus,

breuitè subne-

ctemus.



DISSECTIO CADAVERIS

Sub die 26. Septembris 1706.

*Coram Excellentissimis DD. Doctoribus
Sinibaldo, & Saxo, me quoque
præsente, ac omnia dili-
genter adnotante.*

*Morbosa dura ma-
tris contractio.*



*Glandularum ra-
cemi ad eiusdem
sinus.*

*Dexterum corti-
cis cerebri (hemi-
sphaerium sinistro
minus et flaccidius*

Nchoatâ itaque sectione a ca-
pite, quod malorum po-
tissimum theatrum habeba-
tur, vidimus duram ma-
trem albam, contractam,
atquè in anteriori parte cor-
rugatam, quâ deindè amotâ, occurrit pia-
solitò crassior, flauoque hìc illìc muco fœ-
data, cuius è vasis plùs iustò dilatatis, sub-
obscurus magnâ copiâ exundauerat sanguis,
qui, in grumos concretus, hærebat fulcis dex-
teri præsertim cerebri hemisphærij vsque ad
corpus callosum. Sinus interim duræ matris
omninò vacui, multisque sparsim racemis
glandularum miliarium referti conspicieban-
tur. Substantia tam corticis, quàm medullæ ce-
rebri fluidior, & dexterâ præsertim, atquè
anteriori parte minor, ac depressior erat.
Diametri ventriculorum anteriorum aliquan-
tò

tò naturali statu maiores occurrerunt . In dextero ventriculorum cruenta serositas continebatur . Nerui optici paulò graciliores . Cerebellum mollius paritèr , ac flaccidius , in cuius , atque in cerebri basi venulas aliquot varicosas offendimus .

II. Ad ventres mox inferiores descendentes animaduertimus vniuersum corpus insigni tabo consumptum cum pedibus œdemate affectis , & , referatâ per cultrum intrâ abdomen viâ , gracilem , ac nigram quandam membranam omenti vicem gerere ; stomachum , atque intestina optimi coloris , & substantiæ . Hepar neque mole , neque consistentiâ , aut colore a naturæ lege admodum deuium ; bilis tamèn cystica fluidissima , & subuiridis occurrit . Pancreatis glandula mole maior , ac durior . Lien parte , quâ maximè lymphatica excurrunt , duobus cinereis steatomatibus erat induratum , cæterâ sanus . Renes omnium iudicio incolumes , excepto cortice , qui subobscuricoloris euaserat .

III. Denique , secto , atque eleuato sterno , vtraque thoracis cauitas cruento latice redundabat . Pulmones quædam subnigræ maculæ variegabant , quas , cum attentius obseruaremus , figurâ serpentinâ præditas aspicimus ; ac proindè non dubitauimus , quin illæ extrema essent vasa sanguinea , quæ in exiguas varices abierant . Pericardium breuius

Pulmonum varices

vndequàque superficiei cordis adhæserat, omni penitus lymphâ exinanitum; in cuius sanè internâ facie, a corde per vim auulsâ, inæqualia, atque alicui nostrum duriuscula etiàm corpora, obstructarum glandularum speciem referentia, visa sunt. Cor, quanquam exterius nihil spectabile patefaceret præter aridiusculas, & sulcis quibusdam per longum exaratas fibras; interius tamèn, (etiàm si sanguine, ac polypis omninò vacuum) raram certè, ac memoriâ hominum æternùm duraturam rem nobis exhibuit; scilicèt ad ostium arteriæ magnæ in singulis valuulis semilunaribus aderant inæqualia quædam, ac exigua sarcomata, quæ in fimbrias, ac lacinias, instâr condylomatum protensa, intrâ aortam inclinabant; neque interim a valuulis, citra scissuram se auelli patiebantur; vt nullum propterea fuerit dubium, quin ex productis valuularum, fibris, vasisque nata, non verò per simplicem adhæSIONem compacta, corpora illa penderent. Deniquè intrâ aortam descendentem substantia inæqualis, ac rotunda, naturæ verò polypeæ, cauitatem ferè totam opplens inuenta fuit.

Cordis sarcomata in semilunaribus valuulis.

IV. Hæc sanè omnia clarè nos docuerunt, sedes, & causas atrocium tum præcordiorum, cum cerebri malorum, quæ Nobilem Ægrum lento tabo ad tumulum perduxerunt, omni humanâ ope fuisse maiores.

SCHO-

SCHOLIVM.

Porrò, si quis diligentè ire cuperet per singulas præternaturales res, quæ in hoc extispicio obseruatæ fuerunt, prouinciam sanè longè grauissimam, & simplici commentario maiorem fusciperet. Attamèn, vt specimen aliquod nostrarum tradamus annotationum, censemus, non omnia, vt plerunq; contingit, quæ hîc rara, & præter naturæ ordinem detecta sunt, ab initio morbi extitisse; sed alia præcessisse, alia sensim, alia tandèm excitata, præuisæ huius mortis causam habenda esse.

Non omne morbosum in cadauere repertum morbo synchronon fuit.

II. Vitia, quæ præcesserunt epilepticam, apoplecticam, & paralyticâ affectionem, nonnulla existimamus latuisse in fluidis, nonnulla in solidis. Fluidorum præexistens labes in lymphâ certè constituenda præ cæteris videbatur, quæ scilicèt falsa, & acris, ex lixiuiali plùs iustò bilis mixturâ orta, per nares olîm vtilitèr exercebatur, quæque sanguini admixta, ferè menstruum hæmorrhoidum fluxum promovebat.

Vitia morbo præeuntia.

III. Nonnulla paritèr solidorum vitia cognata, indèque adulta fuisse arbitramur. Hæc autem extiterunt sterni depressio, pericardium minùs, quàm par est, amplum, extremorum vasorum in corde, pulmone, ac

Cognata.

cerebro talis laxitas , per quam in varices
facilè dilatari potuerunt .

Succedentia.

IV. Vitia verò , quæ decursu morbi ac-
cesserunt , putamus fuisse in fluidis crasim ,
seù mixturam longè magis acrem , pungen-
tem, ac ferè veneficam, ex ipsa suppressione mu-
ci narium, simulq; ex influxu particularum recen-
tis calcis inductam , quæ fieri non potuit , quin
cum liquido etiàm neruorum, alijsq; fluidis se-
cundarijs paulatim communicaretur . Etenim
posthac febres , dolores , & vigiliæ, tandèm
epilepsia , paralyfis , ac syncopes ingruerunt.
Hæc autèm fluidorum labes in præaffectis po-
tissimùm structurâ locis , cerebro nimirum ,
& præcordijs , morbosos tandèm decubitus in-
duxit : interceptâ enim, ob recurrentes iden-
tidem conuulsiones , circulatione sanguinis ,
necessariò ichores erosiui, vtpotè perniciores,
subterfugendi tempus , ac modum ipsâ ex
morâ huc illuc inuenerunt ; itaut minima
vasa, villorumque extremitates elimare potue-
rint . Vndè postmodum cætera intercurrentia
liquida , pro varietate suorum motuum , &
mixturarum, alteri partialiquid affinxerunt, de
altera verò aliquid semper detraxerunt ; af-
finxerunt quidèm lienì , valuulis semilunari-
bus , pericardio , renum cortici , pedum in-
tercapedinibus , alijsque membris , in qui-
bus , vel propter pororum angustias , vel
proptèr exilitatem impetus , semel interclu-
sa

*Ichorum vis pen-
etratiua .*

sa viscidula fluida pertinacitèr adhæserunt : Detraxerunt verò de dextero cerebri cortice, de omento, de vniuerso corporis habitu, deque alijs locis, a quibus intercurrentes corrosiui ichores, non modò nouam non addidere, immò compactam iam pinguedinem eliquare, atque abradere, corpusque tabidum reddere potuerunt.

V. Tandem eò ventum fuit, vt sanguinea tùm piæ matris, tùm pulmonum vasa, ad extremum exilitatis attenuata, propter diurnam introfluentis liquidi acredinem, distrahentemque vim, ob circuli interceptionem, ex conuulsionibus ortam, postremâ excitatâ epilepsiâ dissilirent, sanguinemque supra, & intrâ cerebrum, necnon cruentum serum intrâ thoracem effuderint. Vnde subita mors; ad quam tamen inferendam suspicor vnâ simul conspirasse interruptam sanguinis continuationem per ipsa vasa cordis; inuenta quippe ventriculorum exinanitio certè arguit a violentissimis præcordiorum strangulationibus præcisum fuisse vitæ tramitem, qui cum sanguine per cor in pulmones, & a pulmonibus per cor in arterias, ac venas circumducitur.

VI. Quod verò spectat ad duplex cordis vitium, adhæSIONem nempè pericardij, & sarcomata valuularum, non admodum in prioris examine immorabor; vt enim illud frequentius est malum apud tabidos, ac præ-

*Vnde subita mors
in hoc Aegrotante.*

*Pericardij cum
corde adhæSio cur
tabidis, et asthma-
ticis familiaris.*

fer-

fertim asthma vexatos ; ita longâ disquisitione non indiget ; nam satis est notare , obstructis ostiolis , vndè intrâ pericardium liquor depluit , ac deficiente prorsus omni humiditate , quæ ambas cordis , eiusq; capsulæ superficies ab adhæsione disiungit , illas inter se necessario cohærere , atque coniungi ; præcipuè si pericardium breuiori orbe (naturâ , vel sæpiusculis contractionibus factum) contineatur , ex quo fiat , vt sit cordi propinquius .

Valvularum cordis sarcomata a nemine indicata.

VII. Igitur , ad posterioris animaduersionem transeuntes , ingenuè fatemur , hoc sarcomatum vitium in tot obseruatis cadaueribus nunquam aliàs nobis fuisse compertum , nec adhuc ex aliorum lectione cognitum ; vtcumque viderimus huiusmodi valvulas cartilagineas , osseas , exesas , phlogosi affectas , aut cum sanguiferis varicosis .

a Exerc. 52. de gen. animalium.

VIII. Nota pluribus est illa per ^(a) Harueum memorata obseruatio de carne fungosâ , externo cordis cono accretâ . Nec ignoramus aliam Ioh. Iacob. ^(b) Martini de exiccato corde , quod centum tuberculis totâ externâ superficie oblitum erat . Similiter notatu dignam censemus eam , quam refert Ioh. Conrad. ^(c) Peyer. de corde , cuius inæqualem superficiem carnei veluti lemnisci externè cingebant . Sed qualis huiusmodi interna , nulla , quòd sciam , refertur ; ex quo
fa-

b Apud Miscell. n. c. decad. 2. obs. 204.

c Meth. histor. Anat. Med. in schol. cap. 6.

sanè euenit , vt apertè doceamur , quidquid in phycis possibile est , aliquandò contingere . Atque in hoc ^(a) Plinius erroris non temerè redarguitur , cum scriptum reliquerit *solum cor vitij non macerari , nec supplicia vite trahere , lasumque mortem illicò afferre .*

a Lib. II. cap. 42.

IX. Excitata verò iuxta cor putamus sarcomata ista ex eadè causâ , eodemque modo , quo ea fiunt , quæ exterius , ac præcipuè in podice apparent ; scilicèt ab inductis omnium primò leuibus vlcusculis , aut rhagadibus , paulatim discissa valuularum vasa ob viscidulorum liquidorum interceptionem elongari , ac luxuriare cœpisse , varièque inuicèm complicata in morbofa tubera adoleuisse . Nequè forsitàn ambigendum de tempore , quo vlcuscula , ac rhagades excitari eo loco potuerint , cum principio morbi cor , diu humiliter , atque inæqualiter , pulsans , facultatem facilè dederit sanguini , erodentibus particulis referto , vt morâ suâ labia valuularum exederet . Quid ? quòd ipsæ quoquè viscerum , artuumque conuulsiones , decursu morbi sæpè recurrentes , liberum sanguinis fluxum a sinistro cordis ventriculo per aortam (præcipue descendentem , polypo ferè obstructam) in singulas partes adeò interturbare potuerunt , vt , validius percussis cruoris undis contra prædictas valuulas , fortè suapte naturâ graciliores , istæ tandèm alicubi findi cœactæ fuerint .

Horum sarcomatum geneseos modus .

Quod

Durantibus valvularum sarcomatibus cur pulsus plerunque æquales perstiterint.

X. Quòd verò pulsus , vel cum enormi vitio prædictarum valvularum , vt plurimùm in Ægro æquales obseruati fuerint, hoc factum puto , quia istiusmodi sarcomata , vtpote mollia , tunc faciliè locum sanguini cedebant, cum pleno impetu a corde propellebatur : vnde minùs resistentes mediam viam omninò liberam aperiebant in aorta . Secùs atque accidit , vbi cartilagineæ , & multò magis vbi ossæ occurrunt valuulæ , quæ , cum ordinarijs impetibus sanguinis validè plerunque renitantur (non enim semper , scilicèt cum maior viget in sanguine vis , vt in acuta febris , non renituntur) illius per arteriam cursum cum pulsus inæqualitate retardant.

Quomodo sarcomata producendæ syncopi conspirauerint.

XI. Illud utique huiusmodi spongiosocarnei valvularum lemnisci, mole aucti, patrare in Ægroto forsitàn potuerunt, vt postremis vitæ diebus , dum propter expositam strangulationem præcordia contrahebantur , mutuò admoti , atquè implicati , quasi aggerem excitarent contra cominùs locata orificia artiarum coronalium, sanguinemque ad cordis fibras per id temporis deriuari prohibuerint . Vnde lipothymias , ac syncopes , si non primum , ac principaliter inducere , saltèm eouque producere valuerunt , donèc , cessante spasmò recenter excussa sarcomata, ad factum spatium, proprio potissimùm pondere a prædictis orificijs recederent , liberumque sangu-

guini iter per cordis substantiam rursus permitterent , atque ad syncopis cessationem contrariâ prorsus ratione conferrent .

XII. Nequè hîc tacebimus , polypeam substantiam , quæ intrâ descendentis aortæ cavitatem ex sæpiusculis illius tubi contractionibus , & morâ sanguinis concreuerat , pedum frigiditatem , atque œdemata , diminuto sanguinis ad extremas partes influxu , peperisse .

XIII. Dicendum aliquid superesset de dextero cerebri cortice , qui flaccidior , depressior , ac , sanguine etiâ exundante , & concreto , grauatus occurrit ; nimirum epilepticæ ne , an paralyticæ medietati corporis responderet ? Et quanquàm res , sub caluaria latens , summam obscuritatem , ac difficultatem inuoluat ; tamen , cum , præter Hippocratis , Ballonij , Martiani , Malpighij , Valsaluæ , aliorumque eximiorum Virorum auctoritatem , nostra quoque succurrant experimenta , meam sententiam interponam ; probabile scilicèt fuisse , dexterum cerebri hemisphærium sinistræ corporis medietati , & sinistrum dexteræ respondisse : itaut ea corticis pars , quæ gracilior , quæque , effuso pressa sanguine , inuenta fuit , commercium habuerit cum sinistris artubus , motu , sensuque præditis ; altera verò , quæ penè nullam , oculorum iudicio , labem in se continere vi-

Dexterum cerebri hemisphærium sinistræ , et sinistrum dexteræ corporis medietati respondit .

debatur , cum paralyfi iam tentatis.


*Huius experimen-
to ægri confirma-
tur.*

XIV. Ad huius verò asserti probabilitatem duo præcipuè argumenta nos adducunt. Prius est , quod passim experimento docemur, percussos , nempe , vulneratos , vel abscessu aliquo tentatos in dextero , aut sinistro cerebri cortice , plerunque conuulsionem , aut paralyfim in oppositis artubus perpeti . Posterius verò ex hâc eâdemmet hypohtesi deduci posse videtur . Etenim , cum *Æger* diù lassitudine quâdam vlcerosâ , ac postremò epilepticis quoque artuum medietatis sinistrae succussionibus affectus fuerit , verosimile est , illam cerebri partem , quæ principium , ac fons erat istorum neruorum , tempore mortis , magis in eodem laceffitam fuisse , quàm alteram , a qua nerui penè mortui propagabantur in dexteram , paralyfi detentam . Atquè dexterum cerebri hemisphærium pessimè affectum , ac laceffitum , sinistrum verò nudis oculis ferè incolume inuentum est . Idcirco dexterum cerebri hemisphærium dolentibus , & conuulsis , sinistrum verò paralyfi tentatis artubus conuenisse , ac respondisse , dicendum est .

XV. Nec mouet , quòd dexterum cerebri hemisphærium , tabo consumptum , cum dexterâ medietate , paralyfi affectâ , congruere magis videretur , quàm cum sinistrâ , alioquin sensu , motuque præditâ . Etenim , præterquamquod in præsentī casu (utcumque
ab.

ab initio discrimen aliquod gracilitatis dexteris inter , ac sinistros artus interfuerit) membra omnia pari tabo paulatim aruerant; illud maximè aduertendum in glandulis , ad quarum ordinem cerebrum refertur , eas graciliores euadere , atque inueniri solere , per quas fluida vberius secernuntur ; eas e contrario pleniores , saturatioresque seruari , quæ diù a secretionis officio vacauerint . Exemplo sint (præter thymum , & hepar in fœtu) mammæ , & renes , quarum sanè adenarum , si altera ab usu defecerit , maior , & crassior non minor , & graciliorprehenditur . Cum igitur dexterum cerebri hemisphærium sinistro magis depressum , seu gracilius offenderimus , perspicuum nobis præbuit indicium ad probandum , illius glandulas semel admissam secretionem liquidi neruorum alioquinacris, vsque ad extremum vitæ diem, quâ sinistrum longo iàm tempore caruerat , constanter retinuisse .

Glandulæ vberius liquidum secernentes cur euadât graciliores, etc. conuerso.



OBSERVATIONES

Physico - Anatomica

NON NVLLORVM,

Qui primo impetu morbi repentè
per hæc tempora perierunt.



OST capita preli-
minaria de impro-
uisis mortibus, eius-
que causis, quæ isto-
rum potissimum de-
cursu annorum no-
biscum adeò sæuitè
egerunt, & post descriptos casus aliquo-
rum, qui subitaneis cerebri, ac præcordio-
rum morbis tentati, per hæc tempora eua-
serunt; opportunum certè erit, ut de-
scendamus ad obseruationes illorum,
qui primo impetu morbi vitam repentè
cum morte commutarunt.

In ijs autèm commemorandis, illud
in primis studebimus, ut historia me-
di-

dica singulorum , qui decesserunt , ea lege præfigantur extispicijs , ut non solum naturalis , sed præternaturalis quoque illorum hominum status legentibus præluceat . Mala enim , quæ mortem præceperunt , manum quasi porrigunt ad illam inueniendam in cadaueribus causam , quæ , disrupto vitæ filo , animam diuulsit e corpore. Quo fit, ut meritò

Quo morbo repente decedens laborauerit maxime sciendum .

(a) Fortunat. Fidel. scripserit illud etiam præstat nouisse , cum quisquam repente moritur , quam scilicet ægritudine ille correptus fuerit .

a Derelat. Med. lib. 4. cap. 7.


Deindè verò dabit spero veniam ingenuus Lector , si , quanquàm ex defunctorum Medicis , Amicis , ac Necessarijs integras tum naturalis , cum præternaturalis eorundem status historias haurire studuerimus , adhuc tamèn alicubi mancas inuenerit , præsertim circà pulsuum anomalias ; ad eos enim , qui improuisò de medio tolluntur , neque Medici accersiri , neque si accersiti fuerint , tempestiuè solent accurrere .

Supereſt , ut aliquid circa ſcholorum methodum admoneamus . In ijs itaque , quemadmodum curabimus , ut particularis cuiusque ſubitanea mortis cauſa extricetur , atque reluceat ; ita non omnium ſymptomatum , quæ ſingulos morientes vexarunt , rationes reddemus in ſingulis ; ne ſcilicet , cum eadem ipſiſſima phænomena in pluribus agris obſervata fuerint , recoctam cum naſea crambem Lectoribus exhibeamus . Symptomatum idcirco Aetiologias hæc illæc noſtris aſpergemus in ſcholijs , ut , quæ de induſtria deficiunt in ſingulis , deſiderari vix poſſint in omnibus .

OBSERVATIO I.

*Repentina mors ex apoplexia syncopali
in Viro obeso, & cachochymo.*

HISTORIA.



Antonius Maria Brilli Romanus, quinquagenario maior, famulorum Eminentiss. Cardinalis Sacripantis decanus, obesi admodum habitus, vini, & coniugalis veneris in-

temperans; cum antè annum vagis circa pectus, ac diaphragma doloribus tentaretur, graui anhelitu, & omnigenâ pulsus inæqualitate vrgeri cœpit. Deindè verò vrinarum sensim inopiâ, ac pedum tumore laborans, futuræ speciem hydropis exhibuit; varijs propterea pharmacis, & præsertim oxymellite scillit., ac itomachicis refermentantibus curatus, rursus lotij copiam obtinuit, apertoque in crure fonticulo, meliùs se habuit.

II. Sed quanquàm ad Aulæ officia, post multos menses rediisset, prauo tamen colore foedatus per accliuia anhelabat, atque iisdem pulsuum anomalijis perpetuò detinebatur. Tandem die 15. Ianuarij 1706., nocte mediâ, ex-
pergefactus, purpurinam quandam totius cor-

po-

*Funestissima effe-
rarum ad interio-
ra repulso.*

poris efflorescentiam, instar morbi, qui à Me-
dicis appellatur, *effere*, ingenti cum pruritu,
& calore, summoperè molestant perſenſit, a-
qua, vt alleuiaretur, e lecto surgens, fene-
ſtram, ſeſe frigidiffimo expoſiturus aeri, im-
prudenter aperuit; exindè decubitus, qui vti-
liter exteriùs factus erat, peſſimo fato inte-
riùs repulſus, e veſtigio brachij ſiniſtri torpo-
rem induxit. Neque interim æger, ijs auſcul-
tans morbi vocibus, vllam ſibi medelam adhi-
beri curauit; ſed poſtridiè Aulam adiuit, &
Eminentiffimi Purpurati currum pedibus cum
cætero famulatu ſequutus fuit, vt tandèm vi-
ribus fractus, horâ 23. cum dimidiâ diei 17.
Ianuarij, repentè mortuus fuerit in via, quæ
Parionis dicitur.

CADAVERIS DISSECTIO.

TRanſactis viginti quatuor horis,
cadauer in Theatro Romani Ar-
chilycei, coràm Excellentiffimis
Viris, ac Doctõribus Lucâ To-
maſſino Prothomedico Generali, tribus Con-
ſiliarijs, ſcilicèt Iacobo Sinibaldo, Anto-
nio Placentio, & Ioh: Trullo, duobus Me-
dicis Sacri Palatij Apoſtolici Michaelẽ Ange-
lo Pauli, & Gaſparo Reali, & publico Ana-
tomes Profeſſore Alexandro Paſcolo, vnàcum
Phyſico, & Chirurgo Carcerum Ioh: Latino,
& Bar-

& Bartholomæo Simoncello, qui publicus alioquin est Anatomes Minister, a quo, adstantibus etiâ Curia Iudicibus, & Scribis, multoque concurrente Studioforum numero, dissectum fuit.

II. Et quoniâ externa quoque Cadauerum facies nos aliquandò erudire solet; idcirco in primis aduertimus, vniuersum corpus mirè obesum, & pallidum, vultum autem obscure adhuc ingenti cum tumiditate rubentem occurrisse; ex quo factum est, vt, antequàm, detractâ caluariâ, ipsius cerebri status nobis innotesceret, rumoris nescio quid afflauerit in Theatro, aliquibus sanguinem, e vasis largè effusum, sub cranio inuentum, iri augurantibus. Sed o vana, & incerta iudicia hominum, quorum lingua oculos, mentemque præcurrit!

Ex cadauerum facie quandoque Medicus eruditur.

Effusus sub Cranio sanguis pro mortis causa perperam hic accusatur.

III. At verò, vt rem consueto perficere-mus ordine, abdomen principio secuimus, quod multo adipe refertum erat. Zirbus, obstructis suis glandulis, crassiusculus. Intestina tenuia, venis sanguine tumentibus aliquantulum rubentia. Ventriculus prægrandis, & laxus. Lien naturali mole maior. Hepar paulò auctius, sed colore propè naturali, cuius interim Cystis, cùm forinsecus albicans obseruaretur, exactiori locum fecit examini; postquàm verò illam aperuimus, non bilem, sed verum pus continere, atque internâ sui

Pus, & vlcera in Cysti fellea depressa.

superficie varijs vlcusculis laceram, raro quidè exemplo, deprehendimus.

IV. Ab ipso deindè abdomine in thoracem per amotum sternum referatâ viâ, statim multa circà pericardium flavescentis adipis copia, (qua cordis quoque basis grauabatur) se obtulit. Pulmo solitò depressior. Cor verò prægrande inuentum est. Dextera auricula cum appensa vena caua, quæ modicam nigri sanguinis quantitatem continebat, duplò certè naturali diametro amplior apparuit.

*Summa cordis
amplitudo.*

V. In sinistro ventriculo maxima piceicruoris moles claudebatur. Arteriæ pulmonica, & aorta, finitimæque cordi tracheales partes multo adipe refertæ, glandulisque quibusdam obsessæ, mutuum nifum, & compressionem ostendebant.

VI. Tandèm, cùm ad Cranij sectionem Chirurgus accederet, scissis, diductisque tegumentis, super dexterum latus ossisincipitis offendit in Cranio foramen, per quod, (cùm pericranium duntaxat aditum intercluderet) maius specillum ad vsque duram Meningem, alioquin laxam, facile intulit; atque, eleuatâ caluariâ, cuniculum illum intrâ ossis lamellas à generationis fortè primordijs fuisse referatum, indè iudicauimus, quòd orbiculus non asper, sed læuigatus inuentus fuit. Cæterùm in superficie cerebri subobscura va-

*Dura Meningis
laxitas.*

*Cranij foramen
forsan innatum.*

fo-

forum sanguineorum turgescencia , & modica quantitas turbidi feri in ventriculis spectabatur . Sinus longitudinalis , & laterales , atque ij etiàm , qui ad cerebri basim positi sunt , nigro sanguine tuebant , vt non fuerit dubitandum , quò solitò maior cruoris quantitas intrà cranium intercepta fuisset .

S C H O L I U M .

IN huius vestibulo scholij opportunè occurrit consilium , verè sapiens , ac rectum , quo Gulielmus ^(a) Ballonius Medicos admonet , vt caueant prædicere , se deprehensuros aliquid in capitibus illorum , qui ex cerebri morbis interierunt . Etenim , cum vna , eademque affectio à varijs , atque inter se non diuersis modò , sed sæpè contrarijs , diuersèque operantibus causis oriri possit , rarò fit , vt Medicus illam , quam incautè præcinerat causam , in dissectione cadaueris inueniat . Quod sanè extispicij huius testimonio omnium cum admiratione comprobatum fuit ; nullum enim effusum in cerebro sanguinem offendimus , quem aliqui adeò confidenter prædixerant . Igitur , vt nos cauti fuimus in prænunciando , similiter in huiusce subitanæ mortis causis euoluendis ab erroris periculo longiùs abeamus , e re arbitramur annua istius Ægri mala diligenter inuestiga-

^a In comment. 3
& annot. ad histor. I. l. 2. consil.

*Medico cur multa
opus sit cautela
in prædicendis in-
terioribus cadaue-
rum lesionibus.*

*Mala , quæ mor-
tem præcedunt , di-
ligenter inuestigā-
da .*

*In extispicijs , et si
minima offendan-
tur , magni æsti-
manda .*

re : quo nanque remotiores ab obseruan-
tium oculis repentinarum mortium causæ in
dissectis cadaueribus esse videntur ; ità curio-
siorem diligentiam postulant , vt eruantur , &
patefiant . Porro nonnulla inuenta , etsi non
rarò in extispicijs nihili fiant , ex quo apud
minùs versatos in rebus anatomicis minima
putantur ; ea tamen magni æstimanda sunt ,
quoties cum languidulis viscerum fibris lucta-
ri , minimisque vasorum angustijs intercipi po-
tuerunt .

*Series Morborum
subitam necē præ-
cedentium .*

II. Primò itàque extrà omnem dubita-
tionis aleam positum per historiam censeo ,
hominem hunc ab anno ex cachexia valetu-
dinariam vitam duxisse , cum labefactato fi-
brarum tono , & cum degeneribus a naturali
crasi fluidis , quæ ad viscido-acrem naturam
euecta erant .

III. Secundò ex cadaueris dissectione con-
stitit , Ægrum loco cysticæ bilis , quæ balsa-
mico-amaricans esse debet , acro-putridum
pus multò priùs , quàm diem suum obiret ,
fouisse ; non enim vlcera momento temporis
ab erodente liquido visceribus insculpuntur .
Hoc autem pus facere non poterat , quòd ,
euerso naturæ ordine , chylum non modò non
defæcaret , sed exoticis particulis imbueret ,
nouamque labem sanguini iugiter communi-
caret .

IV. Tertiò his addamus ex historia ,
Ægrum

Ægrum eò tandèm peruenisse, vt acria corpuscula, iisque commixtam sulphuream lympham (erat enim vinosus) plenè cumulauerit, quæ profectò corpuscula ab vniuerso suorum vasorum, ac viscerum fibroso genere, inductâ irritatione, ad externa corporis sub forma efflarum propulsa fuerunt; cui sanè propulsioni, nisi Ægrotus intempestæ noctis frigore imprudens fuisset obnixus, proculdubiò indè leuamen accepisset. Sed, cùm istius critici decubitus materies intrà vasa repulsa, atque in cerebro, & spinalis medullæ principio intercepta fuerit, sinistri torporem brachij produxit, qui, ex tempore solutus, indicium præbuit, ignem non extinctum, sed dolofo in cinere latuisse sepultum; causam nempè moribificam e corpore nequaquàm eductam, sed partim sanguini confusam, partim viscerum folliculis interceptam delituisse.

*Ex repulsis effleris
brachij torpor.*

V. His verò positis, facile est conijcere, causam subitanæ huius mortis fuisse copiam crassescientis sanguinis, & serositatis, quæ quidem fluida oleoso-volatilibus partibus destituta, & fixis salibus redundantia, propriæ fluxilitatis inopiâ per meningum arteriolas, per sinus, ac per reliqua cerebri vasa hæere cœperunt: vbi, debilitatis, ob spirituum paucitatem in violento etiâ corporis motu erogatorum, fibris muscularibus duræ matris, ac villis omnibus corticem cerebri, ac cerebelli

belli intertextentibus; &, inductâ ob sanguinis remoram tam pressione suprà fibras, & glandulas eiusdem corticis, quàm obstructione intrâ oscilla secretoria liquidi neruorum, repentina suborta est syderatio liquidorum, & solidorum in cerebro, quam fortissimam dicimus apoplexiam cum mortifera syncope, quæ nostro in casu corripuit, non solum propter deficientem descensum spirituum a cerebro, & cerebello in cor; sed propter concurrentem renitentiam ad motum crassi, & resinosi sanguinis, per cauitates cordis tunc temporis deuoluti.

Vndenam syncopes mortifera in hoc Ægrotante.

VI. Hoc autem indè arguitur, quòd isto in homine lymphâ viscidulo-acris, quæ per duos dies ante obitum *efferas* produxit, cùm a succutaneo organo intempestiuè repulsa fuerit, nullam excitauerit febrem, quâ aut cum cæteris massæ principijs exactè, atque impunè rursus commisceri, aut per alia secernicula vtiliter trudi potuisset. Factum proindè esse videtur, vt fluida, dissipatis postridiè per laboriosum pedestre iter volatilibus particulis, quibus vtcunque, in cerebro præsertim, fluxilia reddebantur, ex tempore substituerint, inductâque paralyti in meningibus, ac totâ cerebri superficie, inuincibilem, quam fortissimam dicunt apoplexiam, ^(a) Senibus aliòqui familiarem, pepererint.

Paralyfis membranarum, & corticis cerebri, ac cerebelli.
a 6. aph. 57.

VII. Firmant deindè nostras a priori con-

nie-

niecturas ea, quæ in cadauere palàm occurrunt. Quid enim aliud tumida, & ſubrufa vultus, & meningum ſpecies? Quid ſanguineorum vaſorum in vniuerſâ cerebri ſuperficie turgelcentia? Quid ſinus omnes, nigro ſanguine oppleti, demonſtrauerunt, niſi maximam fuiſſe aucteri, minùſq; mobilis humoris quantitatem, quæ intrâ cranium intercepta, tùm circumpendentium fibrarum tonum enervare, cùm vel maximè ſecretrices cerebri glandulas oppidò premere, ac validè obſtruire potuit; vndè lethalis ſpirituum animalium inopia inducta fuit; præſertim cùm apertiſſimè conſtiterit, plùs acrium ſeroſitatum, & viſcidorum humorum, quàm oleoſo-volatilium particularum diù ægro in corpore redundaviſſe?

VIII. Hoc tandèm breuiter admonemus, non fruſtrâ aliquem ſuſpicari poſſe, nùm repertum in cranio foramen, ad infirmandum robur duræ matris conferre aliquid potuerit. Etenim apud hominem, qui ferè ſemper pro ſuo munere ad obſequia, nudato capite, incedebat, cuniculus iſte acri, aerique innatantibus corporibus fortè minùs, quàm natura poſtulat, obnitebatur. Si quis enim ab Ægro, dum adhuc erat inter viuos, ſciſcitatus fuiſſet, an aliquam ſub perforato cranio in magnis temporum mutationibus moleſtiam perſenſiſſet, eam probabiliter faſſurum fuiſſe, indè

*Cranij foramen
an duræ matri in-
firmandæ contule-
rit?*

*Cranio ob siphil-
tydem desquama-
to, Cerebrum fa-
cile afficitur.*

indè arbitramur, quòd, qui ex siphillydè cra-
nij desquamationem passi sunt, ferè semper de
læsione ab externo frigore conqueruntur, cere-
brique mala facillimè subeunt.

*Cystis felleæ vitia
multorum pectoris
morborum radix.*

IX. De cætero viderint alij, quænam
extiterit origo raræ illius exulcerationis, quæ
in cysti fellea inuenta est. Nos enim, qui hu-
ius primordia ægritudinis penitùs ignoramus,
illud hìc pro coronide tantummodò adijci-
mus, sæpè detexisse morbidam quasi radicem,
vel saltem coniunctam propaginem earum spi-
randi difficultatum, quæ, ex hypochondrijs
ortæ, ad hydropem tendunt, in ipso fellis fol-
liculo altè implantatam; modò nimirum in
lixiviâli, fluidâque nimis, modò in tenaciori,
atque in lapides conuersâ bile, vt non sit du-
bitandum, quàm vitium tam enorme ipsius
cystis felleæ ad morbos istius Ægri maximè
conspirauerit.

X. Neque similiter immoramur in per-
sequendo impedimenta præcordiorum, ac præ-
fertim arteriarum pulmonicæ, & aortæ, par-
tiumque trachealium, multo adipe, auctisque
glandulis obsessarum: non enim causas in-
quirimus annui anhelitus, pulsusque inæqua-
litis, quæ a præternaturali, mutuoque vaso-
rum nisu pendere potuerunt.

OBSERVATIO II.

*Subita Mors ex syncope ob cordis
magnitudinem, prolapsum,
atque aneurysma.*

HISTORIA.



Amulus olim cursor Illustris-
simi Marchionis Spadæ iu-
nioris, nomine Philippus Tur-
ci Romanus, annorum circi-
tèr viginti quinque, habitus
gracilis, staturæ mediocris,
pallidi coloris, anhelitu in leuibus etiàm cor-
poris motibus detineri solitus, ante annum
laborauit suffocatiuâ anginâ, a qua, ter misso
intrâ diei spatium sanguine, liberatus fuit,
superstitibus tamen maiori semper spirandi
difficultate, & recurrente interdum cordis pal-
pitatione, præsertim cum citato gressu ambu-
laret, vnâ cum sepulto præcordiorum angore,
& quodam pulsatili pondere suprâ diaphra-
gmatis centrum. Quæ quidè m mala eòusque
adaugebantur, vt illum, vel inter comeden-
dum, atque ab assumpto potissimùm cibo,
deteriùs haberent. Hic, die 4. Februarij ineun-
tis huius anni 1706. tametsi manè faucium
phlogosi, & quibusdam ad vsque collum,

*Series symptoma-
tum, quæ cordis
magnitudinem, &
prolapsum osten-
dit.*

& iugulum exporrectis contractionibus detine-
retur, pedibus nihilominus Herum suum per
quingentos circiter passus prosequutus fuit.
Domino verò alicubi diutius fortè morante,
ipse cum socio in caupona largè, ac finè de-
lectu comedit, ac bibit; deindè domum re-
uersus post horam, cum frigore corripere-
tur, apud fœminam se recepit, calefaciendi causâ
ad ignem, qui semi accensis carbonibus me-
dio ardebat in cubiculo, vbi paulò post (for-
tè an etiam ex cœstro venereo?) leui primùm
capitis debilitate, deindè frontis, totiusque
corporis madore cum vehementissimo anhe-
litu, cordisque angore, tandèm syncope, in
mortem statim desinente, correptus fuit.

CADAVERIS DISSECTIO.

A Perto abdomine, intestina tenuia
aliquantulùm subrufa; cætera verò
naturalia viscera a natiuo statu pa-
rùm recessisse, præterquam paulò
turgidiora, ac velutì murice subtincta visa
fuerunt.

II. Morborum, & ipsius necis sedes ap-
paruit potissimùm in thorace, quo resecato,
pulmones subalbidi, & dexter eorum costis le-
gitimis tenaciter adhærescens, oculis adstantium
sefe obiecerunt.

III. Fauces rubore perfusas, asperam ar-
te-

teriam substantiâ gelatinæ non abſimili, fuligineo tamen, ac ſubnigro interiùs colore reſertam, cernimus. Rami bronchiales phlogofi paritèr, ac velut àſperitate quâdam laborabant.

IV. Cor mole triplò naturali maius, vacuum certè ſuperabat, cùm, ablato pericardio, & expreſſo omni cruore, pependit in lance libras duas & ſemis. Hoc ſanè viſcus ſuprà diaphragma ceciderat, ac proindè œſophagum, aortam, ac ventriculum facilè premebat.

*Cordis moles au-
ſta, & prolapsus
in diaphragma.*

V. Deindè, etiamſi externâ facie naturalem ſeruare videretur figuram; ſectum tamen nouam philoſophandi materiem ſolertioribus naturæ Veſtigatoribus præbuit; auricula enim, & ventriculus dexter, ſanguine vacui, ſed ordinariæ diametri, contra verò ſiniſtræ cauitates nigro plenæ cruore, & duplò dexteris latiores occurrerunt. Arteria magna iuxtà cor paritèr perampla.

*Siniſter cordis ſi-
nus duplò maior
dextero.*

VI. Secto cranio, pia mater cum vâſis ſolitò tumidioribus ſe nobis præbuit. Cortex cerebri in ſuperficie vtriuſque hemiſphærij verſùs poſticam partem calloſo quodam glutine tenacitèr duræ matri adhærebat. Plexus denique conſtabant ex vâſis ſanguine plenioribus.

S C H O L I V M.

NE prolixitas morosa , neuè breuitas in hâc attingendâ ætiologiâ euadat obscura ; sedulus Lector primò distinctè , mox verò promiscuè animaduertat , primò natiuum Ægri temperamentum , & grauissimos morbos , quibus miser homo per annum ante mortem torquebatur ; secundò proximas necis occasiones ; tertio ea omnia , quæ in illius cadauere obseruata fuerunt . Hæc enim , spero , satis luminis accendent , vt claras subiti huius interitûs rationes videre possit .

II. Quanquàm verò singulæ affectiones , & causæ , quæ Ægrotum hunc detinuerunt , diuisis suarum virium momentis præcocem , subitamque necem afferre vix potuissent ; vniuersæ tamen , momento composito , eandem facillimè induxerunt : Quod sanè minimè arduum videbitur , si quot , & quomodò istiusmodi causæ ad supremam , atque inopinatam Ægri perniciem conspirauerint , diligentèr expendamus . Non enim vna , eaque simplex , aut interna solum causa , sed multiplex , & tum externa , cùm interna , vetus , ac recens ad improuisum illius interitum coniurauit .

*Multiplices huius
improuisæ necis
causæ .*

III. Hoc sanè euidentèr constabit , si duo
ante

ante omnia, quippe quæ admodum probabilia, aduersam istius valetudinem præcessisse intelligamus; alterum natiuum eiusdem temperamentum acro-biliofum, vnâcum solitò grandiori corde, ac paulò debiliori textura finistri ventriculi, atque aortæ, quæ sanè res hominibus, præ cæteris animalibus, non rarò contingunt; alterum verò aduentitium, nimirum intemperans, atque intempestiuè exagitatum Cursorum vitæ genus, per quod non tantum fluida ad acro-volatilem naturam in gracilibus præsertim corporibus euehuntur; sed aeris quoque viæ, & pendulum intrâ thoracem, cor perpetuâ concussione, ac diuulsione labefactantur. Ità certè clara habebimus principia, vndè causas deriuemus non modò suffocatiuæ anginæ, sed, quod caput rei est, lethalis prolapsûs, & aneurysmatis cordis. Cùm enim præcordia per arterias clauiculis, axillis, & collo, perque reliqua vasa pulmonibus alligentur; cùmque pulmones per asperam arteriam, ac per laryngem, veluti per funem, a iugulo, & faucibus propendeant; facile est concipere, infirmiora ex angina, & magis adhuc ex fluidorum acredine, & cursorio vitæ genere reddita huiusmodi suspensoria, ægrius postmodum valuisse ad renitendum descensui præcordiorum, quæ, solitò magis ex mole grauitantia, suis etiam relaxatis, exesisque proximioribus membranarum funiculis, necessariò ex

lege

Ipsarum enumeratio.

Præcordia in Cursoribus cur faciliè labefactantur.

Mechanicus cordis prolapsus modus.

lege grauium suprâ diaphragma lapsarunt,

*Cur maximè ab
assumpto cibo re-
spiratio, & cordis
palpitatio ingra-
uescerent.*

IV. Cùm verò multarum officia partium apud animalia regantur, aut offendantur mutuo contactu, ac nisu, vel diuisione, ac dissociatione; vtique fieri non potuit, quin, grauitante corde præter naturæ ordinem suprâ diaphragma, & diaphragmate suprâ stomachum, indè non solummodò respiratio læsa, sed, tumente ex cibis ventriculo, arteria magna descendens (quæ septum transversum sub corde perforat, & stomacho substernitur) validè compressa fuerit. Hinc fiebat, vt sanguis, impeditâ liberâ suâ traiectione, ac deuolutione per inferiores arterias, necessariò quoquo modo alternè repelleretur versùs superiores arterias, atq; ineundem sinistrum cordis ventriculum, a quo vicissim fuerat extrusus: ibique arietatio quædam nixûs trudendi, ac renixûs trusi iam cruoris ab assumpto potissimùm cibo (quo sanè tempore ventriculus aortam valentiùs premit) sub angoris, ac palpitationis specie proficiscebatur.

V. Et quoniàm ex hac vna radice præpediti motus liberi sanguinis per descendentes arterias sexcenti malorum frutices germinare potuerunt; mirum sanè haud erit, si nos indè principium deriuemus dilatationis tum arteriæ magnæ, tum vel maximè sinistri cordis ventriculi (quas quidem partes natiuâ debiliori texturâ laborare posuimus) nec non
adhæ-

adhæſionum pulmonis , congeſtionis lymphæ in cerebri ſuperficie , tandèmq̃ue, concurrentibus externis cauſis , etià ſubitæ mortis .

VI. Etenim , cum clarè conſtet ex hydrometricis principijs , impedito, vel diminuto ex communi aliquo alueo per vnam, vel alteram fiſtulam aquarum excuſſu , illicò in proximos canales lymphas maiori copiâ deriuari, atque confluere ; immò eaſdem lymphas , ad rationem impediti liberi excuſſûs , ad ipſum quoquè alueum reflecti ; vt, quæ ſucceſſiuè fluxuræ eſſent, in eodem parumpèr ſubſiſtant; ſatis dilucidè apparet , cur in homine iſto cruoris excuſſus , per inferiores arterias ob expoſitas compreſſiones alternè diminutus , alternè pariter maiori copiâ , & vi verſùs cor , & in superiores arterias fuerit deriuatus ; facilèque propterea non ſolùm faucium phlogofes , & capitis congeſtiones induxerit ; ſed etià in ſiniſtro cordis alueo dilatationem, ſi non primùm producere, ſaltè madaugere potuerit .

Morbosæ præcordiorum dilatationis origo principijs hydrometricis illuſtratur .

VII. Porrò cum fluida , præſertim incompreſſilia ferè induant naturam ſolidi , quotieſcunque in anguſtum alicubi tubum violentèr , ac pertinacitèr vrgentur : idcirco planum eſt intelligere , ſanguinem, cum a corde violentèr intrâ compreſſam arteriam truditur , veſtis, cuneique potentiam induere , tantò quidem maiorem , quantò magis locali eiufdem motui acutæ durorum ſalium figuræ

Sanguis intrâ cõpreſſam arteriam violentèr truſus, cunei potentiam induit .

copulantur . Nihil igitur mirum , si apud hunc Ægrum , ex impulsō sanguine intrā impeditam aortam , eoque reuerberato versūs semilunares valvulas , idem truncus , & sinister cordis ventriculus (texturâ aliòqui debiles) dilatati fuerint ; distractiux nāquē percussionis , ac repercussionis vi adiuncta , fuit in sanguine energia cunei erodentium salium , qui fibrosum earundem cauitatum contextum , repetitâ totiès extrusione vltèriùs debilitatum , paulatim diloricare potuerunt ; quibus factum puto , vt , viscus hoc , (remorante etiam sanguine in minimis coronarijs , proximisque distendarum fibrarum spatiosis) grauius semper , ac maius euaserit , sui que idcirco prolapsus , & septi transuersi , aortæque compressionis causam longè magis adauxerit .

a Bened. Castell.
in demonstr. mens.
aqua. current.
prop. 3.

Coniectura de tardiori sanguinis motu per aneurysmaticum lacum cordis sinum .

VIII. At verò , cum ex hydrometricis sectiones inæquales vasorum , per quæ fluida mouentur , eorundem fluidorum velocitatibus sint reciproæ , sequitur , vt , eneruatis fibris impellentibus , si læuæ cordis cauitates duplò maiores dexteris detectæ fuerunt , duplò etiam tardior extiterit motus sanguinis in sinistris , quàm in dexteris ; eòque magis , quò distracta , & ampliata sinistri ventriculi latera in qualibet systole ad mutuum peruenire contactum , omnemque a se cruorem in aortam expellere , atque elutriare nequiverint , quo ,
sa-

fanè copiosè fubfiftente liberis tùm ipfius cordis motibus , tùm influentium a pulmone liquidorum vndis , noua femper augebatur renitentia . Exinde maxima eruitur caufa tùm fepultæ præcordiorum anguftiæ , & grauitatis , quâ poftremò æger deceffit , cùm inuentæ in cadauere ftagnationis fanguinis intrâ finiftrum duntaxat ventriculum . Etenim cùm eò res in curfore ifto deuenit , vt fimul conſpirauerint minor animalium virium potentia ad conſtringendum cor , & maior cordis ob adauctum fuum pondus renitentia ad motum , tunc hercle vires circumpulſiue in cordis ventriculis ad eam rationem , & inter fe , & cum contentis cruoris molibus peruenire debuerunt , quam inuicem habebant fectiones cauitatum , & reſiſtentia vaforum . Sed quoniam dexter ventriculus naturali diametro donabatur , & pulmonum vafa nullo apparenti vitio afficiebantur : finifter verò ſinus duplâ diametro laborabat , & arteria magnaperampla ab ipſo corde , & ſtomaco validè premebatur . Idcirco aqud Ægrum ſuperſtes maior vis in dextero cordis ventriculo minorem fanguinis quantitatem liberè , maiorique velocitatis gradu in pulmonica vafa impellere potuit . Contra verò finifter ventriculus propter minorem ex dilatatione vim maiorem fanguinis molem in præpeditam aortam expedire trudere prohibebatur ; quæ certè cruoris re-

Expoſita coniectura nouis rationibus confirmatur .

mora præcordiorum angustiam, tandemq; mortiferam suffocationem, ac syncopem induxit.

*Lymphæ concre-
tionum causa ex
chymicis.*

IX. Nequè verò hîc animus est longiùs persequi rationes diuersarum lymphæ concretionum, quæ a salino-acrium cum oleosis miscellâ particularum in locis minoris motus, aut maioris impedimenti apud valetudinaria corpora, & nostrum præsertim Ægrum, tum in pulmone dextero, cum in supremo cerebri cortice contigerunt. Etenim satis ex Chymicis tentaminibus innotescit, acria, sulphureis admixta, inuicem coalescere, præsertim apud vinosos: vndè spiritum vini cum vrinæ spiritu in tenax corpus facillimè abire videmus.

*Causarum ad hanc
subitam necem con-
spirantium epilo-
gus.*

X. Cæterùm, vt omnes huius necis causas breuiter perstringamus, repetere cogimur ex cerebri vitio minùs spirituum, quàm naturalis huius hominis postulabat œconomia, aliquantò priùs tempore mortis secretum fuisse; vndè virium debilitas, ex præcordiis orta, maior adhuc reddebatur ex diminuta per cerebri corticem liquidi animalis separatione, quæ ob callosum inuentum eiusdem glutinem vltro se nobis obtulit. Factum proinde fuit, vt ad repentinum interitum Ægri simul conspirauerint primò noua partium salino-acrium in fluidis exaltatio, quæ ex postrema faucium phlogosi apertissimè innotuit; secundò motus corporis, dum quiete indigebat; tertio ingluies, & vini abusus, cum diætâ opus erat; quar-

quartò ſuffocatiua bronchiorum irritatio ex carbonum fumo , qui in cadauere per fuligineum tracheæ colorem in apertum ſe dedit ; tandèm (ſi fortè acceſſerit) veneris œſtrum , quod ſpiritus maximoperè impuros , ac perturbatos in nouum , atque omninò improporcionatum motum circà præcordia agere potuit . Vndè cor ipſum , ſuapte natura magnum , & , ſanguine ſubſiſtente , grauius redditum , ob exiguas animalium ſpirituum vires ab omni penitùs motu conſtantiffimè defecit .

Fuligineus tracheæ color ex fumo carbonum .

XI. Sed , ne hîc longè de ſcholijs cancellis abire vererer ; profectò exemplis etiam oftendere poſſem , quàm facilis via ſit ad præcocem , inopinatamque mortem nimis aucta cordis moles , eiufque prolapſus . Vnum tamen caſum , noſtro quippe ſimillimum , a (a) P. Marchetto deſcriptum , coronidis loco afferre liceat . Venetus quadragenarius , crapulæ deditus , anhelitu , & hypochondriorum anguſtiâ detentus , multis fruſtrâ adhibitis remedijs , Patauium petijt , vbi poſterâ nocte repente obiit , in cuius cadauere nihil præternaturam intrâ abdomen ſe prodidit ; verùm in thorace cor adeò amplum obſervatum fuit , vt tria naturalis magnitudinis æquaret ; ventriculis itidem ampliffimis , cuius capſulæ vbique preſſiùs adhærebat ; ſuperioribus , ac lateralibus partibus pleuræ etiam adnexum ;

a Obſer. 49.

inferiori verò eidem diaphragmāti. Scilicet, ut minimè sit hæsitandum, adauctam cordis molem, situmque ex prolapsu vitiatum, ad repentinam denique mortem conducere.

*Cordis prolapsus
quandoq: hydropis
speciem induit.*


XII. Quòd si verò malum hoc corripiat hominem, in victu, ac motu satis temperatum, tandem hydropis speciem induit, pedum œdemate, nocturnâ ortophnæâ, carotidum palpitatione, vrinarum paucitate, atque angore paulatim inductis. Nec interim deerunt fortè Medici, qui, huius ignoratâ morbi radice, non hydragogis modò, sed multis vesicantium, vstionumque tormentis Ægros extorqueant. Verùm de ijs fusè in nostro de Aneurysmatibus Tractatu.



OBSERVATIO III.

*Cita mors ob interceptum motum aeris,
& sanguinis in præcordijs, unà
cum cerebri consensu.*

HISTORIA.



Ohannes Baptista Auanzius, octodecim annos natus, D. Cæcilæ de Nobilibus famulus ex ora maritima romanæ ditionis malam circà præteritum autumnum repor-

tauit valetudinem; hinc prauo vultus colore cum anhelitu laboriosam vitam Romæ ducebat, improbâque victus ratione vsus, cum planè imbecillis esset, tamen adhuc seruiebat; præcedenti suum interitum vesperi largâ castanearum copiâ se ingurgitauit, noctemque proindè valdè molestant ex spirandi præsertim difficultate transegit; & in ea quidè, post vomitum viscidorum humorum cum meliùs habere crederetur, manè tamen, quæ fuit 3. Febr. 1706. mortuus repertus est, e cuius ore spumosa lympa, vt ex naribus filamenta sanguinis pendebant.

CADAVERIS DISSECTIO.

CAdauer post 24. horas inuentum est cum latice sanguineo, ex sinistra nare profluente, & cum thorace solito elatiori, ac tumidiori. Seais tegumentis, occurrerunt intestina tenuia aliquantulum rubicunda, & intrâ abdomen modica quantitas feri sanguinei. Lien prægrandis, ac plumbeus, ponderis exactè librarum quatuor cum dimidiâ. Hepar sanum dixisses, si bilem subuiridem sua in cystide contentam excipias; cætera naturalia viscera vix cum notabili labe inuenta.

*Tendineæ fibræ
pulmones Costis
colligantes.*

II. Eleuato sterno, serum in vtraque pectoris cauitate magnâ copiâ offendimus, & pulmones, costis colligatos, non ordinariâ quidè superficiesum cohæsiõne, sed per albas quasdam, teretes, ac verè nerueas fibras, quas, oculo iudice, tendines putauisses. E cordis vasis, & cauitatibus sanguis nigerri- mus extractus est, grumis non in vnum tenacitèr coagulatis, sed atrâ cum tincturâ diffluentibus. Dexterum cordis sinum insignes polypi, certè plûs vnciâ pendentes, ferè vniuersum opplebant; sinistrum verò exiguus occupabat. Cordis, pulmonumque parenchymata summoperè flaccida tractabantur.

III. Digni quoque animaduersione fuerunt

runt pulmones, qui, manu pressi, ut a col-
ligatione cum costis diuellerentur, cruento la-
tice per dehiscentes quosdam in superficie mea-
tus faciliè manabant.

*Latex a compressa
pulmonis superfi-
cie manans.*

IV. Circumsecto cranio, & durâ matre,
pia occurrit, solitò rubentior, turgidis san-
guine vasis. Quinimò cerebri superficies, di-
ductis duobus hemisphærijs, usque ad corpus
callosum eâdem tincturâ laborabat. Apertis
ventriculis anterioribus, serum limpidum ef-
fluxit, & plexus, qui intùs serpunt, ex vasis
solitò tumentioribus constabant. Transuersa-
les quoque duræ matris sinus nigro sanguine
opplebantur.

SCHOLIVM.

DVbium fanè in primis oriri posset,
an mors ista purè subitanea di-
cenda fuerit, quippè quam lon-
gus integræ ferè noctis agon præ-
cessit; sed, cùm dissectum cadauer quædam
animaduersione nostrâ ostenderit non indi-
gna; idcirco promiscuè citum hunc cum alijs
improvisis interitibus vsurpabimus.

II. Illud utique non dubium est, huius
mortis causam fuisse interclusam penitùs cir-
culationem sanguinis in præcordijs, & cere-
bro, quam magnus Hippocrates sub genere
fortis apoplexiæ comprehensam quoque vo-
luit,

a In com. ad
tex. 2. de morb.

*Apoplexia ob va-
forum thoracis in-
terceptionem ex
Martiano, & Fra-
casto.*

luit, vt optimè philosophatur egregius ille Hippocraticæ doctrinæ assertor (a) Martianus vbi ostendit, aliquandò apoplexiam fieri interceptis vasis in Thorace; quia scilicèt animaduertit ijs in partibus maximè apparere effectus interclusionis, difficultatem scilicèt respirationis, & angustiam. Hinc aliàs citatus eruditissimus Fracastatus apoplexiam, impedito motu sanguinis in pectore, sæpius per anatomen ostendit. In casu siquidèm nostro mortem præcessit anhelitus, & non minùs intrà cerebrum, quàm intrà pectus clara indicia moræ sanguinis, quam Hippocratis Interpretes *stationem* vertunt, detecta fuerunt. Quid enim cordis polypi? Quid sanguis effusus per intestinorum substantiam, & remoratus in meningum vasis? Quid tandèm exundans cum intrà pectus, tum intrà cerebrum serositas ostendit, nisi, oppilatis, conuulsisque pulmonum, cordis, ac cerebri tubulis, lymphatica præsertim vasa hàc illàc dissilijsse, & ipsa quoque sanguiferorum extrema eòusque diducta fuisse, vt secernendo sero vitiosè dehiscerent?

*Morbi, & mortis
huius ætiologia.*

III. Quoniam verò res quærimus, non verba, breuem idcirco, dilucidamque ætiologiam tum morbi, cum mortis exponi posse arbitramur, si nobis proponamus Adolescentem, qui ex mala victus ratione, & maximè ex diutina mora autumnali tempestate
in

in huius maris littore (vbi autumnali tempe-
state summoperè noxius est aer) vitia fermentorum , ac sanguinis abundè contraxit , indè-
que labefactato viscerum , vasorumque tono ,
illud (2) Luciani scomma aduersùs Romanos
tantò iustiùs promeruit , quòd non solùm
Æger ambulauerit , sed quòd Æger sanis , &
valentibus famularetur : eò proptereà deue-
nit , vt , contumacioribus semper redditis in
liene obstructionibus , inductâque sensim po-
lyporum congestione in cavitatibus cordis ,
ille non asthmate duntaxat detentus fuerit ,
sed ad pectoris hydropem properauerit . In
hoc autem rerum statu constitutus , cum die
ante sui interitûs noctem insalubri castanea-
rum cibo largiùs vfuseffet , facilè indè , acidâ
contractâ stomachi cruditate , excitatoque vo-
mitu , hypochondriorum subiit conuulsionem ,
quæ acres eodem tempore ichores , diù intrâ
prægrandis lienis loculos , aliarumque glan-
dularum folliculos fortè detentos , validè per
sanguifluas , lymphaticasque venas , perindè
quasi per totidè syphones , versùs cor , &
pulmones , (diù iam semi obstructa , atque
eneruata) circumpulit , & iniecit . Hi autem
acerrimi ichores duplici ratione circulationem
sanguinis apud præcordia intercipere potue-
runt , scilicèt tum contentum fluidum coagu-
lando , cùm continentes canales conuellendo .
Etenim primo loco fermenta ista salino-acria ,

a De merced.
conduct.

*Præcordiorum la-
bes a liene com-
municata.*

*Circulatio in ist-
dè duplici ex causa
intercepta.*

ex hypocondrijs repentè sanguini affusa, eiusdem compagem, ac mixtionem maximè perturbarunt; vndè, variatis cohæſionibus particularum fluida componentium, earundem æquilibrium, atque indè fluxilitas, quæ ubique ferè æqualis eſſe debet, vitiata fuerunt; coactisq; proinde mutuo sanguinis fibris, hîc grumi occurrerunt, & polypi; illîc verò ſeroſitas intrà cauitates copioſius exundauit. Deindè verò huiusmodi etiam acerrimi ichores moram iniicere ſanguini cœperunt, inquantùm ſcilicèt canalium conuulſionem, quam Hippocrates interceptionem definiuit, induxerunt. Cum enim ſanguineorum textura ductuum tota fibroſa ſit, ac muscularis, quotiès particulæ præter naturam fluxiliores, & acutæ, a ſanguinis miſcellâ ſecedentes, intrà fibroſum rete magnorum vaſorum penetrant, neceſſariò tanquàm extranei cunei eorundem criſpaturam producunt, & conuulſionem, per quam, minoribus factis vaſorum diametris, fluxus neceſſariæ molis ſanguinis, deuoluendi tùm a corde in cerebrum, cùm a cerebro in cor, impeditur; vndè idem ſanguis ob craſſiorem fibroſarum partium acquiſitam conſiſtentiam, atque ob viarum interceptionem tandèm circuire deſiſtit. Et quoniàm ex eodem ^(a) Hippocr., cum ſanguis non mouetur, fieri non poteſt, quin vniuerſum corpus quieſcat. In hoc ſanè vera ſyncopis, atque

*Vaſorum conuulſio
quomodo contin-
gat.*

2 2. de morb.

atque apoplexiæ , quinimò celeris huius interitus rati o elucescit.

IV. In exposito verò casu , vt concretio fibrosarum sanguinis partium ex polypis euidentè innotuit ; ita ipsam interceptionem vasorum cruenta filamenta , quæ de naribus , dum æger interiit , pendebant , clarè demonstrarunt ; nimirum venas iugulares , & superiorem cauam ita fuisse conuulsas , vt sanguinem , quem a supernis venis exhaurire minimè potuerunt , per exiliores venarum nasi extremitates transfuersim erumpere coegerint.

*Cruenta ex navi-
bus filamenta vaso-
rum interceptionis
indicium .*

V. Quòd si simplex cauæ ligatura , doctis primùm LoWero , ac Willisio , ascitem sex horarum spatio in cane , alioquin sano , inducere potest ; quantò sanè celerius in nostro casu tot complicatæ causæ hydropem producere , atque hominem diù ægrotantem perdere valuerunt ; vnà enim coniurarunt fusæ , atque exuperantes ex coacto sanguine serositates , pulmonum tunicæ dehiscen-tes , & sanguifera vasa partim obstructa , partim strangulata , itaut hæc simul omnia inchoatum iam pectoris hydropem (quem sanè euentum sæpè vidimus) momento temporis compleuerint : hinc serum præ sui copia thoracis machinam extrudendo , solito elatiorem reddidit , intusque pulmones premendo spatium ademit , in quod iidem , cum nihil renititur , ob vim incumbentis per tra-

*Hydrops ex Cauæ
ligatura .*

a 4. de Morb.
n. 33.

cheam aeris dilatari solent ; cuiusmodi sanè inspirationis renixum mechanicè, exemplo phialæ, demonstravit (a) Hippocrates .

*Ab hypochondrijs
ad cerebrum citis-
sima infensi liquo-
ris derivatio .*

VI. Patet igitur, præpeditâ in præcordijs liberâ ipsius sanguinis traiectione , atquè etiâ prohibîtâ respiratione , Ægrum hunc citò fuisset peremptum ; & quidè conspirantibus præfocatione , syncope , ac nervorum syderatione . Neque enim a censu causarum celeris huius interitus excludendus venit defectus motus sanguinis , & separatio spirituum in cerebro , vbi adèò clara indicia coacti sanguinis intrâ meningum vasa apparuerunt . Etenim , cum ichores malefici apud miserrimum Iuuenem ex hypochondrijs celerrimè in præcordia ponantur transducti , dubitari non potest , quin iuxta citissimæ circulationis legem aliqua eorundem portio etiam ex præcordijs in caput , agonis principio , ocysimè deriuata fuerit . Vndè patet , quomodo ipsa quoque cerebri apoplexia in Ægri perniciem denique conspirauerit .

VII. Hæc profectò fati nobis esse videntur ad morbi , mortisque causam rimandam ; nisi pro coronide velimus addere nonnullas annotationes ab ipso extispicio deducendas , &

VIII. Primò quidem perpendenda venit singularis illa per albas, teretesque fibras pulmonum cum costis colligatio , quam sanè nobis rarò obseruare contigit . Adglutinatio siquidem

dem pulmonum cum costis, quæ sit a valida, & vbiq; æquali superficierum pulmonum, & pleuræ cohæfione, frequentèr occurrit; illa verò, quam in cadauere isto offendimus, fortè maiori ex parte congenita, non tota per morbum induta aliquibus videbitur. Egregiè porrò hâc de re Malpighius in oper. posthum. in respons. ad D. Placit. vbi istorum natiuorum meminit vinculorum, quippè quos, sicubi inueniuntur, inspirationi admodum famulari arbitratur.

Pulmonum cum pleura per ligamenta cohæfio aliquibus fortè congenita.

IX. Secundò rarum quoquè se nobis præbuit curiositatis argumentum, quod, compressis pulmonibus, ferositates veluti ex imbibita spongia per dilatatos poros fuerint extrusæ. Hoc sanè nequaquam contigisset, nisi duo in pulmonibus mala, colluies nempe ferosa, atque extremorum vasorum hiatus, ex salinis ichoribus, tanquam excuneis ampliores redditi, simul concurrissent. Hinc claro experimento doceri possumus, in quem laxitatis statum veniant vasorum tunicæ, cum in obscuris, abditisque abdominis locis ad ascitis productionem dehiscunt.

Vasorum dehiscencia in ascite.


X. Tertiò negligi certè a doctis Viris non poterit examen causæ, cur sanguis in cordis ventriculis non quidè conuetâ tenaci densitate, sed friabili, ac diffuente consistentiâ inuentus fuerit. Hoc sanè phœnomenon ex defectu mixtionis rubræ cum fibrosa, & alba sanguinis parte, quæ intrâ cordis sinus in polypos coalue-

Morbosa sanguinis in corde fluxilitas, vndè.

rat deduci posse censemus : reliquum enim sanguinis facile difiluit fibrarum retinaculo solutum ; vt passim contingere videmus etiàm in extracto per venæ sectionem cruore , in quo , cum superior pars in albam concrefcit gelatinam , inferior , quæ nigra apparet , semper solitò fluidior occurrit .

*Polypi acidis, non
alkalicis dissolun-
tur .*

XI. Differendum aliquid superesset de causis , ac modo , quibus polypi intrà cordis , & sanguiferorum cauitates concrefcunt , deque menstruo acido , quo extrà corpus dissolui solent , quando alchalicis fixis , aut volatilibus nequaquam superantur ; sed opus hoc , studio , experimentisque plenum , reijcimus ad tractatum longè maioris laboris , atque vtilitatis , quem de Corde , & Aneurysmatibus adornamus .



207

OBSERVATIO IV.

*Repentina mors ex conuulsione thoracis ,
præcordiorum , meningum , ac to-
tius corporis , in fortissimam
apoplexiam ocysimè
desinente .*

H I S T O R I A .



Joseph Sali Pistoriensis ann.
54. habitûs mediocris , olîm
hæmorrhoidibus , & biliosis
diarrhæis vexabatur , quibus
tempore deficientibus , se-
pulti in pectore dolores , ac
recurrens incertis diebus spirandi difficultas
absque vllâ quidè anacatharsi , sed cum faciei
squallore , rigentique artuum frigore illum vr-
gere cœperunt . Ante mensem identidem in-
asthmatis paroxifmis penè animo linquebatur ,
atque ob graua quædam pathemata miserè ,
& cum mœrore viuebat . Tandèm pridè an-
te mortem a Monialibus B. M. Assumptionis
ad famulatum vocatus , laboriosam , sedulam-
que operam , hùc illuc festinando , proprias
vltrà vires locauit . Denique , suffocatio cor-
reptus anhelitu , aphonus repentè factus est ,
& vniuerso corpore conuulsus , animam ef-
fla-

flauit , facie admodum tumidâ , oculis intrâ orbitam retractis , & spumâ ad os , ac nares confluente . Obijt autem die 13. Martij 1706. horâ 23. in publica via , quæ ducit ad Templum S. Mariæ in Porticu .

CADAVERIS DISSECTIO.

*Virga subrigida
in cadauere .*

Vniuersa corporis superficies excolor , facies verò rubicundoluescens apparuit vnâ cum spumâ intrâ os , & nares , quæ , amoto sterno , alioquin valdè depresso , per solam pulmonum compressionem copiosius redundabat . Virga , elapsis viginti quatuor horis ab interitu , adhuc subrigida cernebatur .

*Summa sanguinis
fluxilitas in eodem .*

II. Vniuersalia integumenta , cum primùm cultro inciderentur , statim fluidissimo , sed atrii coloris sanguine , perindè quasi adhuc inter viuos versaretur æger , affluenter manabant .

III. Referato abdomine , omentum , intestina gracilia , & mesenterium rubebant , diffuso , ac remorato per minima illarum spatia sanguine .

Pancreatis molities excedens .

IV. Pancreas ob morbidam substantiæ mollitiem ferè ductileprehensum fuit .

V. Hepar , quanquàm neque mole , neque colore , aut substantiæ ratione a natura-

li statu recedere videretur , in cystide tamen bilem fluidissimam , ac subobscuri coloris continebat . Cætera in abdomine viscera prorsus illæsa , & integra inuenimus .

VI. Aperto thorace , lerna malorum venit in conspectum : etenim pulmones utroque in latere pleuræ , diaphragmati , & pericardio ita adhærebant , ut nec digitis euelli , nec cultro æqualiter ab imo ad summum separari potuerint . Et quanquam in pulmonibus neque pus , neque ferum occurrisset , contractio tamen quædam , & renitentia , seu diminuta flexibilitas obseruabatur .

Fortis pulmonum ad singulas in thorace partes adhæsiō.

Eorundem rigiditas .

VII. Cor , licet mole non magnum , adeo tamen tumidum , tensum , & orbiculatum deprehendimus , ut in systole adhuc positum dixisses . Vena caua , & auricula dextera naturali diametro aliquantulum ampliores , fluidoque Sanguine tumebant ; quo sanè cruore , & quidem multò fluidiori , scatebant sinistræ cordis cauitates , in quibus nullus polypus , aut grumus latitabat .

Ita & Cordis .

VIII. Secto cranio , dura mater excolor , & supra cerebri corticem admodum contracta ; pia verò , suis tumentibus ex fluido sanguine vasis , occurrit . Cumque amputaremus portionem corticalis , & medullaris cerebri partium , vidimus (ut apud strangu-
lato) puncta sanguinea spisso agmine candidam medullæ substantiam variegare . Palli-

Valida dura matris Contractio .

*Serum a cerebri
ventriculis ad vsq.
spinalem medullā
effusum.*

dam serositatem non apertis solūm ventriculis profilijsse, sed ad vsque spinalem medullam redundasse, deprehensum fuit.

S C H O L I U M.

VNicam nascendi, innumeras verò moriendi hominibus esse vias, nihil est, quod nos doceat apertius, quàm ipsa cadauerum sectio, quæ occultas necis causas ad Solis lucem euidentè exponit. Vidimus in præcedentibus extispicijs, quàm variæ moriendi rationes fuerint detectæ: nunc rara interitûs causa se offert in descripto Ægro, eiusque dissecto cadauere. Etenim, quanquàm morbus, quo decessit, vulgaris, ac notissimus videri possit alicui, qui solidarum vitia partium considerare solummodò velit, fuit siquidem vehemens, atquè contumax conuulsio præcordiorum, quæ, cerebro, & vniuerso corpori communicata, aeris, sanguinis, & liquidi neruei alternum fluxum, ac refluxum lethalitè præpediuit; vndè fortissima tandè apoplexiæ species exorta est; attamèn si sedulò aduertamus per dissectionem cadaueris singularem sanguinis crasim innotuisse, vberiore certè materiem admirandi simul, ac philosophandi offendemus: inuentus quippè fuit post integrum a morte diem cruor adeò solutus, & fluens,

Morbi huius natura qualis.

fluens, ut, si homo iste funeri superstes fuisset, fluidior esse non potuerit. Hæc perfectò sanguinis in cadaueribus conditio ita rarò existit, ut, si quandò euenerit, portenti, ac prodigij simile numeretur; & quemadmodum ab insolenti causa id proficiscitur, ita vires, effectusque nonnisi insolentes nostris in corporibus producere valet. Sed iam vtraque tam solidorum, quam fluidorum mala, seorsim, diligentèrque perpendamus.

Sanguinis fluxilitas in cadaueribus rara.

II. De mortifero præcordiorum, cerebrique spasmo clara occurrerunt indicia ante, & post mortem, videlicet sepulti in pectore dolores, difficultas respirationis absque ullâ anacatharsi, angor suffocatiuus, spuma ex naribus, & ore, quæ, præssis pulmonibus, affluentiôr fiebat, sternum depressum, oculorum retractio, totius denique corporis, atque ipsius etiam penis conuulsio; quibus adiuncta fuit elegans observatio rotunditatis, ac tensionis in corde, quæ probabiliter nos docuit vitale hunc musculum, dum æger interiit, pertinaci conuulsuâ systole fuisse correptum; cui sanè cum ingens accesserit quantitas cruoris intrâ suas cauitates reperti, nostrum subit animum dubitatio de insuperabili renixu sanguinis, qui, cum ob pulmonum, totiusque corporis conuulsiones liberum in arterijs spatium inuenire non posset, ut cordis pulsioni obsecundaret, necessariò intrâ ventriculos

Signa spasmus in præcordijs, et cerebro indicantia.

*Ex aortæ compres-
sione cordis immo-
bilitas, rotunditas
&c.*

diastolis tempore admissus, a quantacunque cordis contractione vrgeretur ad egressum, subsistere tamen, tandemque validissimè reniti coactus fuit. Vndè postremus ille ortus est præcordiorum angor, penitusque, & ex tempore disruptus vitalis ille circulus a corde in cerebrum, & a cerebro in cor. Qui sæpè viutorum sectionibus interfuerunt, ignorare nequeunt sanguinem, arteriâ magnâ casu, vel arte compressâ, non inuenire spatium, per quod liberè excurrere possit; vnde cor manet plenum, immobile, ac rotundum, citiòque animal moritur.

*Spasmus menin-
gum vniuersæ con-
uulsionis origo.*

III. Status deinde duræ matris clarè paritèr nobis ostendit pertinacem conuulsionem, in quam ipsa paulò antè Ægri mortem venerat; inuenta enim est excolor, simulque contracta, vt non sit hæsitandum, quin idem meningum spasmus, qui cerebrum obsidebat, ac circumcingebat, vniuersæ radix extiterit conuulsionis.

*Sanguis in Cada-
uere cur fluxilis
adhuc perstiterit.*

IV. Sed hæc notiora sunt, quàm vt longius examen mereantur. Pergamus igitur ad particularem illam, & raram conditionem fluiditatis, quâ sanguis non in præcordijs modò, & cerebro, sed in toto etiàm succutaneo corpore donabatur. Hoc sanè phænomenon pro causa habuisse suspicamur non, solum violentiam motûs corporis, quam æger postremo suæ vitæ die sustinuit, & per quam
id

id contingere cruori suo potuit, quod euenit in recentè effuso, & diu in vase agitato sanguine, qui cum ob motum in fibras coalescere nequit; sed potissimùm exaltationem salium acrium, maximè ad vrinofam naturam accedentium in homine, cæteroquin hæmorrhoidibus, ac biliosis diarrhæis olîm detento; qui profectò sales, cum per vehementem, crebròq; repetitam corporis exercitationem, oleosis spiritibus, & aqueis partibus, quorum miscellâ cicurabantur, exausti fuerint, nil mirum, si intimè cum sanguine agitati, ac permixti eam fluxilitatem, eidem conciliare potuerunt, quam induci passim videmus in extracto recenter e vena sanguine per additionem salis vrinosi, & præcipuè spiritûs salis armoniaci.

Salis vrinosi vis ad Sanguinem dissoluendum.

V. Cum verò infusiones liquidorum acrium intrâ viuientium brutorum venas nobis non semel ostenderint, easdem præcordiorum, totiusque corporis immanes conuulsiones, quas illicò mors sequitur, inducere, nihil est, cur dubitemus, quin vera causa conuulsionum, quæ nostrum ægrum ad necem perduxerunt, extiterit copia huiusmodi liquidorum salino-acrium, quæ, cum nimium exaltata, & acutissima reddita, ex hypochondrijs intrâ sanguineos canales magnâ copiam transducuntur, veneni naturam induunt: tunc enim propriæ excessu molis naturalem reliquarum in sanguine particularum superant pro-

Coniectura de conuulsionum causa experimentis confirmatur.

Mali fomes in hypochondrijs.

proportionem , ac proindè ratione propriæ indolis cruorem non tantùm fluidiorem , ac mobiliorem , sed , quod magis est , procliuiorem efficiunt , vt ex naturalibus vasorum cancellis facilè se proripiat , atque intrà strictissimam compagem fibrarum muscularium vasorum , & glandularum vtrò se insinuet , ac penetret ; hinc neruorum , musculorum , vasorumque conuulsiones , vnàque simul incongruæ contentorum fluidorum separationes , ac moræ , vt in præsentî casu , solent contingere .

VI. Mouet autèm nos ad credendum, scatebram prædicti liquidi salino-acris , & armoniacalis in hypochondriorum folliculis latitasse, quòd obseruauerimus non solùm cysticam bilem fluidissimam , ac subobscuri coloris (cuiusmodi euadere solet artificiali admixtione salium acrium) sed ipsum quoque pancreas lentorem plicabilem , ac ferè ductilem adeptum fuisse , qui planè oriri poterat ex diuturna , & copiosa secretione fluidi acerrimi , ac dissoluentis , quod strictam illius glandulæ fibrarum cohæsiõnem elimare , debilitare , ac ferè tollere valuerit ; vndè resistentia minor , seu mollities maior eo in viscere producta fuit : quemadmodùm fanè in cadaueribus illorum , qui ex diabete perierunt , renes omninò flaccidi , plicabiles , ac ductiles ob eandem rationem inueniri solent .

Diabeticorum renes ductiles .

Si-

VII. Similitèr non aliundè petenda effe videtur causa tam profundæ intrusionis sanguinis intrà strictissimam cerebri medullam, quàm ex conuulsione continentium, simulque dissolutâ nimium compage contenti liquidi, cuius maior fluiditas, vt e succutaneis vasculis ad simplicem integumentorum scissionem, erumpendo, prodijt; ità in cerebro vltiorem penetrandi vim nacta fuit a meningibus, sinubusq; conuulsis, perindè quassia consociatis ad circumpellendum manibus. Vndè cruor, ad vsque medullarem cerebri substantiam expressus, rubentibus illam punctis variegauit.

Sanguinis intrusio ad cerebri medullam vnde.

VIII. Ipsa quoquè perseuerans post mortem penis tensio (quæ rarò in strangulatis non inuenitur) præteritæ vniuersalis conuulsionis testis adfuit. Cum enim virile membrum sit musculus mirabilis contexturæ, cæterorum instar musculorum spasmodicas affectiones pati potest. Modum verò, quo penis iuxtà naturæ ordinem tenditur, egregiè tradidit ^(a) Malpighius. Illud tantummodo ad rem nostram hìc perstringimus, quòd, sicuti spuria quædam colis erectio in cadaueribus excitari potest per solam iniectionem, tepentis cuiuslibet liquidi intrà eiusdem arterias, dummodò venulæ filo strangulatæ, ne refluat, impediant; ità profectò non dubitamus, quin eiusdem erectio, quæ ob nervorum, fibrarumque conuulsionem, fluida in si-

Penis musculus

^a In conf. de impot. vener. apud Bibl. Med. Manget.

Eiusdem notha erectio in cadaueribus, quomodo excitetur.

nubus fistulosorum corporum intercipientem, antè huius ægri mortem cœpit, persistente eodem fibrarum spasmo, vel post mortem perseverauerit.

*Sanguine fluxili
existente quomodo
facies pallida, &
extrema frigida
perdurauerint,*

IX. Cæterum non adeò laborandum in ea dubitatione, quomodò scilicèt stare simul potuerint summa fluiditas sanguinis, & facies excolor, atque artuum illud frigus, quibus æger iteratis in præfocationibus detinebatur. Etenim, eadem vasorum strangulatio circà præcordia, quæ suffocatiuum asthma sæpè intulit, liberum sanguinis per extremas arterias excursum, & ignearum particularum per minima carniū diffusionem præpediebat. Vndè caloris, ac viuidi coloris priuatio exoriebatur; quam sanè priuationem consequitur sensus frigoris, quemadmodum apud hystericas mechanicâ istâ vasorum lege accedere, ac recedere passim obseruamus. Quo fit, vt magnus ille Medicorum Romulus, vt rectè (a) Hipp. solertissimus Bagliuus noster, post Sydenhamium, appellauit, scripserit ad rem -- *Corum mutationes, corde adstringente venas, (intellige etiam arterias) ac laxante, fiunt; laxante quidè rubicundi, ac benè colorati; constringente verò cum pallore liuidi &c.*

a Lib. de off. nat.
n. 28.

Iuxtà varias cordis affectiones colorum in facie mutatio, ex Hipp.

b Aph. 41.

X. Mortuus itaque improuisò miserrimus homo iuxtà magni Senis (b) effatum, cum tam frequentèr, ac fortitèr absque manifestâ, scilicèt externâ, causâ animo defecisset; & de-

na-

natus est ob complicationem trium malorum, suffocationis, syncopis, & apoplexiæ, quam sub voce syderationis, ab acri humore pendens, idem ^(a) Hippocr. per hæc verba, oraculorum loco habenda, accuratissime descripsit.

-- *Cerebrum autem cladem perfert, etiam ipsum non sanum existens, sed, siquidem radatur, (enimmodum conuulsionis) turbationem multam sustinet, & cerebrum conuellit, ac distrahit totum hominem, (enim conuulsio vniuersalis) qui in se ipso vocem non edit, (enim aphonia) & suffocatur, (enim suprema complicatio malorum, præfocationis scilicet, syncopis, & apoplexiæ) demum concludit -- & hæc affectio syderatio, & apoplexia appellatur: -- quæ quidem non semper in solo cerebro quaerenda est. Aliquando in vasis, aut cavitatibus cordis obstructis, compressis, atque conuulsis, intercepto cruore, delitescit. Sæpè in vno ægro multæ partes, immò omnes obseruantur affectæ, vitio vel primario, vel secundario, vt scitè aduertit Thomas ^(b) Bartholinus, & nos in præsentī casu notauimus.*

Triplicem ob morbum hic æger perijt.

a Lib. de gland. n. 9.

Hippocratis oraculum.

Syderatio interdum a corde eiusque vasis derivatur.

b conf. de Anat. pract.



OBSERVATIO V.

*Improuisa mors ex subita Caua intra
pericardium disruptione cum aneu-
rysmate arteriæ magnæ .*

HISTORIA.



Tephanus Ascieri futor Iauensis , sexagenario maior , habitus carnosus , octo ab hinc annis podagrâ , & chiragrâ circa æquinoctia grauiter vexatus , ante biennium tussi

cum spirandi difficultate detineri cœpit ; deinde cordis palpitationem , & sepultum quandam sub dextero sterni latere grauatiuum , atque interdum acutum dolorem , ad vsque humerum propagatum , pectoris angustiam , ac profundam pulsationem passus fuit .

Sepultus sub dextero sterni latere dolor cum palpitatione cordis .

Vertigo tenebriosa .

II. Decursu proximè præteritæ hyemis non rarò corripiebatur etiam vertigine cum sensibili capitis excalefactione , ac præcipiti virium lapsu . Quare sæpè ad suendum ineptus reddebatur . Dimidium quadragesimæ falsamentis transegit . Tandem die 14. Martij 1706. hora 17. cum a prandio merum ingurgitasset , statim aphoniam , atque angore cecidit exanimis .

CADAVERIS DISSECTIO.

MIrabile profectò nobis visum fuit, quòd nullum in abdomine contentum viscus a naturalis œconomix legibus recessisset; adeò singula colore, mole, ac substantiæ ratione optimè constituta occurrerunt. Sola cystica bilis subobscurum quid referebat.

II. Horrendum e contrariò spectaculum thorax nobis exhibuit; detractò enim sternò, (quod parte sui dexterâ elatius erat sinistrâ) dexter pulmo rubicundior, & pleuræ admodum adglutinator, cum adnato duro, & magno corpore apparens, curiositatem nostram lactavit, vt diligentius rei nouitatem detegeremus. Latebat enim statim extra pericardium aortæ aneurysma; deinde adactò cultro, illicò lamellam osseam deprehendimus figuræ oualis, quæ externam dilatatæ arteriæ partem, quâ sternum, costasque dexteram respicit, occupauerat. Sub ea lamina, & circum externam aortæ cavitatem, quæ antè posita est, polypeam substantiam instar lardi in fornicem adeò concinnè incrustatam inuenimus, vt nunquàm aliàs in aneurysmatum cystide similem detegere datum fuerit; hoc siquidè corpus igne priùs liquatum, & mox frigore integrè concretum videbatur; non

*Dextera Sterni
pars elatior.*

Aortæ aneurysma.

*Lamella ossea in
aneurysmate.*

*Rara polypi
structio in aneurysmate.*

enim in multiplices laminas , ac veluti in folia distrahi (vt passim solet) patiebatur . Vndè constitit , validum aggerem pulsioni sanguinis versùs externas partes positum fuisse . Facie verò , quâ pulmones tanguntur , minori poly-
peo repagulo obsessam , tectamque aortam ,
deprehendimus . Aneurysmatis intereà caui-
tas tam ampla occurrit , vt pugnum facillè ad-
misisset , tamque grumoso plena sanguine , vt
nihil fluidi amplius capere posse videretur ;
nusquam tamen magno aliquo foramine de-
hiscebat , licèt ad cordis basim intrà pericar-
dium , & ad inferum latus aneurysmatis ni-
græ quædam striæ maiorum fortè futurorum
hyatuum indicia , obseruatæ fuerint . Lon-
gitudinis ipsius aneurysmatis non excedebat lon-
gitudinis aortæ , quâ curua est , dimidium ,
quæ proindè aorta tùm supra , cùm iuxtà cor
natiuam diametrum , ac fibrarum validitatem
factam , tectamque elegantè seruabat .

*Striæ ad latus ane-
urysmatis quid in-
dicarent .*

III. Sed non hîc malorum finis ; etenim cum
ipsum pericardium maximè tumidum , molle ta-
men , animaduerneremus , suspicati fuimus de la-
tente aliquo præternaturali fluido . Sectum pro-
inde ingentem dedit , quantam scilicet capere po-
terat , effusi , atq; in grumos conuersi cruoris
quâtitatem , quæ certè duarum librarum pondus
excedebat . Sanguis verò effluxerat , aperto intrà
vestibulum venæ cauæ iuxtà dexteram auricu-
lâ foramine diametri vnciæ circiter vnus , quod
pau-

*Concreti sanguinis
copia intrà peri-
cardium .*

*Vena cauâ rup-
tura .*

paulatim ab erodente liquido factum fuiſſe in muſculari eiufdem textura planè indicabant ipſius oræ , quæ non in fimbrias , ac lacinias ſolutæ , ſed veluti per limam omninò expolitæ obſervabantur . Quominùs autem ſanguis multò priùs intrà pericardium exundaaverit , impediuit forſitan ſubtilis illa, in quam muſcularis deſinit, tunica, quæ, hiatui ſuper extenſa, egreſſum claudebat , cuius tunicæ tenuata fragmenta ad vlceris extrema videbantur pendere.

IV. Seçto tandèm cranio niger ſanguis ex vulnerato fortè fortunâ poſteriori ſinu duræ meningis largè profluxit; quod genus magnâ pariter copiâ in lateralibus ſinubus continebatur . Ventriculi cerebri limpidò tumebant ſero , quod ad principium ſpinalis medullæ redundauerat.

SCHOLIVM.

A

Deò perſpicuè patet natura, & vis lethalis mali, quo hic homo ſubitò deceſſit , vt nullo penè commentario indigere videatur .

Etenim , cum integritas, & continuitas magnorum ſanguiferorù ad vitæ conſervationẽ omniù maximè ſit neceſſaria; mirum proculdubio videri non debet, ſi, ad eò enormitèr dilatatâ arteriâ magnâ, & abruptâ repentè continuitate, & integritate ſummi caudicis venæ cauæ , fluxus ſanguis-

guinis a venis in cor , atque a corde quaquauerfum vnâ cum vitâ illicò in exposito sene defecerit.

Præcordiorum aneurysmata sæpè ab vniuersali arteriarum spasmò incipiunt .

Clariora præfati morbi indicia .

II. Possem hîc de ortu , ac discriminibus aneurysmatum plura differere ; sed , quia nunc scholiorum breuitati studendum , aptiorem illis locum , volente Deo , tribuemus . Id verò crebra experientia nos edocuit , aneurysmata præcordiorum apud Ægros , erodentibus ichoribus refertos , plerunque incipere ab vniuersali quâdam spasmodica arteriarum affectione , quæ postremò in corde , aut summis vasis determinatur . Quo fit , vt primùm de vaga , atque hûc illûc per collum , & artus errante arteriarum palpitatione conquerrantur . Deindè intrâ pectus malum sistitur , sæpè tussis vrget , cor salit , & grauius pulsatur , mòx sepultus , ac breui fugitiuus corripit dolor , qui postea pertinaciùs hæret , & modò ad alteram scapulam , clauiculamue , modò per brachium , quandoque vsque ad cubitum propagatur . Tandèm profunda persentitur pulsatio ; eleuantur alicubi costæ , aut sternum ; cæteraque succrescunt graua , & prorsus miseranda atrocis huius mali phænomena , quæ vt plurimùm subitâ morte finiuntur .

III. At verò , quanquàm omnia , & singula symptomata , quibus hîc homo suorum initio malorum tentatus fuit , & an eadem

ve-

vexauerint , quæ superius exposuimus , noscere minimè potuerimus : attamen qualiscumque morbi progressus , quem ab illius familiaribus sedulâ inquisitione comperimus , atq; extispicio præfiximus , satis ostendit , eiusdem corpus , podagrâ obsessum , acribus , pungentibusque ichoribus (vt vel cystica bilis argumento fuit) redundauisse ; qui sanè ichores , cum per biennium ante illius mortem subsistere cœperint in præcordijs , tussim excitarunt , & paulatim , comitantibus doloribus , pondere , atque anhelitu , intrâ substantiam tendineam aortæ , simulque muscularem venæ cauæ intercepti fuerunt , quibus in locis verosimile est primùm irritationem , & conuulsionem cum cordis palpitatione , deindè verò istorum etiam canalium exesione , tandèmque productam fuisse diloricationem , in qua vera aneurysmatum natura consistit .

*Aneurysmatum
natura in quo con-
sistat .*

IV. Si quis autèm diligenter animo teneat , arteriam magnam , & venam cauam in Ægro incurui habitus ob artem sutoriam , angustiori situ , quàm humani corporis ferat constitutio , coerceri ; fortè causam inueniet , cur initio morbi sanguis maiori nisu ob tussim exagitatus , prædicta sanguifera vasa vehementiùs distenderit . Deindè quomodò per impetum reciprocati sanguinis minimo negotio haberi potuerit intrusio , & mora perti-

Ars Sutoria quomodò infirmis præcordiorum vas contulerit .

*Artifices seden-
tarii Cur rarò sani
conſeſcant.*

nax ſalino-erodentium ichorum intrà fibras eorundem canalium . Rarò enim qui ſeffilem, incuruamque ducunt vitam , ſi vitioſis redundant ſuccis , abſque inſigni aliqua pulmonum, cordis , aut magnorum vaſorum labe conſeſcant .

*Ex aneurysmatum
folliculis Sani ei ef-
fuſio .*

*Cauæ eroſio quo-
modo inducta .*

V. Et quoniàm nigræ quædam ſtriæ ab aneurysmatis fundo ad cordis baſim intrà pericardium apparuerunt ; dubitandi anſam nunc, præbent ſubtilem , acremque ſaniem (quam aneurysmaticus quiſque folliculus perpetuò fundit) ſenſim ſupra Cauam diſtillaſſe , vt illius magnam eroſionem ſaltem accelerauerit ; præſertim cum Aorta iſto in homine , vt dictum eſt , ex inflexo , ac dilatato trunci ſitu neceſſariò magis appropinquauerit ad Cauam : quo factum fuit , vt affectiones vtriuſque ſanguiferi ferè per contactum adaugeri mutuò potuerint .

*Frequens Cordis
palpitatio, & ver-
tigo vnde .*

VI. Non admodum hîc laborabimus in exponenda cæterorum ætiologia ſymptomatum , quæ ſutorem hunc ante mortem maximè exercuerunt ; cum abundè ex legibus motûs ſanguinis euadat perſpicua . Etenim , vt recurrens cordis palpitatio procedebat ex reflexione motus ſanguinis ab Aortæ aneurysmate verſus cor ; ſic frequens vertigo , & capitis excalefactio ex impedita identidèm traiectione ſanguinis a caua intrà dexterum cordis ventriculum proficiſcebantur . Sanguis enim ,
qui

qui a cerebri sinubus in iugulares, & Cauam, indeque intrà cor, solutè, ac liberè in homine valente, atque incolumi, motus fuisset; in casu nostro ab erosâ, suisque propterea viribus enervatâ Cauæ texturâ, per cordis itinera nonnisi ægrè vrgeri poterat; ac propterea idem sanguis, maiori sæpè sæpiùs quantitate intrà Cauam collectus, impedimento erat, quominùs subsequiturus e iugularibus venis, sinubus duræ matris, ac cæteris capitis sanguiferis, liberè descenderet. Vndè quemadmodum ex maiori ignearum particularum per minima cerebri diffusionem, inæqualique irritatione, & pressione; calor, ac vertigo contingebat; ità ex intercepto eodem tempore motu sanguinis e Caua in Cor, præceps virium lapsus oriebatur; cuius certè deliquij causam, quam aliam quæremus? cum in promptu sit, Cor inter duo positum fuisse aneurysmata, Cauæ nimirum, quod sanguinem frequenter eidem subtrahebat, & Aortæ, quod illud identidem in cor repellebat? Quæ sanè res in causa fuit, vt sanguis in cerebro etiam remoratus, ex dissecto duræ matris sinu largè pròfluxerit. Neque aliundè petenda est ratio inuentæ serositatis intrà cerebri ventriculos, quàm ex summa plexuum turgentia, ac distensione, cuius vi, diductis, ampliatisque poris tunicularum vascula comprehendentium; subtilis percolatio feri, veluti per manicam. Hi pocratis, habita est.

*Quare præceps
virium lapsus.*

Cor duo inter aneurysmata locatum.

Ff De-

a In coac.

Vnde repentina
mors.

VII. Denique repentina mors, quam
(a) Hipp. prædixit Senibus, quibus cordis dolores
sæpius consuefcunt, tribuenda esse videtur subitæ
ruptioni tuniculæ illius, quæ, cauæ foramen te-
gens, cruoris effluxui renitebatur. Sanguini verò
duplex consociata probabilitèr vis nouissimè
accessit, scilicet erosiua ex falfamentis, per
dimidium quadragesimæ ingurgitatis, & ex-
trusiuâ, seu distractiuâ ex hausto tandem
meraco. Vndè iunctis cunei, & vectis viri-
bus in sanguine, tenuissimum illud membra-
næ repagulum cedere coactum fuit; vitæque,
fluente cruore de Caua in pericardium, il-
lico recessit.

b De morb. peft.
tit. de inter. puls.

c Lib. 9. quest. 18.

Similis historia ex
Laurentio.

VIII. Neque sanè huiusmodi mortis ge-
nus nouum erit ijs, qui in medicarum hi-
storiarum lectione versantur. Prostant enim
similia exempla apud (b) Bellinum, aliosque,
vt nostra nunc taceamus. Sed vnum legimus
descripto casui ferè tam simile, quàm ouum
ouo apud (c) Andream Laurentium in Æquite
Guicciardino Legato Magni Ducis Heturriæ
ad Regem Gallorum, qui, tametsi cum Ma-
gnatibus quibusdam obambulans, familiari-
tèr colloqueretur, subitò respiratione, pulsu,
& vitâ priuatus cecidit; cuius in cadauere in-
uentum fuit venæ Cauæ ostium disruptum, &
Arteria magna ita dilatata, vt brachij am-
plitudinem æquaret. Sed hîc demirari satis
non possumus, quomodò insignis adeò Ana-

tomicus miratus fuerit , quòd nulla externa
causa ad Cauæ disruptionem accesserit ; per-
indè quasi internæ , vt passim videmus , fa-
tis esse non potuerint .

*Causa internæ ad
vasorum disraptionem
solæ sufficiunt*

F I N I S.

Lectori suo .

HActenus pro viribus nostram fidem persoluimus . Speramus interea , vt , quæ non minùs celeritèr , intèr occupationes nostras , quàm candidè scripsimus , ab æquis , ingenuisque Lectoribus , ad Reipublicæ vtilitatem , ad quam studia nostra direximus , perhumanitèr referantur . Huic verò labori , inchoato in Ædibus Vaticanis medio Ianuario , supremam imposuimus manum in Ædibus Quirinalibus ipsis Kalendis Nouembris eiusdem anni MDCCVI. Augustissimis nobis fauentibus auspicijs S. D. N. CLEMENTIS XI. PONTIFICIS verè , inter Optimos , Maximi .

I N D E X

Rerum, & verborum, quæ in hoc opere continentur.

A

A Edominis tensionem enervantia. pag. 135.
Abscessus polypeus meningum. 37.
*Acicula sub vnguibus adacta apople-
 ticos excitat.* 134.
Aequinoctia apoplexiarum feracia. 84.
*Aer vnum ex tribus fluidis maioris
 vsus.* 14.
 — sanguinem fecundat. 44.
 — in conclavi calido, mortiumque
 cacuminibus sanguini premendo est
 insufficiens. 17.
 — ad subitam necem diuersimodè
 concurrat, 43.
 — eius in pulmones ingressus variè
 inhibitus repentinæ mortis causa. 26.
 — pòdus vel moles nimium aucta, aut
 diminuta subitæ necis causa. 16. 17.
 — in fodinis metallicis ponderosus,
 & lethifer. 17.
 — qui prauus dicitur, iuxta corpo-
 rum dispositiones noxiam infert. 17.
 — externus cum interno æquilibra-
 tus mortem infert repentinam. 27.
*Aeris probi mutatio in deleteriũ mor-
 tifera.* 69.
 — motus vehemens vasorum ruptu-
 ram cur acceleret. 97. & seqq.
 — virus in hac romana constitutione
 non vnice culpandum. 113.
 — eius tamen intemperies quomodo

subitæ morti contulerit. 115.
Agyrta cur vitandi. 32.
*Aloetica phlegmaticis congestionibus
 curandis opportuna,* 103.
*Amara præseruant a spasmis ex mate-
 ria viscida.* 100.
Aneurysmata quid. 223.
 — sub varicum nomine comprehen-
 dit Hippocrates. 97.
 — præcordiorum sæpe ab vniuersali
 arteriarum spasmò incipiunt. 222.
 — interna quosnam citius peri-
 mant. 78.
 — ex horum folliculis sanies effun-
 ditur. 224.
 — horum prophylaxis, quæ secu-
 rior. 224. & seqq.
*Animalia in machina boyliana cur
 moriantur.* 16.
*Animalium perfectorum vita in quo
 verè consistat.* 3.
*Animi deliquia inter signa corrosionis
 magnorum vasorum.* 11.
 — vt subitam mortem præfagiant,
 quid opus sit. 75.
*Animi passiones solida debilitando,
 mortem improvisam accersunt.* 15.
 — spirituum excursus ad præcor-
 dia perturbant. 22.
 — cur sint lethales. 19. 40. 41.
*Animi tranquillitas, & diæta ad su-
 bitam mortem auertendam ex sacr.*
 Pag. 105.
Anni quædam tempora noxia. 68.

- etiam ex Hipp. 69.
Aorta compressa, cordis rotunditas. 212.
 — eius aneurysma. 219.
Apoplexia ex epilepsia cur, & quando. 23. 24.
 — epileptica ex animi passionibus. 41.
 — ob vasorum thoracis interceptionem. 200.
 — eius potior causa non est lymphæ in cerebri sinibus collecta. 20.
 — a frigidis succis raro procedit. 137.
 — aliquando ob hæmorrhoides suppressas. 142.
 — raro præhendit absque præiis signis, & quæ sint. 48.
 — inter morbos huius constitutionis. 43.
 — hac correpti, vid. præfocati.
 — in senibus quædo inuincibilis. 47.
 — pulmonum mortifera. 65.
Apoplexiæ præservatio Romæ. 101.
 — eius curatio quibus remediis tractanda. 134.
 — non semper calefacientibus. 136.
 — per inediam curata apud Hippocratem. 48.
Aphonis sublingualium incisio prodest. 129.
 — eius rei experimentum. 140.
Aquea vitia in spasms hypochondriorum. 99.
 — in salinis pectoris congestionibus. 100. 103.
Arcanorum abusus in medicina. 31. 32.
Aristoteles de Vita obscure sensit. 2.
Ars Naturæ opera imitatur. 3.
Ars sutoria, vide sutoria.
Arteriæ carotides vid. carotides.
Articuli pulmonum vid. pulmonum.
Artifices sedentarii cur raro consenscant. 224.
- Artuum sphacelatorum amputatio quandoque subito interficit.* 41.
Aspera arteria, vid. trachea.
Asthma convulsivum quando mortiferum. 68.
Athletæ quomodo, & quando repentinis mortibus corripiantur. 78.
 — quomodo a subita nece præservandi. 90.
 — bis quando imperanda exercitatio. 91.
 — iisdem stomachus validus obest. ib.
Audacia, vide timoris.
Auri tinctura absque menstruo corrosivo laudatur. 137.
Auster, & Aquilo noxii ex Hipp. 116.
 — ille Romæ deterior. ibid.
Autumnale æquinoctium phthysicis mortiferum. 80.

B

- B** *Agilius laudatus.* 216.
B *Balnea aquæ dulcis in calida paralyti.* 154.
Balneum frigidum post corporis calefactionem repentinæ mortis causa. 19. 20.
 — eius usus in spasms a materia subtili. 99.
Bernabeus Phiscus nominatus. 128.
Bernardini Medici mentio. 141.
Biliariæ vesicæ pus, & ulcera in caduere observata. 177.
 — mala ab his producta. 180.
Bilis vitia multorum pectoris morborum radix. 184.
Bonum nullum in terris absque mixtura mali. 125.
Brutorum mors repentina quandoque ex causis vniuersalibus. 111.

C

C Adanerum frequens sectio magna utilitatis. 77.

— quales internæ læsiones inueniendæ sint cautè a Medicis prædicendæ. 179.

Cadaverum fætor signum mortis certissimum. 54.

Calcis effluvia nocua. 149.

Camphorata in spasmo pectoris. 100.

Capitis vulnera, vid. vulnera.

— levis contusio & c. sæpè funesta, & cur. 34.

Carbonum fumus, vid. fumus.

Cardica in spasmis pectoris quomodo vsurpanda. 100.

Cardiogmos quando mortem repentinam portendat etiam ex Hipp. 74.

— rationes adducuntur. ibid. & seq.

Carotides ad explorandum superstitem pulsus cur aptiores. 59.

Catarrhus suffocatiuus. 65. & seq.

Causæ subitanæ mortis quot, & quales. a pag. 13. vsq; ad 42.

— semper cum tempore operantur. 13.

Cerebri structura, eiusque viarum libertas ad vitam necessaria. 33.

Cerebrum per nervos cor, & thoracem mouet, & vicissim mone-

tur. 4.

— est vnum ex tribus solidis maioris vsus. 14.

— eius hemisphæria an e directo corporis partibus respondeant. 169.

— per decussim respondere probatur. 170. & seq.

— horum subita, & constans læsio mortem repentinam accersit. ibid.

— eius lenta congestiones repente tandem ingulant. 35.

— corticalis substantia polypea. 37.

— vasorum turgentia quomodo dignoscatur. 154.

— spasmus quænam indicent. 211.

— eius, & tordis læsio respirationis causa, & contra. 44.

— eodem conuulso, serum in eius sinibus tanquã effectus reperitur. 20.

Chalybeata, vide Martialia.

Chocolata pro causa grassantis repentinæ mortis perperam adducta. 113.

— est probi nutrimenti. 119.

Ciborum indigentia, vide indigentia.

Circulatio in præcordiis duplici ex causa intercepta. 201.

Circulationis in cerebro inæqualitas ob sanguinis vitium. 157.

— ab Hipp. indicatur. 158.

Coffè potus in congestionum cura. 103.

Congestionum curatio Medicum exigit omnino prudentem. 102.

Conuulsio vasorum quomodo contingat. 203.

— eius causa experimentis roboratur. 213.

Conuulsiones pertinaces ad subitam mortem sunt viæ. 96.

— ipsarum curatio extrâ parosysmum. 152.

Cor suis vasis est vnum ex tribus solidis maioris vsus. 14.

Cordis congrua structura ad vitam necessaria. 28.

— etiam systole, & diastole, 30.

— eius, & vasorum vis circum-

pulsiva rationem habet ad determinatam sanguinis molem, & gravitatem. 20.

— eadem a structura, fluidisque nerueo, & sanguineo pendet. 28.

— ideo ab istorum fluidorum defectu, aut vitio labefactatur. ibid.

— conuulsio, obstructio & c. mortis causa.

- causa.*
 — *morsus a vermibus.* 29.
 — *dolor pertinax in senibus extialis.* ibid.
 — *huius rei ratio.* 31. 74.
 — *an in pectoris convulsionibus cor compatiatur maximè observandum.* 75.
 — 100.
Cordis motus in pseudo-mortuis quina. 54.
 — *sepultus quid indicet.* 56.
 — *in pseudo-mortuis quomodo perquirendus.* 58.
 — *paralysis futuræ indicia.* 72.
 — *palpitatio qualis plùs, minùs perniciofa.* 73.
 — *eadem cum sterni dolore sepulto.* 218.
 — *cum vertigine vnde.* 224.
 — *prodest urina stranguriosa.* ibid.
Cordis sarcomata in semilunaribus valvulis. 162.
 — *vitia diuersa ab Autoribus notata.* 166.
 — *ingens amplitudo.* 178.
 — *a Marchetto etiam inuenta.* 195.
 — *magni, & prolabentis supra diaphragma symptomata.* 185.
 — *eius rigiditas in cadauere.* 209.
 — *immobilitas ex aortæ compressione.* 212.
 — *idem cor inuentum inter duo aneurysmata.* 225.
Cornacchini pulueris vsus in subitaneis morbis. 147.
Corpora repentinè morti subiecta multiplicitèr considerata. 84.
 — *bene nutrita phlebotomiam cur felicitiùs fuerint experta.* 129.
Corporum varia dispositio aeri noxio diuersimodè resistit. 17.
 — *post eorum excalefactionem frigide potus, & balneum cur lethi-*
fera. 19. 26.
Corrosio lenta sanguiferorum valetudinarios sæpè detinet. 96.
Corrosionem magnorum vasorum quam præcedant. 11.
Corticis peruiani vsus in præseruatione a spasmo. 100.
 — *cerebri pars dextera flacida recepta in quodam cadauere.* 160.
Cranij foramen, vide foramen.
Cranio desquammato, cerebrum faciliè afficitur. 184.
Crisis suppressa, vbi subitam mortem præfagiat. 79.
Cursorum præcordia cur faciliè labefactentur. 189.
Cyatus supra Xiphidem positus ad explorandum an verè quis mortuus. 57.

D

- D* *Ecoctiones vulneraria, vide vulnera.*
 — *exiccantes dictæ in apoplecticis sæpè noxiæ.* 137.
Deliquia animi, vide animi deliquia.
Diabeticorum renes flaccidi, ac distiles. 214.
Diaphragmatis vulnera, vide vulnera septi &c.
 — *lesio tussim siccam excitat.* 36.
 — *qualis motus in pseudo-mortuis.* 56.
 — *idem quomodo perquirendus, vide cyatus.*
Dieta athleticis necessaria. 90.
 — *exiccaus obesis iungenda.* 93.
 — *præseruatiua in aneurysmatibus ex Hipp.* 97.
 — *cur in his tantopere commendatur.* 98.

- in Epilepsia idiopathica 101. & seqq.
 — pro praeservatione a subito interitu . 105.
 Dieta animi tranquillitas iungenda ex diuino Oraculo . ibid.
 Diluentia temperata ab Hipp. quandoque laudata . 136.
 Disruptio vasorum non a solis externis causis excitari potest contra Laurentium . 227.
 Dinities a moribus repentinis praepauperibus cur felicius euaserint . 119.
 Dolores diurni circa cor &c. quid indicent . 11.
 — interni pectoris quinam lethales . 66.
 — laterales quosnam morbos arguant . ibid.
 — in spasmodicis affectibus quid admittant . 100.
 — vagi externarum partium quando lethales . 150.
 Doloris in syncipite , & oculo sinistro causa in opposito latere delitescens . 37.
 Ducie in spasmis a tenui materia pendentibus . 99.
 Dura matris morbofa contractio in caduere . 160.
 — notabilis laxitas . 181.
 — paralysis . 182.
 tium constitutio . 121. & seqq.
 Epilepsia cessante, cur interdum mortifera corripit apoplexia . 24.
 Epilepsia pertinax cur frequenter in apoplexiam transeat . ibid.
 — quomodo contingat . 23.
 — hac correpti ; qui repente decedant . 85.
 — in idiopathica abstinendum a vino . ibid.
 — in sympathica tam vomitus, quam purgatio conuenit . 101.
 Epileptica apoplexia , vide apoplexia &c.
 Esserarum repulsio aliquando mortifera . 176.
 Ethnicorum sententia de subita morte eligenda damnatur . 87.
 Euacuationes suppressae modò sunt signa , modò etiam subitae mortis causae . 81.
 — & contra . 82.
 Exercitatio Athletis quando imperanda . 91.
 — eius utilitas . 93.
 Exercitium vehemens vasorum rupturam promouet . 97.
 Experimenta Authoris de causis particularibus in singulis hoc anno morientibus . 113. & seqq.
 Extispiciorum utilitas, & cautela . 180.

E

- E** Missarii oclusio saepius subitae mortis praeludium . 81.
 — dum viget est medela . 84.
 Emplastica in spasmis a subtili materia ortis . 99.
 Emulsiones in spasmis pectoris . 100.
 Epicratica purgatio , vide purgatio .
 Epidemica non fuit praesens morien-

F

- F** Acies in Aegrotis iuxta cordis affectiones variè coloratur . 216.
 — cadauerum saepe Medicos erudit . 177.
 Facultas pulsua ad Vitam necessaria . 28.
 Febris quando subitam mortem posset auertere . 182.

Ferramenta ignita pedum plantis admota in forti apoplexia. 134.
Fibræ tendineæ, vide tendineæ.
Fistulis ani occlusis mors repentina quando. 81.
Fluida, & solida maioris usus animalium perfectorum Vitam constituent. 3.
— qualia sint. 14.
Fluxilitas summa sanguinis in cadauere. 208.
— raro inuenitur. 211.
— cur acciderit in nostro casu. 212.
Fœminæ in hac mortifera constitutione maribus feliciores, 119.
— rationes adducuntur. 120.
Fonticulorum occlusio sæpius mortis signum, quàm causa. 81.
Fonticulus vtiliter excitatus. 175.
Foramen cranio forsan innatum. 178.
— quomodo infirmandæ duræ matri contulerit. 183.
Frigidæ potus quando, & quomodo subitæ necis causa. 19. & seqq.
Frontis venarum incisio in præsenticonstitutione vtilis. 127.
Frumenti corrupti exhalationes cur pestiferæ. 17.
Fumus carbonum aerem ad necem usque inquinat. ibid.
— ex eodem tracheæ color vitiat. 195.
Funerum opparatus tardi cur inueni. 52.
Fungi Melitensis vis vulneraria. 99.

G

G *Attuccius Physicus allegatus* 155.
Gaudio subito perculsi cur interdum repente concidunt. 19.

Glandula scirrrosa sub cerebello cur subitam mortem asciuerit. 39.
Glandularum racemi ad sinus duræ matris obseruati. 160.
Glandule vberius liquida secernentes cur enadant graciliores,
& è conuerso. 171.
Graciles cur rariùs repente moriantur. 79.
Gummosa in phlegmaticis congestionibus curandis. 103.

H

H *Æmorrhagia quando sit subitæ necis præsagium.* 77.
— larga in quodam sene vtilis. 132.
Hæmorrhoides senum suppressæ aliquando subitæ mortis præludium. 80.
— iisdem resistentibus fortis apoplexia. 142.
— arte reuocatis, morbi solutio. 143.
Hemisphæria cerebri, vide cerebri & c.
Hepatis tumor folliculatus tussim siccam excitabat. 36.
— abscessus post interimentia capitis vulnera. 86.
Herbarum epicerausticarum usus. 103.
Hirudines naribus quando applicandæ. 154.
Hispanicum vinum septentrionalis ventus glaciatur. 17.
Homo grauius, & frequentius agrotat, quàm bruta. 87.
Hydatidis insignis in pia meninge. 38.
Hydrops pectoris repentinus cur aliquando ex tempore perimat. 26.
— ex causæ ligatura ortus. 203.
Hypochondriorum succi præcordijs, & cerebro sæpè mortiferi. 20.
— qua via ad has partes ferantur.

tur. 144. 151. 204.
 — conuulsiones eliminantia. 99.
 — tensioni quomodo succurrendum. 151.
Hystericis paroxysmis solum tempus quandoque medetur. 48. & seqq.

I

I Ntemperantes &c. in presenti constitutione repente sublati. 114. 120
Inuincibiles repentine mortis cause quales. 46.
Indicum cautela aduersus simulatos mortuos. 51.
Iugularium incisio in hac constitutione cur proficua. 128.
 — cerebri, & præcordiorum morbos leuat. 129.
Iuris longi vsus. 136.

L

L Aëtis vsus in spasms a tenui materia. 99.
Lamella ossea in aneurysmate. 219.
Lamina ignita pedibus admota in forti apoplexia vtilis. 135.
Lana naribus admota ad dignoscendum an quis mortuus. 56.
Latex a cadaveris pulmone compresso manans. 199.
Latinus Physicus carcerum. 176.
Liquida quædam morbose per secernicula naturalia ægrè secedunt. 145.
Liquidi impetus, vide impetus.
Liquidorum magna vitia solidis exitilia, & contrâ. 45.
Loquela post raninas incisas restituta. 141.
Lympha in thorace aut cerebro collecta

non semper morbi, aut mortis causa. 20.
Lymphatica pia matris varicosa. 36.
Lymphaticorum internorum ruptura quomodo præcauenda. 98. & seq.
Lympha congestio in spasms pectoris quibus auertenda. 100.
 — conrescentis causa ex Chymicis. 194.

M

M Ala, quæ mortem præcedunt diligenter inuestiganda. 179.
Manfredus inter Romanos Medicos, laudatur. 141.
Mares in hac constitutione fæminis deterius habuerunt. 119.
Marmotana, vide muris montani.
Marsialia in præseruatione a spasms ex materia viscida. 100.
Mechanicam in Medicina primus inuenit Hippocrates. 3.
Medici spes in hystericis paroxysmis qualis. 49.
 — prudentia, & fama in scientia prædicendi. 61. 86.
 — ingens labor in curandis solidorum morbis. 154.
 — cautela in prædicendis internis cadaverum lesionibus. 179.
Medico astronomica, vide observationes
Medicus in diuinando sit peritus ex Hippocrate. 84.
Meningum, & corticis cerebri motus ad Vitam necessarius. 33.
 — ex horum constanti lesione mors citissima. ibid.
 — compressis nervis ad has partes tendentibus idem euenit. 39.
 — conuulsio in epilepsia idiopathica duplici de causa contingit. 23.

- motus multipliciter ablati. 40.
 — abscessus polypeus. 37.
 Menti, & sensibus non omnia innotescunt. 54.
 Mistichellus Physicus laudatus. 134.
 Morbi externi diuturni cur valetudinarijs sæpè proficui. 103. & seqq.
 — ex loco tantum differunt. 144.
 — ipsorum occasiones perpendendæ ex Hipp. 155.
 Mors quid sit. 8.
 — eius diuisio, & natura. 9.
 — etsi indiuidua in plures tamen vulgò distinguitur. 5.
 — variæ eius species multipliciter considerandæ. 6.
 — eius varia discrimina Moralistis ad corrigendos mores hominum utilia. ibid.
 — inopinata a probis Viris non exoptanda. 88.
 — naturalis accidit decreptis æquè ac iuuenibus languidis. 9.
 — subita ex obstructione, compressione &c. cordis, & vasorum. 29.
 — quibus potissimum accidat. 64.
 — quolibet est repentina, & cur. 5.
 Mortis idea ex Vitæ notione desumenda. 1.
 — differentia vnde petenda. 7.
 — sunt duplicis generis. 14.
 — causæ in repentina semper cum tempore operantur. 13.
 — occasiones sæpè confunduntur cum causis, vide occasiones.
 — signum certissimum, vide fætor.
 Mortui simulati quomodo dignoscantur. 50.
 — repentiè tardiùs sepeliendi. 53.
 Mortuus a pseudo-mortuo quomodo distinguendus. 55. & seqq.
 Motus non vitales aliquando etiam in mortuis. 58.
 — cordis in pseudo-mortuis, vide cordis &c.
 Muris montani adeps ad paralysim. 140. & seqq.
 Mumia in spasms præcordiorum quomodo usurpanda. 101.

N

- N Arcoticorum vsus in spasms cum dolore. 99.
 Nasi mucus suppressus a calcis effluuijs. 147.
 — cruenta ab eodem filamenta per dentia interceptionis vasorum sunt indicia. 203.
 — venæ apertæ vtilis in hac constitutione. 127.
 — eidem [hirudines quando applicanda. 154.
 Nerveus succus vnum ex tribus fluidis maioris vsus. 14.
 Negligentia quandoq; superantur morbi. 46.
 Nervis propè iugulum ligatis, mors in cane ex Valsalua. 40.
 Nervorum discontinuatio cum cerebro insuperabilis causa repentinæ mortis. 47.
 — liquidi motus in pseudo-mortuis qualis. 54.
 — motiones sopitas excitantia. 60.
 — opticonum compressi vide optic.
 Nobiles huius constitutionis vim rari subierunt. 118.
 — contrarium accidit Leidenisibus teste Syluio. ibid.
 Nuccarinus Fulginei Physicus commendatus. 36.

- O** Befis repentina totalis vasorum intra cranium obstructio facilis. 39.
- cur præ gracilibus mors accadat improvise. 79.
- præservativa remedia qualia. 93.
- Observationes Medico-astronomicae utiles ad prædicendum. 85.
- Occasiones aliquando confunduntur cum causis subitæ mortis. 13.
- Odoramenta venefica aerem pestiferum reddunt. 17.
- Oleosa cum fluidis exhibita a quibus spasmi præservant. 100.
- in spasmi pectoris cum lymphæ congestione. ibid.
- Omenti loco nigra membrana in cadavere inuenta. 161.
- Opii vsti vis vulneraria. 99.
- Opticorum nervorum compressionem quam indicent. 85.
- Ordo animæ disciplinarum. 83.
- Oris ventriculi morsus a vermibus. 29.
- collutiones ex dissolventibus utiles in aphonis. 140.

P

- P** Accbionus Physicus laudatus. 37.
- Palpitatio, vide cordis &c.
- Pancreatis mollities excedens in cadavere. 208.
- Paralysis præcordiorum, vide præcordiorum &c.
- cordis, & arteriarum 29. vide etiam cordis.
- partium omnium intra cranium 181.
- post syncopē &c. opportuna. 153.

- ex inæqualitate circulationis sanguinis. 158.
- ex causa calida, curatio. 154.
- Paregorica in spasmi pectoris quando conducant. 100.
- Pasculus Physicus publicus Anatomæ Professor. 176.
- Pauli Sacr. Pal. Ap. Medicus. 176.
- Pauperes, vide Divites.
- Pectoris hydrops repentinus, vide hydrops.
- dolores, vide dolores pectoris.
- Penis est musculus. 215.
- rigidus in cadavere observatus 208.
- spuria erectio in cadavere quomodo excitetur. 215.
- Pericardij cum corde adhesio quibus familiaris. 165.
- Pericardium concreto sanguine plenum. 220.
- Periculum mortis quibus egris aperiendum. 65.
- Perspiratio in agentibus sessilem Vitam, cur, & quibus in partibus minor habeatur. 92.
- Pestes animalium particulares vnde 17. & seqq.
- Philosophia experimentalis illustratur etiam ijs, quæ successum non habuerunt. 7.
- Phthysicis quale æquinoctium magis lethale. 80.
- Physicis mortium varia discrimina quid suggerat. 6.
- Piæ matris lymphatica, vide lymphatica.
- Pierleonius Medicus allegatus. 143.
- Pillul. de succino Cratonis usus. 143.
- de spuma chalyb. 101.
- Placentius Medicorum Urbis senior in auctoritatem adductus. 113.
- eiusdem mentio, 141. 155. 176.

- Plethora nimia repentinæ mortis causa.* 19. & seq.
 — *oritur sæpè a stomacho valido.* 91
Podagra suppressa quinam morbi insurgant. 37.
Pondus aeris ex fodinarum effluuijs maius. 17.
Polypi acidis non alchalicis dissoluntur. 206.
 — *constructio in aneurysmate.* 219.
Præcordia in Cursoribus, vide Cursorum &c.
 — *ijsdem conuulsis feri effusio intrâ thoracem.* 20.
Præcordiorum labe a liene communicata. 201.
 — *aneurysmata, vide aneurysmata &c.*
 — *paralysis mortem infert insensilem.* 11.
 — *dilatatio morbose principijs hydrometricis illustrata.* 191.
 — *pertinax conuulsio postquam cessauerit cur nihilominus interdum mortifera.* 31.
 — *spasmus quæ signa indicent.* 211.
Præfocati aliquando naturaliter rediui. 46.
Præseruatiua methodus a subitaneis mortibus. 90. vsque ad 105.
 — *ex Christi Oraculo vera in tranquillitate, & sobrietate.* 105.
Prolabentis Cordis supra diaphragma modus mechanicus exponitur. 189.
 — *cû in isto casu palpitatio post cibum succedat.* 190.
Prolapsus cordis quandoque hydropem mentitur. 196.
 — *symptomata ipsum concomitantia.* 185.
Prudentia summa est necessaria in Medicina. 62.
 — *quomodo aquiratur.* ibid.
- Pseudo mortui difficulter a mortuis distinguuntur.* 53.
 — *quomodo tamen id assequimur.* 55. & seq.
 — *in his centrum diaphragmatis solum trepidat.* 54.
 — *cordis motus in iisdem qualis.* ib.
Puerperis mors repentina quando. 80.
Pulmonicæ venæ, vide venæ &c.
Pulmonum adhæsiō cum costis. 198.
 — *aliquibus fortè naturalis.* 205.
 — *latex ab ipsorum superficie manans.* 199.
 — *rigiditas in cadauere.* 209.
 — *apoplexia mortifera.* 65.
 — *eorundem articularum conuulsio.* 66.
 — *quosnam repente interimat.* 67.
 — *ex ea quinam diutius seruentur.* ibid. & seqq.
Pulsus in carpis deficiens non semper cordis motus cessationē testatur. 59.
 — *intermittens non semper funestus.* 71.
 — *Authoris experimento comprobatur.* 72.
 — *tardus quando exitialis.* ibid.
 — *aliquando ob tangentis incuriam mortuis attribui potest.* 60.
- Q**
- Q** *Perceat. antepilepticum medicamentum laudatur.* 154.
- R**
- R** *Aninis incis, vide loquela.*
Realis Sac. Pal. Apost. Medicus. 176.
Remedia mixta quando usurpanda. 103.
 Re.

Repentè mortui tardè sepeliendi. 53.
 — *quo morbo laborauerint maxime sciendum.* 173.
Repentinæ mortis idea. 11.
 — *species rara etiam ex Laurentio.* 226.
 — *causæ sunt duplicis generis.* 14.
 — *semper cum tempore operari solent.* 13.
 — *non omnes inuincibiles.* 46. 48.
 — *vincibiles ex medentium audacia, & naturæ vi quales.* 48.
 — *eadem mors a magna sanguinis diminutione.* 19.
 — *ex pertinaci eiusdem mora, aut impetu in præcordiis, & cerebro. ib.*
 — *ob spiritum spontè cohibitum.* 27.
 — *exesis parietibus cordis, & sanguiferorum.* 28.
 — *quomodo ex inflicto pugno sub Xiphoide.* 30.
 — *inhibito spirituum animalium influxu ad præcordia.* 34.
 — *a leui capitis contusione &c. ib.*
 — *cur in his præcedat rigor.* *ibid.*
 — *quomodo ex sternutatione contingat.* *ibid.*
 — *ex lentis in cerebro congestionibus.* 105.
 — *compressis &c. nervis etiam extra cranium.* 39. & seq.
 — *aeris, ac instrumentorum respirationis vitio.* 43.
 — *ob triplicem contemporaneum morbum.* 45. 216. & seqq.
Repentina mors quandoque grassatur in homines, & bruta, ex causis universalibus. 111.
 — *eiusdem causa in præsentia constitutione non vniuersalis, sed particularis fuit.* 112.
 — *idcirco non vnicum signorum genus præiuit.* 120.

— *cum ab vniuersali causa producitur eadè semper signa adsunt.* 121.
 — *ea grassante, ceteri morbi, & mortes, Romæ minùs frequentes.* 123.
 — *& contra.* 125.
De Rubeis Medicus nominatus. 143.

S

S *Alis vrinosi vim ad dissoluendum sanguinem.* 213.
Salsæ infusio in paralyti utilis. 140. 143.
Sanguis vnum ex fluidis maioris usus. 14.
 — *instar aquæ hydraulica machina moxetur, & mouet.* 3.
 — *quadrupliciter fit causa mortis repentinæ.* 19.
 — *intrà compressam arteriam violentè trusus cunei, & vectis potentiam induit.* 191. & seqq.
Sanguinis impetus aut mora pertinax vbi mortis repentinæ causa. 19.
 — *fluxus ad cerebrum interceptus subito interficit.* 21.
 — *missio parca in principio aneurysmatum laudatur.* 97.
 — *item in morbis capitis cum plenitudine.* 101.
 — *in hac constitutione profuit ex syderata etiam parte, & cur.* 127.
 — *ex ingularibus, & sublingualibus.* 128. & seqq.
 — *tollit vasorum interceptionem.* 130.
 — *Romæ non semper prodest.* 130. & seqq.
 — *quando omittenda.* 148.
Sanguinis coagulatio lacti coacto assimilatur ab Hipp. 117.
 — *hanc serositatum exundatio consequitur.* *ibid.*

- morboſa penetratio ad cerebri medullam unde. 215.
 — fluxilitas, vide fluxilitas.
 Sarcomata cordis, vide cordis &c.
 Saxus Phyiſicus Allegatus. 155.
 Secernicul. natural. vide liquida.
 Senes ſyderationibus ſunt ſubieſti. 83.
 — quando facile euadant apopleſti- ci. 75.
 Senſibus, & menti non omnia inno- ſcunt, vide menti.
 Senum tuſſis, vide tuſſis.
 — dolor cordis, vide cordis.
 — hæmorrhoides, vide hæmorrhoi- des.
 — iſdem bene nutritis phleboto- mia, ſalutaris. 132.
 Septi tranſuerſi vulnera, vide vulne- ra thorac.
 Septentrionalis ventus mortifer, vi- numque hiſpanicum congelians. 17.
 Sepulchrorum exalationes cur exitia- les. ibid.
 Serum lactis quibus ſpasmis confe- rat. 99.
 — cum infuſione radicis chinæ ubi uſurpandum. 104.
 Setonis uſus. 154.
 Simoncellus publ. Anat. Miniſter. 117.
 Sincipitis ſiniſtri dolor, vide dolor.
 Sinibaldus Protomedicus laudatus. 132. 155. 176.
 Sinifter cordis ſinus duplò maior dexte- ro. 187.
 — cur ſanguinis motus per hunc tardior fuerit. 192. & ſeq.
 Sobrietas Vitæ protrahendæ funda- mentum. 93.
 — aneurysmaticis [maximè condu- cit. 97.
 Solida, & fluida maioris uſus quomo- do animalium perfectorum Vitam conſtituant. 3.
 — utraque ſunt tria. 14.
 — ad interitū mutuo conſpirant. 25.
 — eadem ſtructura, vel motu per- tinaciter leſa ſunt mortis repentinæ cauſa. 26.
 — ipſorum vitia fluidis exitialia, & contrà. 45.
 Solidorum morbi difficilis ſunt curatio- nis. 154.
 Solſtitia apoplexiarum feracia. 84.
 Spasmi peſtoris quomodo ſint tractan- di. 100.
 Spasmiſ a materia ſubtili productis quomodo ſuccurrendum. 99.
 — a materia viſcida aliter tractan- di. 100.
 Spasmiſ uniuerſalis a meningibus. 212.
 Sphacelati artus, vide artuum.
 Spiritus in homines ſumma neceſſi- tas. 26.
 — ſpontè cohibitus ſubitæ mortis cauſa. 27.
 Spiritus dictus vitæ quid, eiſque uſus. 140.
 Spirituum defectus mortalis ex varijs cauſis. 21.
 — copia quomodo exitialis. 22.
 — item acrimonia. ibid.
 — vitium ab aere hauſtum. 24.
 — animalium deſcenſus ad præcor- dia inhibitus ſubitæ, mortis cau- ſa. 34.
 Sterni dolor ſepultus &c. 218.
 — pars dextera elatior inuēta. 119.
 Sternuentibus mors ſubita. 34.
 — mos præcandi ſalutem unde. 35.
 Sternutatoria acria pro ſepulta reſpi- ratione excitanda. 56.
 Stibiata in thoracis ſpasmis quando conueniant. 101.
 — in curatione phlegmaticarum congeſtionum. 103.
 ſi-

Stibij diaph: vsus ad aphoniam vtilis. 140.
Stomachus validus cur interdum plethoricis infensus. 91.
 — debilis quomodo ad protrahendam vitam conferat. 99.
 — ad eius languorem ius appropriatum. 147.
Succinata in thoracis spasms. 100.
Suffocatio inter morbos huius constitutionis. 43.
Sulphurata in spasms pectoris. 100.
Sutoria ars in firmandis præcordiorum partibus conducit. 223.
Syderationis origo interdum a corde eiusque vasis. 217.
 — nomine quid comprehendat Hippocrates. ibid.
Syncope ex cordis, & arteriarum paralyfi. 29.
 — morbus huius constitutionis. 43.
 — hac correpti, vide præfocati.
 — ab erosione &c. est inuincibilis. 47.
 — eiusdem recursus. 151.
 — vitio valvularum cordis observata. 168.
Syncope lethalem ex obstructione &c. quanam præcedant. 11.
Synopsis particularis mortiferae causæ mixta. 182.
 — periculum detractum. 153.

T

T*Abaci vsus non fuit in causâ gastrantium repentinæ mortium.* 112.
Tabidis &c. cordis cum pericardio ad hæsiō familiaris. 165.
Taciturnitas quid indicet. 152. 154.
Temperati mortem repentinam hoc au-

no non subierunt. 118.
Tendineæ fibræ pulmones costis colligantes. 198.
Terræ motus pro causa huius mortiferae constitutionis falsò accusatur. 113.
Thè in congestionibus curandis. 103.
Thomassinus Protho-Medicus allegatus. 176.
Thoracis vasis interceptis, apoplexia succedit ex Mart. & Fracass. 200.
Therebentinata in spasms pectoris cum lymphæ congestionem. 100.
 — in curatione congestionum. 103.
Thoracis vulnera, vide vulnera thoracis.
 — in spasms quid observandum. 100.
Timidi quomodo a subita nece præcavendi. 94.
 — subito percussi interdum repente concidunt. 19. 20.
 — ipsorum cerebri constitutio qualis. ibid.
 — phlebotomia quando conveniat. ibid.
Timoris, & audaciæ causa in solidis partibus. 76.
Tracheæ vitio subita mors variè contingit. 26.
 — color fulgineus, vide fulgineus.
Trullus Physicus laudatus. 37. 147.
Tuberculo apparente ad exteriora pectoris, & cerebri, quorundam symptomatum alleviatio. 155.
Tuberculum pulmonis sepultum quomodo dignoscatur. 66.
 — de ipso quando dubitandum. 100.
Tussis sicca ex diaphragmatis labe. 36.
 — cum fœtore quid indicet. 67.
 — diurnæ humidæ in siccam conversio in senibus exitialis. 65.
 — suffocativa quomodo. ibid.

V

- V** *Valetudinarij alij interni, alij
externi agrotant.* 95.
 — *triplex affectionum genus eos ad
subitam necem disponit.* 96.
 — *quomodo ab eadem præseruan-
di.* 104.
 — *in præsentì constitutione subitò
periere.* 114.
*Valetudinarijs diuturni morbi externi
sæpè conferunt.* 103.
 — *mors subita fuit Romæ instar ma-
le crisis.* 114.
*Valsalua Anatomicus Bonon. lauda-
tur.* 157. 169.
 — *eiusdem experimentum nobile.* 40
Valvularum semilunarium sarcomata
 162.
 — *a nemine indicata.* 166.
 — *productio quomodo enenerit.* 167.
 — *usdem durantibus, quomodo pul-
sus æqualis esse potuerit.* 168.
 — *quomodo syncopem sollicitave-
rint.* *ibid.*
Varices in pulmone cadaueris. 161.
 — *pro aneurysmatibus accipit Hip-
pocr.* 97.
 — *internæ cognitu difficiles.* 63.
 — *lymphaticorum pie matris.* 36.
*Variolarum retrocessio quando morti-
fera.* 80.
*Vasorum magnorum corrosionem quid
præcedat.* 11.
 — *structura, & libertas ad vitam
necessaria.* 28.
 — *convulsio, compressio &c. mor-
tis causæ.* 29.
 — *interceptio, vide interceptio.*
 — *debilicentia in ascite.* 205.
 — *disruptio, vide disruptio.*
*Vasorum, & cordis vis pulsua deter-
minata moli, & gravitati sangui-
nis proportionalis.* 20.
Venæ pulmonicæ dilatatae indicia. 66.
 — *rupturam quanam præcedant.* 67
Venæ causæ ruptura. 220.
 — *corrosio quomodo induta.* 224.
*Venetijs olim repentinæ mortis grassa-
tæ sunt.* 112.
*Ventriculi vitia cerebro, & præcor-
dijs communicata.* 20.
Ventus interdum mortiferus. 17.
Venus in senibus perniciofa. 22.
*Vermium morsus quomodo mortem in-
ferat.* 29.
 — *in ipsorum suspitione quid agen-
dum.* 100.
Vertigo tenebricosa. 218.
 — *cum palpitatione cordis unde.*
 224.
*Vesicantia sunt emissaria artificia-
lia.* *ibid.*
 — *ipsorum usus, & utilitas.*
 133. 143.
 — *quid excitent.* 145.
*Veternus larga hæmorrhagia in sene
sanatus.* 132.
Victus plenus ubi noxius. 146.
Vini abstinentia Athletis necessaria.
 91.
 — *itè in Epilepsia idiopathica.* 101.
*Viperata in præcordiorum spasms quan-
do præscribenda.* *ibid.*
 — *valetudinarijs præservandis.* 104.
Virium præcept lapsus. 225.
Vis movens ad vitam necessaria. 28.
*Viscerum vigor confert ad morbos ad
exteriora detrudendos, & cōtrā.* 157.
*Vite notio veram mortis ideam exhi-
bet.* 1.
 — *de hac Aristoteles obscure scri-
psit.* 2.
 — *universalis conceptus unde.* *ib.*
 — *tria sunt necessaria ex parte*
cordis

- cordis, magnorum vasorum.* 28.
Vita in animalibus perfectis in quo consistat. 3. & seqq.
— longa ob sobrietatem. 93.
— sepulta in morientibus quomodo excitanda. 59.
Vomica pulmonum, vide pulmonum.
Vomitus in epilepsia sympathica excitandus. 101.
— quibus proficius. 136.
Vrina stranguriosa in palpitacione salutaris. 73.
— quando dubia. 152.
Vteri convulsionum medela. 99.
Vterus quomodo labem mortiferam in præcordia, & cerebrũ suffundat. 20.
Vulnera circa ingulum cur lethalia. 21.
- thoracis, & septi simul transversi quanam, & cur perimant.* 27.
— capitis subito enecantia, quæ 85. & seqq.
Vulnera, decoct. vsus in vasorum attonia. 38.
Vulnus capitis profundum cur lethale. 34.

X


- X Iphoidis cartilaginis percussio cur aliquando mortifera.* 30.
— mirabilis partium nexus sub ipsa delitescens. ibid.
— Cyathus eidem applicatus ad quid. 57.

F I N I S.

Pag.	v.	ERRATA	CORRIGE
2	7	cofufionem	confufionem
20	1	dele dum	
II	<i>ult.</i>	circa cor	adde pulfus inæqualitates
23	16	inordinatæ	inordinati
113	5	cuculatæ	chocolatæ
129	27	cuculata	chocolatâ
158	28	die VI. Kal.	VII. Kal.
219	21	dele externam	
226	21	Æquite	Equite

*Cætera benignus Lector per se ipsum
aut corrigit, aut excuset.*





COUNTWAY LIBRARY OF MEDICINE

QP
87
L22

